



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

세픽심 Cefixime

세픽심(Suprax[®])은 입으로 복용하고 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 사용하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 페니실린계 항생제(예: 페니실린 V-K, 아목시실린(Amoxil[®]))나 세팔로스포린(cephalosporin)계 항생제(예: 세픽심(cefixime)(Suprax[®]), 세팔렉신(cephalexin)(Keflex[®]), 세파클로르(cefaclor)(Ceclor[®]), 세프트리악손(ceftriaxone)(Rocephin[®]), 이 약물 계통의 기타 항생제)에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 세픽심은 임신과 수유 기간에 주의하여 사용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- 세픽심 마지막 용량 투여와 경구 장티푸스 백신(Vivotif[®]) 투여 사이에 24 시간 이상 간격을 두십시오.
- **약물 상호 작용:** 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

세픽심 Cefixime

부작용(Side Effects)

- 두통이나 설사, 메스꺼움, 복통 및/또는 가스 발생이 있을 수 있습니다.
- 다음과 같은 알레르기 반응 징후가 있으면 즉시 응급 의료를 받으십시오:
두드러기나 호흡 곤란, 얼굴과 입술, 혀, 목구멍의 부기.

복용 방법(Instructions for Taking)

- 세픽심은 대개 1 회 단일 용량으로 처방됩니다. 의료 제공자가 지시하는 용량을 따르십시오.
- 약을 식후에 복용하여 배앓이 위험을 줄이십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15~30°C의 상온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
 - 1 일 치료 후 1 주일 및
 - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너 역시 치료를 받았고 또한 성관계 파트너의 치료가 시작된 이후 1 주일이 경과함
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 <http://www.smartsexresource.com> 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.