



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

플루코나졸 Fluconazole

플루코나졸(CanesOral®, Diflucan®)은 칸디다(*Candida*)종에 의한 효모 감염인 음문질 칸디다증(vulvovaginal candidiasis), 효모 귀두염(yeast balanitis) 등 일부 진균성 피부 감염 치료용 경구 항진균제입니다.

효모 크림 및/또는 질 삽입제 사용 치료에 관한 정보는 별도의 다음 의약품 정보지를 보십시오: [효모 감염과 진균 감염\(Yeast and Fungal Infections\)](#)

알레르기(Allergies)

- 플루코나졸(CanesOral®, Diflucan®), 이트라코나졸(itraconazole)(Sporanox®), 케토코나졸(ketoconazole), 포사코나졸(posaconazole)(Posanol®), 보리코나졸(voriconazole)(Vfend®) 등 **아졸(azole)계 항진균제**에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 플루코나졸의 임신 중 사용은 권하지 않습니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.
- 플루코나졸은 수유 기간에 주의하여 사용하여도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- **약물 상호 작용:** 처방 약이나 비처방 약, 생약, 기분 전환용 제품을 복용 중이시면 의료 제공자에게 알려주십시오. 개개의 모든 약물 상호 작용이 이 문서에 기재되어 있는 것은 아닙니다.
- **유의 사항:** 플루코나졸 일정 용량을 이미 정기적으로 복용 중이시면 이 1회 경구 플루코나졸 치료법을 사용하지 마십시오.

부작용(Side Effects)

- 메스꺼움이나 구토, 설사, 복통, 두통, 피부 발진이 있을 수 있습니다.
- 심한 피부 반응을 겪으시면 의료 제공자에게 즉시 연락하십시오.

복용 방법(Instructions for Taking)

- 경구 정제나 캡슐제를 식전이나 식후에 복용하십시오.
- 플루코나졸 복용 전, 포장 내 설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다.



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

플루코나졸(계속) Fluconazole (cont'd)

보관 방법(Storage Instructions)

- 15~30°C 의 실온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 치료 후에도 증상이 계속되면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 성관계 파트너는 증상이 없는 한 치료받지 않아도 됩니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 www.smartsexresource.com 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.