



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

酵母菌和真菌感染：内外生殖器治疗 Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments

治疗由[酵母菌](#)和真菌感染引起的症状的药物，在药房的“非处方药”(OTC)货架区有售。氟康唑口服药有非处方药和处方药。

本药品宣传材料提供关于外用乳膏和阴道置入剂治疗的信息。有关口服治疗选项的信息，请参阅[氟康唑宣传材料](#)。

治疗内生殖器/阴道症状：Treatment for Internal Genital / Vaginal Symptoms: 首选：

- 克霉唑 (Canesten[®]) 阴道置入剂或乳膏，连续使用3晚、6晚或7晚，或
- 咪康唑 (Monistat[®]、Micatin[®]) 阴道置入剂或乳膏，连续使用3晚、6晚或7晚

替代治疗：如果您在完成首选治疗后症状持续

- 硼酸：600mg阴道内胶囊，每天置入一次，连续14天；与医务人员讨论。

治疗外生殖器症状（生殖器皮疹、外阴、阴茎头）

- 克霉唑 (Canesten[®]) 或咪康唑 (Monistat[®], Micatin[®]) 外用乳膏，每天涂抹两次，连续10至14天
- 如果皮疹不消退，请咨询医务人员重新评估。

过敏(Allergies)

- 使用前请仔细阅读产品信息

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breastfeeding)

- 怀孕和哺乳期可以安全使用克霉唑和咪康唑。

警告 (CAUTION)

- **药物相互作用：**如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请告知医务人员。本文件未一一列出各种药物的相互作用。
- 如果您在服用任何**血液稀释剂**药物，请告知医务人员。咪康唑不能与某些血液稀释剂一起服用

酵母菌和真菌感染：内外生殖器治疗 Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments

副作用 (Side effects)

- 在自行选择推荐产品之前，请仔细阅读产品信息。请向医务人员咨询使用产品会出现哪些副作用。

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 仔细阅读产品信息，如果您有任何问题，请咨询医务人员
- 如果您正在服用或最近服用过抗生素治疗细菌感染，建议您使用完整的6-7天疗程来治疗阴道酵母菌感染，而不要缩短疗程。
- 如果治疗后症状持续，请告知医务人员。
- 没有出现症状的性伴侣无需治疗。

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。