



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

乙硫异烟胺 ETHIONAMIDE

乙硫异烟胺是一种用于治疗肺结核(TB)的抗生素。

应该什么时间服用此药? (When should I take this?)

- 饭后服用或用牛奶服用，以减轻胃部不适。
- 每天同一时间服用此药。这有助于您记住服药。

我应该如何服用此药? (How should I take this?)

- 定时服用此药非常重要。
- 请按医嘱服药。

如果漏服一剂怎么办? (What should I do if I miss a dose?)

- 如果漏服一剂，请在记起来后尽快服用。但是，如果此时差不多该服第二天的剂量了，请跳过漏服的剂量。
- 不要服双倍剂量。

服用此药有无禁忌? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 酒精

如果您正在服用任何其他药品，包括任何非处方产品，请告诉医生和药剂师。

可能有哪些副作用? (What are some possible side effects?)

- 头疼
- 恶心和呕吐
- 腹泻、胃部不适
- 嘴里有金属味
- 流涎过多
- 头晕或困倦
- 体重减轻
- 口腔发炎或口腔溃疡
- 手脚发热、刺痛或麻木

乙硫异烟胺（续） ETHIONAMIDE (cont'd)

医生可能会开吡哆醇（维生素B6）来减轻乙硫异烟胺的一些副作用。告诉医生您是否感到手脚发热、刺痛或麻木。

警告：如果您出现以下任何症状，请立即联系医生或护士：

- 视力模糊或视力丧失，无论眼睛是否疼痛
- 发烧
- 持续恶心或呕吐
- 皮肤或眼睛发黄
- 异常疲倦或虚弱
- 没胃口
- 尿色黄赤
- 精神、情绪或行为方面出现新的或比之前更糟的变化
- 皮疹、瘙痒或荨麻疹

关于服用乙硫酰胺，我还需要知道什么？ (What else do I need to know about taking ethionamide?)

- **糖尿病患者**请在服用此药期间定期检查血糖水平。
- 如果您正在服用**甲状腺**药物，建议定期监测甲状腺功能。
- 如果您**怀孕**、计划怀孕或希望用**母乳喂养**宝宝，请告诉医生。

这药应存放在哪里？ (Where should I store this medication?)

- 谨防儿童接触
- 避光
- 室温下储存在阴凉干燥的密闭容器中

如果还有其他问题，应该给谁打电话？ (Where do I call if I have any other questions?)

您的医生、诊所或公共卫生部门： _____

温哥华结核病服务诊所： 604-707-2692

新威斯敏斯特结核病服务诊所： 604-707-2698

BCCDC 疫苗和药房服务： 604-707-2580