

Stollingsstoornissen bij minderjarigen, 6 maanden t/m 17 jaar

Stollingsstoornis 1 t/m 17 jaar	Contact behandelaar/ interval medicatie en vaccinatie	Vaccinatie i.m. en 2 minuten stevig afdrukken, tenzij andere instructies
Aangeboren stollingsstoornis: hemofilie, Z van Von Willebrand	Specialist is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Specialist is niet akkoord	 Geen vaccinatie
	Niet meer in behandeling bij specialist	Beoordeling door arts op vaccinatielocatie (op basis van ervaringen met vaccinaties bij patiënt)
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: cumarinederivaten (Vit.K- antagonisten of VKA) ^a	Trombosedienst is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Trombosedienst is NIET geraadpleegd	 Geen vaccinatie, maar trombosedienst raadplegen
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: laag- moleculairgewichtsheparine (LMWH) ^d , in eenmaal daagse dosering of tweemaal daagse dosering	Preventief gebruik	
	Therapeutisch gebruik en specialist is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Therapeutisch gebruik en specialist is NIET akkoord of NIET geraadpleegd	 Geen vaccinatie, maar specialist raadplegen
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: trombocytenaggregatieremmers (TAR) ^e	N.v.t	
Trombopathie of trombopenie (aantal $50 \times 10^9/l$)	Specialist is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Specialist is niet akkoord	 Geen vaccinatie
	Niet meer in behandeling bij specialist	Beoordeling door arts op vaccinatielocatie (op basis van ervaringen met vaccinaties bij patiënt)
Direct werkende antistollings- medicatie (DOAC) ^f	Interval tussen medicatie en vaccinatie is ≥ 6 uur	
	Interval tussen medicatie en vaccinatie is <math>< 6</math> uur	 En minimaal 10 minuten stevig afdrukken
Combinaties van antistollingsmiddelen: TAR + DOAC :	Interval tussen DOAC en vaccinatie is ≥ 6 uur	
	Interval tussen DOAC en vaccinatie is <math>< 6</math> uur	 En minimaal 10 minuten stevig afdrukken
Combinaties van antistollings- middelen: TAR + VKA	Volg advies voor VKA	Volgens advies voor VKA

^a VKA voorbeelden: acenocoumarol en fenprocoumon (Marcoumar).

^d LMWH voorbeelden: nadroparine (Fraxiparine, Fraxiparine Forte), dalteparine (Fragmin) en enoxaparine (Clexane, Inhixa, Lovenox). Worden onder andere voorgeschreven aan patiënten met veneuze trombose of longembolie bij kanker of aan zwangeren die antistolling nodig hebben.

^e TAR voorbeelden: acetylsalicylzuur (Aspro, Aspirine, Alka-Seltzer).

^f DOAC voorbeelden: rivaroxaban en dabigatran.