

欽定四庫全書

普濟方卷三百十一

折傷門

傷折疼痛

附論

明 周王 朱爌 撰



凡筋骨傷折疼痛人之一身血榮氣衛循環無窮或筋
肉骨節誤致傷折則血氣瘀滯疼痛倉卒之間失於調
理所傷不得完所折不得續輕者肌膚焮腫重者髀白

挫脫治法宜先整其骨折之所然後施貼燻封裏之劑

方

麒麟竭散 出聖濟總錄

治筋骨損傷疼痛

麒麟竭 沒藥 研 自然銅 煨醋淬七遍研 赤芍藥 當歸

切 白芷 蒲黃 大黃 生用各半兩 桂 去粗皮 細辛 去苗葉各

一兩 骨碎補 去毛炒 乾荷葉 三分

右為散每服二錢溫酒調下不拘時

附子散 出聖惠方 治一切傷折疼痛不可忍

附子 炮製去皮臍 當歸 剉微煨 芍藥 桂心 沒藥 澤

蘭 亂髮灰 檳榔 各一兩 敗龜 塗醋炙微黃 虎脰骨 塗醋

炙微黃各二兩 甘草 半兩各微赤剉 麝香 一分細研

右為細末入麝香研令勻不拘時候以溫酒調下二

錢

桃仁散 出聖惠方 治傷折疼痛接骨止痛

桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 桂心 當歸 剉微炒 玄胡索

生乾地黄 芍藥 各一兩 川大黃 剉微炒研 阿膠 搗碎炒

各二 亂髮 如鴨子大

右為細末用酒二升先煎髮并阿膠如糖用綿濾去

滓然後下諸藥末調勻焙乾搗細為散每服以溫酒

調下二錢日三四服效

赴痛散

出德生堂

治男女跌傷痛疼不可忍者

草烏

炮製碎別炒入藥

白芷

川芎

各一兩半

杜當歸

二兩

杜烏

藥乳香

五兩半

紫金皮

大塊童子小便浸春夏三日秋冬五日用半觔

沒藥

兩半 南星

斤半

右為細末每服一錢或半錢溫酒調服病在上食後

服病在下食前服

當歸散

出聖惠方

治傷折痛疼青腫滯血

當歸

剉微炒

桂心

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

川大黃

剉碎

微炒

赤芍藥

各一兩

敗蒲

二兩燒灰

沒藥

骨碎補

各一兩半

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服

桂附散

出御藥院

治因傷損後筋骨疼痛

桂皮

去粗皮

附子

生去皮臍

白礬

細辛

去苗葉

白芷

各二兩

五

加皮 桑葉 各二兩

右為散每服二兩入連根葱白十莖水一斗煎四五

沸逐凝淋洗立效

地黃金粉煎 出聖惠方 治傷折筋骨後疼痛不止宜服散

瘀血理新血續筋骨止疼痛

生地黄 三斤淨洗令乾却入酒內浸二日取出紙袋盛火焙令乾為度 天雄 二兩炮製

去皮 桂心 當歸 芍藥 桃仁 湯浸去皮尖雙

右為末入金粉內和勻用酒一斗以文武火煎成稠

煎每日空心午前夜卧時各以酒調下匙頭

當歸血竭散 出聖惠方 治傷折筋骨疼痛不可忍

麒麟竭 研別 沒藥 研另 當歸 赤芍藥 桂 各一兩 白芷

一兩

右為細末每服二錢用温酒調下不拘時候

應病丸 出醫方大成 治折傷後為血氣所侵手足疼痛

破故紙 一斤半炒一半 生蒼朮 一斤 骨碎補 一斤去毛 舶上茴香

十二兩炒 穿山甲 去膜皮炒脹為度紫灰亦可 生草烏 一斤剉如麥大

右除草烏一斤用生葱連皮生薑各二斤搗爛草烏一處淹兩宿焙乾連前藥一處焙為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五十九酒湯任下忌熱物

內固接骨丹

出聖惠方

治傷折疼痛

古字錢

二兩先於火內燒令通赤醋淬如此十度

自然銅

硫黃

各一兩

已上三味為末入車瓶子內以坯子泥封瓶口候乾倒下藥放火燒令通赤候冷取出搗勻入水銀一兩同研水銀星盡後用白薄紙裹藥似毯子後以藥入

白內滴水爛搗裹藥毬入糠火內燒七日冷復取出細研後入

硃砂末

麝香末

犀角末

各一分

右研令勻搗生地黄絞取汁於銀器中熬為膏和藥末丸如酸棗大如有患病者以溫酒半盞入地黃膏一錢攪勻下藥一粒服後如吐清綠水或瀉清綠水三二合勿怪是病根出也更宜頻服以瘥為度

接骨如神散

治傷骨損折疼痛者

水蛭

糯米炒黃去米

白綿

燒灰

沒藥

別研各

乳香

等分 血餘

小髮十五團如無灰盡髮燒灰

右為末五十以上服一錢二十以下服半錢小兒服

半分温酒調下

接骨散

出聖惠方

治傷折痛疼

栗黃

一斤曬乾

雄黃豆

半升

沒藥

二兩

麝香

半兩細研

桑根白皮

一斤剉

右為散每服三錢以醋一中盞煎至半盞用漿水二

合解服不過三服疼痛即止

筋骨藥 治一切疼痛及諸風

川烏

一箇

草烏

二兩去皮生用

乳香

當歸

各半兩

天麻

骨

醋炙

沒藥

自然銅

芍藥

川芎

草薢

獨

活

各一兩

右為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服十數丸

温酒下

乾地黄散

出千金方

治骨折筋斷傷疼痛者

熟地黄 當歸

羌活

一方用獨活

苦參

各等分

右咬咀每服七錢白水煎服或為末酒調下

海桐皮散

出聖惠方

治傷折辟外生風疼痛

海桐皮

劉

黑豆

炒熟

附子

炮製去皮臍各一兩

防風

二兩去蘆頭

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服

治傷折疼痛不可忍

出聖惠方

當歸

一兩

白芷

桂心

吳茱萸

各一兩

右為細末剉生龜一枚入藥搗令勻用封裏傷折處

至聖黑龍丹

出御藥院方

治一切筋骨損傷疼痛

米粉

四兩於銀器內炒成塊子得色放冷研為細末後入三味

乳香

細研

沒藥

細研

各半兩

右研極細每用以好酒或醋調如膏攤在紙花上貼

患處

紫金散

京三稜

剉炒黑

連翹

半兩

黃耆

三錢

甘草

炙三錢

加羌活

半兩

右為粗末作一服水一盞煎去粗食後服

飲蛇龜酒 出聖惠方

治一切筋骨肌肉折疼痛

飲蛇龜 一枚 糯米 五升 蒸好酒 二斗

右為剉龜釀飯同入酒瓮中封七日即每暖一盞服

之日三五服

雙靈膏 出御藥院方

治一切筋骨肌肉疼痛

良薑 一兩 白芥子 半兩

右為細末每用藥二錢半頭白麵半兩水調成膏攤

在紙上貼患處

沒藥散 出聖濟總錄

治墜折傷損疼痛不可忍者

沒藥 研別 乳香 研別 玄胡索 當歸 切 甜瓜子 各一兩 丹

砂 研半兩

右為細散拌勻每服一錢熱酒調下又取藥散二三

錢以黃米作粥攤作餅子糝藥散在上用貼痛處以

帛封扎定一二日換佳

治折骨傷筋痛不可忍 出經良方

生地黃 藏薑瓜 舊糟 各一斤 赤小豆 半斤 生薑 六兩

右研爛同炒勻令熱以布帛裹罨傷處用杉板夾縛
不過三日令安

聖靈丹

出御藥院方

治一切打撲傷損及折傷疼痛不可

忍者

乳香

五錢

烏梅

五箇去核

白米

一捻

蒿苳子

大盞炒黃取二兩八錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服十九細嚼熱酒
下如痛再服一方米湯送下病在上食後病在上食

前

托裏煎

黃耆

白茯苓

各一兩

甘草

半兩

乳香

一錢別研

右為細末每服二錢酒半盞慢火煎成膏子再入酒
一盞調勻溫服

蓬莪湯

治傷撲疼痛

白殭蠶

炒各一兩

蘓枋木

剉二兩

沒藥

研半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服日
三若為細末熱酒調下亦得一方無沒藥

烏梅煎 出肘後方 治折傷疼痛墜柞瘀血方

用烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消一

方烏梅煎湯調百草霜服

又方

取茅連根葉搗絞取汁三升服之不過三四服愈冬

用根

秦嶽活丹

出和濟方

治男子婦人外傷內損狗傷蟲咬車

馬撲墜手足折傷一切疼痛腹中瘀血刺脇築心左

癱右瘕走注疼痛癰疽痔漏及婦人冷氣入腹血脈
不通產後敗血灌注四肢及一切腫痛血氣撮痛病
宜服之

花桑枝

如臂大者燒灰盡
淬米泔中焙乾

栗楔

栗子中心扁者薄
者薄切日乾各一

勛細墨

半斤一半用草麻子三兩細研塗墨塗盡
黃紙包泥固濟乾灰火五十七次燒赤冷

地上出火兩時一半用醋化
細沙塗墨上火炙令乾燥

皂角刺

一斤燒赤
火中炙乾

黑豆

一斤濕布揩去
垢黑皮焙乾

亂髮

二斤皂角水洗淨用清
油二斤炒頓捻看熟即

止為乳香

四兩通明滴乳香細
研入米醋一碗熬熱

礪砂

三兩洗淨者
醋化塗墨上

欽定四庫全書

普濟方

十

右為末杵三千下丸如梧子更如彈子大醋糊丸痛甚一丸輕者半丸以無灰酒一盞乳香一豆大先磨乳香次磨藥盡煎三五沸臨卧温服以痛處就牀欲汗則覆被仍用藥塗傷處切忌一切動風物常服入當歸末一錢孕婦勿服一方無礪砂

治折傷

取括樓根以塗重布裏之熱除痛即止

熟乾地黄丸

出聖濟總錄

治遠年傷折因風氣不和舊傷

處痛疼不忍

熟地黄

焙乾四兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁

牛膝

去苗酒浸焙各兩半

苦參

細剉菟絲子

酒浸焙乾

肉蓯蓉

酒浸切焙

草薢

炒各一兩桂皮

青木香

生用各一分

訶梨勒

煨熟去核半兩

升麻

三分

右除杏仁外搗細為末入杏仁別搗再羅勻煉蜜和搗三千下丸如梧桐子大每服空心温酒下二十九至三十九

治折傷

以水獺一箇用罐子內以泥固臍放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷折處攤以水獺末一錢上糝使用帛子裏繫立止疼痛

治折傷止痛化血

出本草

右取能生搗其肉及血傅之

能即三足鱉也

治傷折跌筋骨生肌破血

出本草

用每月王日酒水煮濃汁飲之

治折傷先用止痛湯法

出本草

搗白礬為末每用一方匕湯沸一碗衝了以手拍蘸

乘熱熨傷處以時止然後排整筋骨貼藥

治斷指

出本草

以蛇銜膏封之抱樸云連已斷之指

治刀刃及折傷

出朱氏集驗方

右用烏狗血和酒連喫數椀蓋犬血能惡血也淮西總管李貴見效邕莞易倅因會客于南樓墜樓者二十餘人亦以此收功

治折傷

右用恭音甜菜搗傅之

傷折惡血不散

附論

夫脉者血之府血行脉中貫於肉理環週一身因其肌體外固經隧內通乃能流注不失其常若因傷折內動經絡血行之道不得宣通瘀積則為腫為痛治宜除去惡瘀使氣血流通則可以復完也

方

牛黃散 治大損後化惡血理好血止疼痛

牛黃細研 真珠細研 龍腦細研各一分 琥珀 牡蠣燒為粉 硃

砂細研水飛過 桂心 當歸剉微炒 蒲黃各一兩 麝香半兩細研

金箔五十片細研 銀箔五十片研

右研令勻不拘時候以桃仁湯調下二錢

白殭蠶丸 治骨折筋傷後惡血攻疼痛不止

白殭蠶炒 當歸炒 桂心 補骨脂炒 神麩炒 半夏

湯浸七遍去 檳榔 赤芍藥各一兩 芎藭 薯蕷炒 白附

子炮 羌花醋拌炒 各半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以
温酒下二十九日三服

黃耆散 治傷折惡血凝滯腫痛

黃耆 芍藥 生乾地黄焙 當歸切 附子炮 續斷

切桂 去粗皮 半兩 乾薑 炮 大黃 生各一兩 椒 去目及閉口者炒出汗

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓温服
不拘時候

芍藥散 治打撲筋骨惡血不散迷悶疼痛小便血下

一名當歸散

赤芍藥 當歸剉微 續斷 白芷 生乾地黄

黃芩 甘草炙微 牛膝去苗 蒲黃各一兩

右為細末不拘時候以温酒調下二錢一方無蒲黃
芍藥湯 治傷折惡血不散腫痛不消

赤芍藥 黃耆 附子炮製皮臍 當歸切 續斷 桂去粗

皮 羌活去蘆頭 蜀椒去目并閉口者各一兩

右劉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分滓去温服不拘時候

芎藭湯 治傷折腫痛氣血不散

芎藭

甘草

炙 蜀椒

去目閉口者炒出汗

澤蘭

附子

炮製去臍

桂 去皮

當歸

切 大黃

醋炒各半兩

右為散每服三錢温酒調下不拘時

蒲黃散

治骨折筋傷惡血攻心煩悶

蒲黃

三分 芎藭

當歸

剉微炒

桂心

各半兩

白芷

細辛

各一兩

右為細末每服以生薑酒調下二錢日三四服

草烏頭膏

一名烏頭膏

治傷結折惡血結滯不散腫痛

見方

諸骨跌類

桃仁散

治從高墜下及落車馬胸腹中有惡血喘自

不得

川大黃

剉碎微炒

川硝石

甘草

炙微赤剉各一兩

蒲黃

一兩半

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

右為散每服四錢以水一盞入棗三枚煎至六分去滓不拘時候溫服

芎藭湯 治傷折惡血瘀結不散

方見傷折腹中瘀血類一名桂芎藭湯

蒲黃鯉魚散 治車馬墜撲傷折惡血衝心迷悶

蒲黃 二兩 鯉魚鱗 五兩 炒灰 葶藶子 一兩 末 生地黄汁 五合

右先將蒲黃葶藶子於砂盆內以慢火旋滴地黃汁於內炒令汁盡以乾為度并鯉魚鱗灰一時研為末不拘時候以童子熱小便調下二錢

杉木節散 治從高墜損心胸惡血不散

杉木節 七寸 細剉 蘓枋木 五兩 細剉以水一斗煎取一升去滓 醋 五合 入

木汁內

右將杉木於一砂盆內以慢火炒旋滴蘓枋木醋汁相和炒令汁盡停冷搗為細末每服以童子小便調下二錢日三四服化下惡水為效

蠶沙膏 治傷折惡血不散

原蠶沙 二升 炒研 麥麩 三升

右和勻以米醋四升煮稠磁器內盛量損處多少塗
傳以絹帛裏日再

糟米塗方 治傷損惡血不散疼痛

酒糟 二升 糯米 半升

右同和酒煮稠得所取出乘溫塗患處外封裏之旦

再易

地黄膏 出聖濟總錄

治傷折惡血結滯腫痛

生地黄 細切 烏雞 一雙去毛腸肚并足和骨細研

右用和搗一二千杵量患處多少攤帛上縛之日再

外塗散膏 出聖濟總錄 治傷折惡血瘀滯不散

鼠糞 三兩燒存性 生地黄 半斤切焙

右為末猪脂油和塗患處日三易

治血久不除變成膿方

大黃 如雞子一枚 蚯蚓尿

右以酒半升煮三沸服之

又方

虎杖劉三兩

赤芍藥劉一兩

右為細末每服三錢温酒調下不拘時候

神效熨方

出十便良方

療從高墜下及被木石所窄或因

落馬傷損血瘀凝積氣急欲絕損腫疼痛者以淨土五升蒸之令熟分半以故布數重裹之熨病上勿令大熱恐破肉候冷易之以痛止即已凡有傷損皆以藥法治之神效已死不能言者亦活三十年者亦瘥一方和醋蒸熟封裏所傷處

治被打撲瘀血在骨節及脇外不去

以鐵一斤酒三升煮取一升服之或燒赤投酒服之

治血聚皮不破者

出百一選方

用蘿蔔葉研細卷以絹帛包縛傷處

治因傷損血瘀不散

出肘後方

取牡丹皮八分合豆蟲二十一枚熬過同為末每旦温酒和服寸匕血當化為水

松節散

出聖惠方

治從高墜損惡血攻心胃膈煩悶

用黃松木節五兩細研童子小便五合醋五合於砂盆內慢火炒旋滴小便并醋以盡為度炒令乾搗細為散每服以童子熱小便調下二錢日三四服

甘草湯 治諸傷惡血積滯腸中

甘草炙 白茯苓去黑皮 肉桂去粗皮 杏仁去皮尖雙仁各一兩

右粗搗篩每服三錢水一鍾煎至七分去滓溫服不拘時候

治傷損瘀血不散疼痛出聖惠方

蒲黃四兩 附子一兩炮製去皮臍

右為細散不計時候以溫酒調下二錢

治傷折止痛散出本草

良 用小麥粉和醋煮之裏傷處便定重者再蒸裏之甚

治破傷血不止出永類鉉方

真血竭三錢或用番降節中油代亦可 五倍子一兩 陳紫蘓葉三錢 白芷半兩 海金沙一兩

右為細末摻之軍前急救可不著水至效

治久血不除變膿者

出肘後方

大黃

三兩

杏仁

桃仁

各四兩

右以酒水各五升分三服當下膿血若不盡更須作

傷折腹中瘀血

附論

夫傷折腹中瘀血因高墜下倒仆擗撲氣血滯經不得
流散瘀在腹中速宜下之遲即日漸瘀滯使人枯燥色
不潤澤則變痿悴血瘕之病

方

澤蘭丸

出聖惠方

治諸傷折腕損蹉跌筋骨疼痛散瘀血

澤蘭

蒲黃

各一兩

赤芍藥

剉微炒

當歸

微炒

白芷

芎

窮細辛

延胡索

牛膝

去苗

天雄

炮去皮臍

桃仁

湯浸

去皮尖雙仁麩炒黃

桂心

生乾地黄

續斷

川大黃

半兩

剉碎

皂莢

去皮塗酥炙令焦黃去子別搗為末各一兩

右為末用酒醋各一升先將皂莢末煎成膏入藥末
和丸如梧桐子大不拘時候以溫酒下三十九

通神散 出聖 惠方

接骨續筋散 痛瘀血止痛

木香 沒藥 當歸炒微 生地黄 劉寄奴 桂心

補骨脂炒 赤芍藥 桑根白皮 川大黃剉微炒黑

豆二合 熟炒 敗龜塗酥炙微 黃各一兩 羊脰炭五兩 燒令變赤入 醋蘸如此七遍

右為細末不拘時候以溫酒調下一錢

敗蒲散 出聖 惠方

治傷折內損瘀血不散

敗蒲一兩半 燒灰 牡丹 當歸剉微炒 芎藭 赤芍藥

生乾地黄 川樸硝 桃仁湯浸去皮尖雙 仁麩炒微黃 蒲黃

半兩 陳橘 半兩 湯浸 去白穰 焙

右為末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時

候

麒麟竭散 出聖 惠方

治傷折內損血瘀不散

麒麟竭 牡丹 蒲黃 當歸剉微炒 桂心 芎藭

赤芍藥 沒藥 骨碎補各一兩 兩 敗蒲一兩半 燒灰

右為細末每服二錢以溫酒調下日三服

神麩丸 出聖 惠方

治傷折內損瘀血不散

次三用神麩丸

普濟方

二十一

通神散 出聖 惠方

接骨續筋散 痛瘀血止痛

木香 沒藥 當歸炒微 生地黄 劉寄奴 桂心

補骨脂炒 赤芍藥 桑根白皮 川大黃炒劉微 黑

豆二合 熟炒 敗龜塗酥炙微 黃各一兩 羊脰炭五兩燒令變赤入 醋蘸如此七遍

右為細末不拘時候以溫酒調下一錢

敗蒲散 出聖 惠方 治傷折內損瘀血不散

敗蒲一兩半 燒灰 牡丹 當歸劉微 芎藭 赤芍藥

生乾地黄 川樸硝 桃仁湯浸去皮尖雙 仁麩炒微黃 蒲黃

半兩 陳橘 半兩湯浸 去白穰焙

右為末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時 候

麒麟竭散 出聖 惠方 治傷折內損血瘀不散

麒麟竭 牡丹 蒲黃 當歸劉微 桂心 芎藭

赤芍藥 沒藥 骨碎補各一兩 兩 敗蒲一兩半 燒灰

右為細末每服二錢以溫酒調下日三服

神麴丸 出聖 惠方 治傷折內損瘀血不散

次三

普濟方

二十一

神麩 三兩搗碎醋少許拌炒微黃 虎脰骨 二兩塗酥微黃 海桐皮 剉

肉蓯蓉 酒浸一宿刮去皮炙 芎藭 半夏 湯浸七適去滑 紅藍花 各一

兩 白殭蠶 二兩微炒

右為末煉蜜搗三二百杵丸如梧桐子大每服以温酒下二十九日三服

蒲黃散 出聖惠方 治傷損復中瘀血不欲聞人聲胸中氣

塞便利出血者

蒲黃 一合 當歸 切焙桂皮去粗 續斷 白芷 各二兩 甘草 炙剉

半兩 生地黄 二兩

右為散空心酒調服一錢日再服一方有藕節二兩

當歸散 治傷折下瘀血

當歸 三分剉微炒 蒲黃 半兩 蔓薹子 半兩 生薑汁 一合 好酒 五合

生地黄汁 三合 膩粉 一分

右為細末先煎生薑地黃汁并酒等三兩沸然後入藥味和調勻分為三服每日空心服之當轉下腹內

惡血了便宜服補藥

琥珀散 接骨化瘀血

琥珀 生玳瑁 當歸 蒲黃 生乾地黄 京

三稜 煨剉各一兩

右為細末不拘時候以温酒下二錢

買子木湯 出聖惠方 治瘀血聚於腹中不便服藥多有血

結顆塊衝心

買子木 當歸 剉微炒 桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩 紅雪

赤芍藥 各一兩半 東向桃枝 剉三兩

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去滓温服日三四服

廣蟲散 出聖惠方 治打損及傷墮腹内有瘀血

廣蟲 蟲蟲 水蛭 各三枚 桃仁 十五枚 桂心 二兩 大黃 五兩

右吹咀以酒水各五升煮分五服

夜合枝散 出聖惠方 治馬墜有瘀血聚於腹胃之中不便

服藥多有擊血結成顆塊衝心

夜合枝 剉 杏枝 剉 甜瓜子 各一兩 赤芍藥 一兩

右為散每服五錢以水酒各大半盞煎至五分去滓
溫服日三四服

四聖散 出鮑氏方 治傷重煩悶欲死者用此打血利大便

小便

花藥石 黑神散 蒲黃散 各貼 當歸 牛膝 川

芎 米炒 白芷 醋炒 蘓木 大黃 各半兩 蓮子肉 酒煮半兩

右為末童子小便調服或木通湯下亦可惡血立下

麻布飲 出聖惠方一名牡丹散

麻布 一尺燒灰 牡丹皮 菴簡子 各一兩半 桂皮 去粗皮 當歸 切焙

鬼箭羽 敗蒲 燒灰 赤芍藥 各一兩 蒲黃 半兩 大黃 剉炒

三兩

右粗搗篩每服五錢以好酒一盞半煎至八分入芒

硝半錢更煎一沸去滓空心溫服

敗蒲湯 出聖濟總錄 治墜撲腕折瘀血疼痛

敗蒲 燒灰 當歸 各二兩 牡丹皮 芎藭 赤芍藥 各一兩

豉心 一合 蒲黃 紙上炒半兩 陳橘皮 去白皮一兩 桃仁 湯浸去皮尖雙

次定四庫全書

善濟方

二十四

仁半
兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入地黃

汁一合樸硝一錢溫服

桃枝湯 出聖惠方一
名桃仁湯

療墮落積瘀血不散疼痛大小

便不通

桃枝 一握中
指長到芒硝 五分 大黃 四兩 當歸 甘草 炙 桂心

各三 蠶蟲 二十枚去
翅足熬 桃仁 五十枚去
皮尖熬 水蛭 二十
枚熬 川

朴硝 一兩
半

右吹咀以水八升煮取三升去滓分三服內消忌海

藻松菜生葱等一方無芒硝桃枝

桃仁湯 一名荆芥飲
子出聖惠方

治腹中瘀血在內痛滿短氣大

小便不通

桃仁 麤蟲 二十枚
去尖熬 水蛭 二十
枚熬 川朴硝 一兩
半 桂心

當歸 甘草 各三
兩 蒲黃 五
兩

右吹咀以水一斗煮取三升分三服瘀血多令人瘦

悴服此效

牡丹湯 出聖濟總錄

治因墜墮內損

牡丹皮

大黃

切焙去粗皮

鬼箭羽

朴硝

碎

蒲黃

芍藥

當歸

切焙各一兩

右粗搗每服三錢水一盞煎至七分空心午卧時去

滓温服

檳榔散

出聖惠方

接筋骨通瘀血止疼痛

檳榔

劉寄奴

桑寄生

熟乾地黄

龜殼

塗酥

炙微黃各一兩

赤芍藥

當歸

劉微炒各三分

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

為度一兩

右為細末不拘時候以温酒下二錢

理中膏

療墮落積瘀血主消血

大黃

二兩

猪脂

斤二

桂心

一兩

乾薑

一兩

當歸

二兩

通草

亂

髮

各一兩

右先以猪脂煎髮令消盡次搗各藥篩細一同攪勻

微火煎之三上三下即藥成去滓以好酒服一兩日

二服一方不去滓是生膏子

黃耆湯 出聖濟總錄

治因攤擱墜墮內損瘀血及吐血日

漸痿瘦

黃耆 剉 甘草 炙 當歸 切 芍藥 生薑 切 焙各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候一方無生薑

桂芍湯 出聖濟總錄 治傷瘀血不行積在心腹

桂 去粗皮 芍藥 燒灰或用荷葉 菴藺子 大黃 剉炒

朴硝 別研各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空

心日午臨卧各一服

活血散 出聖濟總錄 治傷損瘀血在內攻心注刺痛

蝙蝠 炙乾一枚 當歸 切 骨碎補 去毛 桂皮 去粗皮 補骨脂 微炒 各半

兩 大黃 剉炒 三兩

右為散每服三錢空心溫酒調下薄荷湯下亦得

地黃酒 出聖濟總錄 治傷損瘀血在腹

生地黃 升 酒一升 當歸 兩 桃仁 去皮尖 牡丹

去桂 去粗皮 心 各一兩

右以後三味搗羅為末與前二服一處煎熟每去粗

溫飲一盞不拘時候

地黄湯 出聖濟 總錄

治墜墮內損大小便下血經久不盡

兼瘀血不時吐唾出血

生地黄汁 炙剉 五合 柏葉 半兩 甘草 炙 黃芩 去黑心 一兩 阿膠

炒

右除地黄汁外為末每服三錢水一盞地黄汁三分

同煎三五沸去粗通口服不拘時候

桃仁桂心湯 出聖 惠方

治打損瘀血在臟攻心煩悶

桃仁 湯浸去皮 尖雙仁

桂心 菴藺子 各一兩

川大黃 二兩 剉炒

荷葉蒂 三七 枚

右為散每服五錢水一大盞煎至五分入朴硝一分

攪令勻空心分二服以利下惡血為度

荆芥散 出聖 惠方

治傷折瘀血在內煩悶刺痛

荆芥 一握 淡竹葉 一雞 子大 當歸 一兩 剉 微炒 地黄汁 一合

右為末水一大盞煎七分去滓入地黃汁食前為二服

大黃散

出聖濟惠方

治打撲內傷瘀血在腹

大黃

炒

當歸

切

芎藭

剉各半兩

右為散每服二錢空心日午臨卧温酒調下

治有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞短氣出

金方

甘草

一兩

茯苓

二兩

杏

五十枚

右以酒二升煮九合為二服

虫蟲散

治傷內損處腹中有瘀血疼痛煩悶

虫蟲

一分微炒

牡丹

生乾地黃

各一兩

右為末每服於食前煖酒調下二錢

治打損聚血腹中不散煩悶

豉

三合

青竹茹

一兩

右為散分三服以水一大盞煎五分去粗温服日三

四

香豉散 治調諸傷損血在內

豉 半斤 畧炒 蘓木 細剉 一兩

右為散每服二錢温酒下不拘時候

二黃散 治打損及傷墮腹內有瘀血久不消

大黃 一兩 熬 生地黄 三兩 熬

右以水酒二升煮汁服之或為末煉蜜為丸如梧桐

子大每服十九酒下

桂枝酒 治打撲傷墜瘀血溷身體疼痛

以辣桂為末每二錢温酒調下或用辣桂一分大黃

丹桂各半分每三錢薑紫蘓煎服下黑物即安或未

有藥倉卒且服米醋一小盞亦散瘀

桔梗散 治被擊瘀血在腹內多不消時發動者

用桔梗末熟水下刀圭

玉質汗方 治折傷內損有瘀血天陰則疼痛兼婦產

後諸疾以三月採益母草一名重檐或名夏枯草揀

去諸草及乾葉以新水淨洗於箔上攤曬令草乾盡

則用手摘斷可長五寸許勿用刀即置鑊中量水兩石許可令草水深二三寸則縱火煎候糜爛加水三分減二分以上則瀝去草取五六斗汁瀉入盆中澄半日以綿濾取清汁放小釜中慢火煎取一斗許如稀餲每服取梨汁燒酒化下日再和美粥喫亦得如速行不能將稀煎去即更煉令稠硬停作小丸服之七日内則疼痛漸瘳二七日平復或有產婦惡露不盡及血暈一兩服即瘥其藥兼療風益心力無所忌

按本草質汗出西方色類玉凝血者入煎甘草松淚
 檉乳地黄并熱血盛之今以益母煎成故曰玉質汗也

白馬蹄散 治傷折化瘀血為水

白馬蹄

三兩燒令烟盡

栗子黃

一兩陰乾

桂心

三分

蒲黃

一兩龜殼

三兩塗酥炙微黃

右為細末每服以温酒調下二錢日三服

大黃丸 療被打有瘀血

大黃二兩 桃仁去皮尖熬 蠶蟲各二十一枚去足翅熬

右搗以蜜為丸內酒一升中煎取七合一服之

青竹茹散 療若為人所折舉身盡瘀血

刮青竹皮二升 亂髮如雞子大四枚燒灰 玄胡索二兩

右為散以水吞酒一升煎三沸頓服日三四一方無

玄胡索

內消散 治打損內有瘀血不散疼痛

生銀一兩搗碎細 雄黃細研 娑娑研細各一分

右研勻不拘時候以溫酒調下半錢

延胡索散 治車馬墜損瘀血不散攻刺疼痛

延胡索 蒲黃各一兩 肉桂半兩去皺皮

右為細末每服用瀝半盞調下二錢日三四服

療被打有瘀血方

薑葉一斤切一 當歸三兩

右為末以酒服方寸七日三

蒲黃散 治被打傷破腹中瘀血

蒲黃一升

當歸

桂心各二兩

右下篩以酒服方寸七日三夜一

又方

劉寄奴

延胡索

骨碎補

各三兩

右吹咀二升煎取七合復內酒及小便各一合熱令

溫頓服一方搗粟子為末傅瘡上

法煉紅花散

治從高墜折傷心下瘀血

以藍花一十兩以好醋二升浸二宿漉出火焙乾又

入醋內又焙乾以醋盡為度焙乾為末每服用童子

便調下三錢日三服兼治婦人月水不勻產後諸疾

血暈悶絕或狂語者并與二服便心胸通利開眼識

人神效

白馬蹄散

出聖惠方

治打破腹中瘀血腹滿煩悶

用白馬蹄燒灰令烟盡搗篩酒服方寸七日三夜一

服

香豉湯

出肘後方

治被打毆擊損傷聚血腹中滿悶

用豉一升以水三升煮三沸分再服不瘥重作更取麻子煮如豉法不瘥更煮豉如上法

又方

出海上名方

治被毆擊損傷聚血腹滿煩悶

用魚膠燒灰存性用一錢末酒調空心服

又方

用骨碎補為末酒調服一方研爛取汁以酒煎服滓傳損傷處尤佳數日平復及被鞭捶身無全膚用之大效

水仙散

出聖惠方

治打撲墜損惡血攻心悶亂痛疼

用未碾荷葉陰乾為末食前以童熱小便一小盞調下三錢以利下惡血為度一方用乾荷葉大五斤燒令烟盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢七日三夜服一方以童子小便和熱酒調服

治擗撲傷損瘀血流經絡間成痼疾

出經驗良方

用老者茄種薄切瓦上焙乾為細末熱酒調下二錢日二服雖十餘年積血亦蕩去矣

治被傷損瘀血不散方

出聖惠方

用生地黃汁一中盞相和煎三五沸食前溫服

治撲損瘀血

出本草

用芥子和生薑研微煖塗貼

治折傷內損瘀血不止煩悶欲死者

出本草

用石藥酒消服之

石藥似蕊石礪砂之類

治撲損瘀血

出本草

用糟傳之

治打損瘀血

出本草

以飴糖熬令焦和酒服之

治撲損瘀血

出本草

用芥子和生薑研微煖塗貼

治折傷內損瘀血不止

用小麥麩醋炒貼

治消撲損瘀血

出本草

以菩薩寶用水磨服之

治主踉跌折傷瘀血

出本草

以羊脂塗上

治折傷損內瘀血生膚止痛

出本草

取瘡藥以乳及水煮服之傳傷折處

治撲損瘀血

出本草

桑葉煎汁服之

諸傷氣血膨脹大便不通腹肚築痛

出永類
鈴方

雄黃

膩粉 各三錢

巴豆

十粒五粒去油生用
五粒油燈燒存性

真蒲

黃 一錢

右為末飯丸菘豆大每服十九冷茶下過一時未通
用水邊烏柏根研汁十五塊丸即通

治諸損傷

出永類
鈴方

草藥捷徑毛蛇藤存血瘀多一兩打破大青根半兩
化氣矮樟柳半兩熟骨草半兩作葱七寸長七莖住
痛多加紫金藤又名山甘草用一兩可加薑三兩拌
和牛膝根半兩消血瘀加用過路蛇蛇節過墻楓一

兩松圍圍一兩左纏接骨一兩右生研酒浸開去滓

加童便服體弱溫熱服有瘀血在內麻油葱同酒後

入滓盒傷處皮破血不出用貼

六神丸

出楊氏家藏方

治打撲閃胸墜車馬傷折筋骨瘀血不

出腹脹氣滿不得安卧

當歸

洗焙

沒藥

研

水蛭

火燒焦

附子

炮

川烏頭

炮去皮臍以上

五味各一兩

草烏

二枚炮去皮臍

右件並為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十

丸加至五十九溫酒鹽湯任下如傷折筋骨酒熬膏

子調藥攤故帛上貼之

治卒血攻心被打內有瘀血

出本草

以人尿煎服之一服一升

治撲損瘀血暈絕及困乏皮膚皸裂及蛇犬等咬

右並用熱尿淋患處

治逐瘀血

用青麻皮淋湯於損處濯洗瘀血即散

麻皮乃今人績布麻種子

也

治打撲傷損瘀血疼痛

用自然銅以酒磨服散血止痛續筋

自然銅出信州鉛山縣銀場銅

深坑中深山有銅鑛多年鑛氣結成似馬屁勃色紫而重食之味澁是自然銅也

治瘀血不散變成癰者

用生菴藎子味苦温搗取汁一升服之

治打磕損心腹血瘀傷折筋骨疼痛金刃所傷不可忍者

用沒藥一味量病輕重温酒服佳

傷折風腫 附論

凡肢節傷折皮肉破裂久而未合為外風所觸則令肌肉受寒既不得收斂又與血氣相搏不得消散故肉為風腫不散即便膿血敗壞也

方

沒藥散 出聖濟總錄

治傷折風寒所侵風腫不消

沒藥 研 當歸 焙切 芎藭 白芷 甘草 炙 椒 去目并閉口炒

出桂皮去粗皮附子炮製去皮檳榔生剉各半兩

右為散每服二錢温酒調下不拘時候

續斷湯出聖濟總錄 治因傷折風冷所傷發為風腫痛疼

續斷 熟地黄焙 澤蘭葉 當歸切 芎藭 烏頭

炮製去皮 桂去粗皮 各一兩

右為粗搗每服三錢水一盞煎七分去渣温服不拘

時

當歸湯出聖濟總錄 治傷折皮内破裂風毒攻腫痛不消

當歸切 大黃剉 白芷 防風去蘆 烏頭炮製去皮

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘

時候

荆芥散出聖濟總錄 治傷折風腫

荆芥穗 當歸切 續斷 芎藭剉各一兩

右為散每服三錢温酒調下不拘時候

地黄散出聖濟總錄 治傷折風冷所侵皮肉不合腫痛

熟乾地黄焙 當歸切 獨活去蘆頭 各一兩

右為細末每服二錢温酒調下不拘時候

黃蠟膏 出聖濟總錄

治傷折風腫疼痛

黃蠟 五兩 去粗皮

吳茱萸 炒為末 各一分 鹽一分 火燒

右搗蘿三味為細末鎔黃蠟并麻油五兩與藥末同煎數沸攪勻傾出磁盒收之每用看所傷大小攤貼

頻易之

玉真散 出永類鈴方

治破傷風及打撲傷損

天南星 湯浸去皮臍

防風 去蘆

右為等分為末如破以藥貼瘡口上後以生薑自然汁少許温服調一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢用童子小便調下或鬪打傷損以二錢温酒調下傷重至死但心頭温以童子小便調二錢灌下併三服可活

杏仁膏 出聖濟總錄

治傷折風腫

以杏仁湯浸去皮尖雙仁炒三兩細研如膏塗腫處外以帛縛頻易

大豆膏 出聖濟總錄

治傷折皮肉裂風傷成腫及被打擊

頭眼青腫以大豆畧炒去皮不拘多少搗羅為末薑

汁調如膏塗腫處頻易一方用水調塗

荆芥子塗方 出聖濟總錄

治傷折皮肉破裂腫痛

用芥子細研不拘多少醞醋調塗腫處頻易之

治諸風折傷損 出永類鈴方

乾薑

洗一兩半 僵蠶 生水洗

木鱉

水洗去殼二兩

獨活

三兩 藁本

乳香

水浸半兩

沒藥

水浸一兩二味別研

撫芎

製枳殼

赤芍藥

破故紙

炒續斷酒浸

黑牽牛

穿山甲

灰炒各二兩

白芷

肉桂

良薑

淨細辛

當歸 酒浸

川牛膝

酒浸焙各一兩

羌活

半兩 草烏

去皮尖三兩半

蒼朮

炒半斤 骨

碎補

炒去毛三兩

海桐皮

酒浸炒三兩

附子

川烏

炮各一箇

後二味看虛實加右為末每藥味一斤用麩二兩酒

水煮糊丸如梧桐子大每服二十九壯實加二十五

丸有臂脾頭痛生葱薑酒細嚼吞下兩脇腰腿疼痛

尚香薑酒空心下脚膝痛腫木瓜薑酒下四五月加

荆芥春月去破故紙夏月去牽牛

羌活飲

出聖濟
總錄

治傷折骨論瘡腫者慎不可當風卧

眠取涼為風濕所傷則發瘰口噤殺人若已中風覺

頭項強身中拘急宜服此

羌活

去蘆頭
一兩

竹瀝

三錢

右將羌活粗搗篩以竹瀝同煎去滓分三服温服若
口噤者掘口灌之作竹瀝法可將十餘莖新竹青每
莖一尺五寸截斷用火炙逼中央使兩頭取其汁瀝

別作數束燒取汁亦可救急立驗

治諸風損傷折踈風順氣勻血住痛

出永類
鈴方

當歸

一兩
半

川芎

一兩

白芷

杜烏藥

木瓜

牛膝

各一
兩半

京芍藥

牡丹皮

淨陳皮

淨細辛

延

胡索

炒川續斷

茴香

炒破故紙

石菖蒲

水

蛭 穿山甲

蚌粉

炒各
一兩

交趾桂

七錢

桃仁

炒去皮
半兩

粉草 兩 五加皮

二兩酒浸
或加丁皮

檳榔

和殼

製各
一兩

吹咀薑酒浸沒乳各半兩加入或加老松節炒烏豆

老薑煮酒服

當歸散

出永類
鈴方

治諸風損傷折或作癰疽或因損中

風緩勞役所損

澤蘭

當歸

牛膝

續斷

各十兩

細辛

芍藥

白芷

川芎

肉桂

各五兩

桔梗

甘草

各四兩

川烏

川椒

白楊皮

三兩或不用

右為細末酒調下

乳香散

出永類
鈴方

治証同上

乾薑

肉桂

各三兩

牛膝

羌活

川芎

杜細辛

薑黃

芍藥

草烏

川烏

各四兩

骨碎補

當歸

蒼朮

木鱉肉

各六兩

沒藥

五兩

何首烏

十四兩

桔梗

十兩

乳香

半兩

赤小豆

一升

白芷

海桐皮

二兩不用亦可

右為細末酒調服

治諸損紅黑二散

出永類
鈴方

當歸

川芎

白芷

陳皮

赤芍藥

牡丹皮

茴香

桂柳

各一兩

嫩松香

蒸過去毛

杜當歸

各四兩

生地

黃三兩研草烏酒醋炒自然銅酒醋淬蒼木良薑

骨碎補製各二兩杜獨活四兩柘木灰松香紅藥加倍各作黑末

隨病重輕打和茴湯或薑葱酒調常合和劑石南丸

兼服

又方出永類

草烏細辛羌活獨活白芷牛膝白

膠香五靈脂藁本川芎甘草茴香

藿香各三兩石南藤木瓜自然銅骨碎補

乾薑當歸肉桂各等分

細末酒調通用如傷重去石南藤加杜當歸脚腫傷
加木瓜手傷重加木鱉子腰傷重加茴香牽牛夏月
減薑桂加百藥煎石南藤秋單接骨散薑黃骨碎補
炒無名異煨生地黃生薑各自然汁一兩為末酒調
外用生薑癩蝦蟆一箇研如泥敷貼

頭傷腦髓出附論

凡腦為物所擊傷破而髓骨出者治藥宜速蓋頭者諸

陽所會腦者物所受命若擊破髓出稽於救治斃不旋踵宜速以藥封裏勿為邪所中調養榮衛安定精神庶幾可活若其證戴眼直視不能者不可知

方

豚血灌方

出肘後方

治頭為物所擊腦破髓出悶絕但有

氣在心者

以豚子血一合如無豚子猪血亦得每得少許灌腦中立醒

水銀方

出肘後方

治腦破髓出欲死宜服

以水銀二錢每用一錢許服之即活須臾未覺再服

大豆酒

出聖惠方

治頭破髓出中風口噤

以大豆汁一斗搗碎安甑上蒸之熟以酒一斗淋下每服一盞連二五服取汗為效

傷墮致損吐唾出血

附論

凡墮墜打撲內動心氣榮衛氣血不至為患多矣若暴損胸脇氣留肩膜損血入胃停積不去甚者欬唾吐血

治法當調其榮衛緩其中逐去損血

方

阿膠丸

出聖惠方

治從高墜下傷折腕損內傷五臟微者

唾血甚者吐血

阿膠

三兩搗碎黃炒令燥

肉苁蓉

酒浸一宿刮去皺皮炙乾

川椒

去目及閉口者

微炒出汗

白芍藥

當歸

剉微炒

芎藭

延胡索

熟地

黃

桂心 川大黃

剉碎微炒

黃耆

剉各一兩

艾葉

一兩半微炒

牡丹

附子

炮製去皮臍各一兩

牛膝

去苗一兩

右為末先用酒一升煎三五沸將一半藥末入酒內

調麪糊以慢火煎令稠入餘藥末和搗三二百杵丸

如桐子大每服以豆淋酒下三十九日三四服

雞蘓湯

出聖濟總錄

治墜馬跌損內傷吐血暴熱背上煩

熱心中欲吐喉內先覺血腥氣者

雞蘓

二兩半

地黃汁

合五

桑根白皮

剉各一兩

生薑

合五

葛根

剉紫蘓根

切

淡竹茹

各二兩

右除生薑地黃汁外粗搗篩每服五錢以水一盞半

煎取一盞去滓入地黄生薑汁各半合更煎三五沸去滓溫服每食後一服

消血散 出聖濟總錄

治從高墜下內損吐唾出血兼腹中

瘀血

蒲黃 當歸

切焙 乾薑

炮桂

去粗皮各一兩

蜜蠶

去足翅炒一分

大

黃

蒸剉一兩半

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

阿膠湯

出聖濟總錄

治傷折血滯在內吐唾中血出不止

阿膠 炙令燥

熟乾地黄

焙

赤芍藥

當歸

切焙

芎藭 各一

兩乾薑

炮半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

艾葉湯

一名艾葉散出聖惠方

治墜墮擗撲內傷臟氣吐唾出

血甚者吐血及金瘡傷紅血不止

艾葉

炒半兩

白芍藥

三分

熟乾地黄

焙一兩

乾薑

炮半兩

阿

膠

炙令燥一分

甘草

炙一分

一方有竹茹

一分

右粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

蒲黃湯 出聖濟總錄 治打撲一切損傷血瘀時吐唾中出血

蒲黃 二兩 當歸 切 桂皮 去粗 人參 檳榔

右為細散每服三錢溫酒調下不拘時候

加味芎藭湯 出醫方大成 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或如豆汁因墜墮閃胸致傷五臟損裂出血

停留胃脘臟熱則吐鮮血臟寒則吐瘀血此名內傷
川芎 當歸 白芍藥 百合 水浸半日 荊芥穗 各等分

右為剉散每服四錢水一盞酒半盞煎七分去滓不拘時候

甘草湯 出聖濟總錄 治墜撲傷損肺氣咳唾出血

甘草 一兩 白茯苓 去黑皮 人參 一兩 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒

研三分

右除杏仁外粗搗篩入杏仁拌勻每服三錢水一盞

煎至七分去滓温服不拘時候

桂心湯

出聖濟總錄

治墜墮內損吐血唾出血兼腹中瘀血

桂

去粗皮

當歸

切焙

蒲黃

各一兩

大黃

切焙半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分臨熟入地黃汁少許攪勻去粗温服不拘時候一方用淡竹葉切

代竹茹

黑神散

出朱氏集驗方

治傷損大吐血或因酒飽低頭掬損

吐血至多并血妄行鼻口俱出但聲未失者無不有

效

百草霜

蚌粉

各等分

右為末每服一二錢糯米飲調下側柏枝研汁其效尤速鼻衄搗一字皮破灸瘡出血舌上出血乾滲之

治墜損傷內或時吐血心煩疼痛

出聖濟方

蒲黃

一生地黃兩

右將生地黃入童子小便三合爛研絞汁於銀器中入蒲黃相和慢火煎一兩沸分為三服食前服之

胡粉散 出肘後方

治從高墜墮吐唾出血面青氣短及瘵

血搶心

以胡粉一兩研細每服一錢溫水或酒調下

治墜落車馬間心腹積血唾吐無數方 出聖惠方

取乾藕根為末以酒服方寸七日三如無取新藕汁

服之

治從高墜下傷折疼痛煩悶啼叫不得眠卧方及腕折

四肢骨破或筋傷蹉跌方 出聖惠方

右取鼠屎燒為灰細研以猪脂和塗痛上即以物急

裏之搗地黃一把須以酒漬稍稍飲之即愈

黃芪湯 出楊氏集驗方 治傷損大吐血或因酒食飲低頭掬

損吐血至多并血妄行口鼻俱出俱聲未失者即效

枳實 三十箇炒為末 黃芪 二兩 甘草 半兩 紅棗 三十個同枳實末搗爛慢火焙

焦黃

右為末用米飲調下二錢食後服

治墜損筋骨蹉跌骨碎破 出本草

用生地黄熨熱裏三日夜數易若血聚以針決之

杏枝酒

出聖惠方

治墮傷及墜馬撲損瘀血在內煩悶

以杏枝掘水一大升煮半升酒三合分再服大效其

實可多食傷神損筋骨一方取東引杏枝三兩細剉

微熬好酒二升煎汁餘沸去滓温分二服如人行二

三里再服

諸骨蹉跌

附論

凡墜墮擗損撲骨節閃脫不得入臼遂致蹉跌者急須

以手揣搦還復關紐次用藥調養使骨正筋柔榮衛氣
血不失常度加以封裹膏摩乃其法也

方

當歸膏

出聖濟總錄

治骨出臼蹉跌不復疼痛

當歸

洗切焙

續斷

剉

細辛

去苗葉

木通

剉一作通草

白芷

芎藭

剉

甘草

剉

蜀椒

去目及閉口者

牛膝

去苗

附子

去皮臍生切各

一兩

右粗搗用猪脂半斤先煎取油次下諸藥煎如膏以

絹濾去滓磁盒盛每用少許抹損處熱手摩之

地黄散 出聖濟總錄

治諸骨蹉跌補絕傷

生地黄 焙 桂皮 去粗 乾薑 炮 芎藭 甘草 炙 當歸 切

芍藥 各一兩

右為細散每服二錢溫酒下不拘時候

烏頭散 出聖濟總錄

治諸骨蹉跌脫臼疼痛兼傷折惡血

結滯腫痛

草烏頭 去皮尖微炒 細辛 去苗 獨活 去蘆 蛇床子 炮各半兩 吳

茱萸 炒半兩 葱 二十莖 生薑 四兩

右搗篩前五味為末次將生薑葱二味細研後入藥

末同和勻令乘濕攤絹帛上裏傷處日一易

羊脛膏 出千金方 治四肢骨碎筋傷蹉跌

羊脛 一兩 髮灰 胡粉 胡桃脂 各半兩

右搗和調如膏敷上生布裏

大豆湯 出聖濟總錄 治諸骨蹉跌補傷絕

大豆 炒去皮 大黃 炮 生乾地黄 焙 桂 去粗皮各一兩

右粗搗篩每服三錢酒水共一盞煎至七分去滓温服不拘時候

大黃散

出聖濟總錄

治諸骨蹉跌血瘀腫疼痛

大黃蒸切大豆

炒去皮各二兩桂一兩去粗皮

右為細散每服二錢温酒調下日三服忌生葱

地黃敷方

出聖濟總錄

治骨節蹉跌内傷疼痛

生地黃

二斤洗研

芥菜子

研四兩

右細研和勻入酥四兩同煎服乘熱敷損處或以帛

繫之日一易

療腕折四肢骨碎破及筋傷蹉跌方

出本草

右搗大豆末合猪脂和塗之乾即易之

治失頰欠車蹉開張不合方

出千金方

一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出

其指恐誤齒傷人指也

治失欠頰車蹉方

出千金方

用消蠟和水敷之

沒藥膏

出御醫院方

治筋骨閃胸疼痛

沒藥

乳香

研虎骨酥炙各半兩

吳茱萸 白芥子

白芨

白欬

米粉各一兩

生薑汁

酒

各五合

右為細末生薑汁并酒並煎至七合旋入藥末調勻

乘熱攤紙上敷痛處一日一換用綿裏護

鯪鯉甲骨貼膈膏

出御醫院方

治閃胸疼痛

桂皮

去粗切焙各一兩

當歸

麵一匙

鯪鯉甲

醋塗炙三兩

附子

生去皮臍一兩

生薑汁

生地黄汁

右除汁外搗為細末將地黃汁生薑汁各拌和勻煖

酒調藥加膏攤於軟紙上乘熱敷貼患處用綿繫衛

每日一換

乳香丸 治閃胸脚氣疼痛等病

白膠香

四兩為末

草烏

二兩

赤小豆

半斤

白芍藥

二兩

木鱉子

三加乳香沒藥

各二兩

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服三四丸温酒

任下或木瓜湯亦可隨病服

松節散 出御藥院方

治閃撲筋骨腫痛

松節 桑白皮 蠶砂 香附子 朴硝 各等分

右為粗末每用藥一兩水一碗半煎至一碗熱滯痛處

輕體丸 治一切胸閃筋骨疼痛並宜服之

乳香 沒藥 各一兩 草烏 山梔子 芍藥 各二兩

右為細末用酒麵糊丸如梧桐子大每服十九丸溫冷酒送下

生熟地黃散 治閃胸腫痛

生地黃 熟地黃 桂 白芷

右等分為末酒調服

紫金膏 治腿脚閃胸

紫金皮 六分 乳香 一分 木鱉子 麝香 少許

右為細末生薑自然汁調成膏攤紙上貼患處

應痛散 出傳信適用方 治身體四肢無力主宣通經絡使氣

血和暢

延胡索炒 當歸去蘆 桂去皮 等分

右為細末以酒調下不拘時候每服三錢或四五錢量病如何用藥多少頻進些酒亦隨人量以知為度尋常閃着筋力挫氣疼痛一服即效

壯骨丹 治胸閃筋脉無力不能健者並宜服之

赤麴 芸香各二兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三四十九用酒送下

杜仲散 治一切諸氣閃胸腰脚不能轉側

杜仲二兩去粗皮剉碎生薑自然汁浸一宿慢火炒 蒔蘿一兩微炒

右細末每服二錢温酒調服閃胸氣痛陳皮湯下心氣脾疼煨薑湯下婦人血氣艾醋湯下小腸氣茴香湯下

沉香丸出聖惠方 治踈折損傷落馬墜車蹉跌筋骨俱碎

黯腫痛疼煩悶宜服補筋骨益精髓通血脉止疼痛

沉香一兩 肉苁蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾 牛膝一兩去苗 當歸一兩

劉微虎脰骨二兩塗酥栗子二兩去殼炒木香一兩骨碎炒

補附子炮製去皮脰脰酒刷微炙甘草一分微炙赤劉

續斷一兩熟地黄湯浸去皮尖雙丹皮敗龜塗酥炙黃耆劉桃仁劉

仁麩炒微黃大黃劉碎微炒各一兩川

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不拘

時候以温酒下三十九

黑散子出聖濟總錄治腕折筋骨疼痛

香附半兩火煨烏頭燒灰芎藭存性敗龜酥炙各赤

芍藥酒浸沒藥研自然銅火鍛醋地龍去土乳香

研當歸切片酒骨碎補桂皮去粗白芷各一兩半

右為散每服二錢熱薑酒調下不拘時候

乳香膏出聖濟總錄

乳香三兩沒藥二兩二味劉如皂子大用生絹銅錢

四十九火煨蜜陀僧雄黃各半甜瓜子當

醋淬數遍搗末歸切骨碎補虎骨酥黑狗頭骨牛骨人骨

普濟方

五十七

木鱉子 麒麟竭 各一分

右為末拌勻入絹袋子內蒸如餲以磁器內盛如有傷折者旋取丸如菉豆大每服二十九溫酒下

琥珀丸 出聖惠方

治傷折腕損及理血補骨髓

琥珀 一兩 鱉甲 一兩 塗酥炙 牛膝 三分 白芍藥 三分 白

蒺藜 三分 微炒去刺 菴間子 三分 鹿茸 三分 去毛塗酥炙微黃 川大黃

三兩 剉 當歸 一兩 剉 黃耆 一兩 剉 附子 三分 炮製 桂

心 三分

右為末煉蜜和搗三二百丸如梧桐子大不拘時候以溫酒送下二十九

黃耆散 出聖惠方 治腕折筋骨傷碎癢腫疼痛

黃耆 各三兩 芍藥 各三兩 當歸 乾地黄 通草 各三兩 大

黃 一兩 桂心 附子 續斷 乾薑 各二兩 蜀椒 合 烏

頭 半兩

右治下部先食酒服五分日三千金方無大黃

芍藥散 出聖濟總錄 治腕折疼痛

赤芍藥 黃耆 剉各二兩 附子 炮製去皮臍 當歸 切焙 續斷 剉

桂 去粗皮 羌活 去蘆頭 虎骨 酥炙 蜀椒 去目并閉口炒出汗 大黃 生

烏頭 炮製去皮臍半兩

右為散每服二錢溫酒調下不拘時一方無大黃

延胡索散 出聖惠方 治腕折筋骨疼痛

延胡索 橘子仁 蒲黃 薑薑子 當歸 切焙 虎

脛骨 酥炙各一兩 桂 去粗皮半兩 牽牛子 三分一半生一半炒

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候

沒藥散 一名虎骨散出楊氏家藏方 治閃胸折傷及風濕客搏筋

骨疼痛

沒藥 研 麒麟竭 丁香 炒 虎脛骨 酥炙各半兩 乳香 分

骨碎補 別研 桑根白皮 剉焙 赤小豆 各二兩

右為散每服二錢熱酒調下一法蘓木當歸酒調下

空心臨卧乘熱服

骨碎補散 出聖濟總錄 治腕折手足熱腫疼痛

骨碎補 去毛 當歸 切焙 芎藭 剉 桂 去粗皮 蒲黃 蜀椒 去目

及閉口炒出汗各一兩

澤蘭葉

沒藥

研各一兩

右為散每服二錢温酒調下不拘時

槐子膏 療折腕傷筋骨

槐子中仁

秦芫

白朮

續斷

各一兩

桂心

分六巴

豆

十枚去皮心熬出汗

大附子

一枚炒

右以咀以醇酒苦酒漬一宿以煉成猪脂二斤同煎

三上三下後膏成絞出滓温酒服杏子一枚日三并

塗敷忌葱冷水蘆笋桃李猪雀物肉

止血散

出聖惠方

乾蝙蝠

三枚燒灰

代赭

一兩燒令紫色

頭髮

三兩燒灰

紅藍花

一兩入鹽

一分炒令黃

蝟皮

一兩半燒灰

右為細末敷瘡上其血立止

青金散

出聖濟總錄

治腕傷骨折

生龍腦

別研

麝香

一兩別研各

丁香

炒為末

虎脰骨

白者燒灰各一

兩 鯨鯉甲

燒灰二兩

右將鯨鯉甲虎脰骨灰丁香末同研極細次下龍腦

麝香和研令勻磁盒盛每服半錢用小黃一合煮粥入醋少許攪勻下藥又取藥隨所傷多少用帛子攤裏經宿一換

接骨膏

出聖惠方

治腕折傷筋骨疼痛不可忍

獼猴項骨

二兩

水獺骨

一兩

猫兒項骨

二兩

龜殼

二兩

右細搗入餅子內不得透氣燒為灰碾為末入脰胸臍末半兩每用二錢以小黃米粥相和攤在油單紙上裏傷折處一日一易

三灰散

出聖惠方

治傷折骨碎割刺皮肉有瘡出血不止

茅根灰

三兩

牛皮膠灰

二兩

麻皮灰

二兩

右為細末敷瘡口上止血

大黃散

出聖惠方

治腕折瘀血

桃仁

四十枚

亂髮

一握

大黃

如松節一大枚

右以布方廣四寸以繞亂髮燒之吹咀桃仁大黃以酒三升煮取一升盡服血盡出或作米酒調服 肘後云仲景方用大黃三兩緋帛子如手灰亂髮如雞

子大灰又用炊單布方一尺灰桃仁四十九枚敗蒲
蓆一片長三寸切甘草一根如脂大以童子小便量
多少煎湯成內酒一大盞次下大黃分溫為三服別
剉敗蒲蓆半領煎湯以浴衣被重覆服葉項通利數
行痛楚立瘥利及浴水赤勿怪即瘥血

又方

出聖
惠方

桃仁 六十枚

大黃 六兩

桂心 二兩

右吹咀以酒六升煮三升分三服當下血瘥或為細

末以酒調服

夢授方

出聖
惠方

治腕折傷筋損骨疼痛不可忍

生地黄 一斤

切

生薑 四兩

切

藏瓜薑糟 一斤

斤

右都炒令勻熱以布裹罨傷折處冷則易之曾有人
傷折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告言
曰勿相害吾有奇方可療於夢中授得此方

又方

出肘
後方

治腕折瘀血在腹久不消時時發動者

蒲黃 一斤

當歸 二兩

右治下篩先食酒服方寸七日三

治腕折瘀血及久宿血在諸骨節及外不去時出千金方

虫蟲二十枚 牡丹皮一兩

右治下篩酒服方寸七血化為水備急方云治久宿

血在諸骨節

萵苣散出聖濟總錄

治腕折疼痛不可忍

萵苣子一兩黑色者炒 乳香半兩研

右為細末每服二錢熱酒調下不拘時服訖向痛處

卧

白礬湯熨方出十便良方

治腕折先用止痛

以白礬一味為細末每用一匙沸湯一椀泡化以手

帕子蘸乘熱熨傷處少許痛定排整筋骨次用貼藥

雄鼠糞尖者是 桂去粗皮為末

右等分研勻量傷折大小以冷水調藥末攤軟帛上

裹之須臾如火煖三日後損處極痒是筋骨生長切

不可搔搔抓其藥力常如火煖如一兩日後覺藥力

不暖即換新藥裏之

麻根汁酒方 出聖惠方 治腕折骨損痛不可忍兼打撲損

或墜墮瘀血腹滿短氣者

以大麻根及葉搗取汁飲一升無生麻酒煮乾麻汁

服或溫酒服

地黃膏 出聖惠方 治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌不歸臼

疼痛

以地黃不限多少熟搗用敷所傷損處或熬之以裏

傷處以竹片夾裏人適縛令急勿轉動一日可十易
三日瘡若血聚在所處以刀子破出血一方用好醋
熬乘熱攤於所傷處以帛繫定

鹿角散 出聖惠方 治四肢骨碎筋傷蹉跌或從高墜下被

重物頓窄得瘀血者以鹿角不限多少用桑柴灰汁
煮令微軟漉出曝乾搗羅為末以暖酒調下二錢日

三服

治閃胸腰痛不能轉側

用神麩一塊如拳大燒通紅酒二大盞淬酒中覺酒
溫便飲盡仰卧少頃取效

治踣折 出本
草

以通草煮釀酒飲之

治閃胸及傷折 出本
草

用葱白入鹽搗爛炒乘熱敷

治閃胸方 出百一
選方

用米醋糟和平胃散罨患處一方用冷水調塗

治閃出白骨即拽入之後 出百一
選方

以一色真黃土以成蒲黃生薑不曾擘開者同搗成
泥罨損處甚妙

治男子婦人閃著脚手 出本
草

用羯羊糞燒灰為末用猪脂攪和搽痛處立效

治筋骨傷或被打瘀血在腹不消者 出千
金方

以馬屎敷之或燒水煮熱敷一方用肥猪肉炙令熱
以搨上

又方 出聖惠方 治腕折瘀血

取菴藺草汁飲之子亦可為末以酒調二錢日三四服

又方 出千金方

凡被打及產後惡血及一切血皆煮續筋骨木汁三升飲之

專治閃胸擔閃挫腰不可忍者不可行動者及治陰冷陽虛腰痛

破故紙 二兩

右瓦上炒香為末每服二錢酒調下不拘時一方酒浸一宿炒酒煮為丸更用破故紙少許炒為末酒調下

妙應散 出家藏經驗方 治閃胸動骨者

黃蘗 一片如掌大 草烏頭 兩筒 赤小豆 一合

右為細末以生薑自然汁調敷頻換勢退瘀止為度此方得於謝守伯任渠云昨有僧因監修造撲損用

此十數次遂安又有李享冲者溺水胸脚膝後漸愈而損處極熱微痛亟兩易之遂涼亦向安好僕亦屢試之

五白散

出楊氏家藏方

治打撲閃肭及風熱攻注一切腫痛

白朮

白芷

白欵

白殭蠶

炒去絲嘴

白芍藥

天

南星

上六味各半兩

赤小豆

合一

右件為細末以生薑汁調敷腫上乾即再敷

普濟方卷三百十一

欽定四庫全書

普濟方卷三百十二

明 周王朱橚 撰

折傷門

從高墜下

附論

黃帝曰中風有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下積於脇則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾又頭痛不可取於脰者有所擊隨惡

血留滯於內不分十二經絡聖人俱作風中肝經留於
 脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血心歸於肝不
 門何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有
 自汗但人有汗出皆為風證諸痛皆屬於肝况敗血凝
 結從其所屬入於肝也從高墜下逆其上之血氣非肝
 而何非傷寒無汗既自汗必是風化也以破血出經藥
 治之夫肝膽之經俱行於脇下經屬於厥陰少陰宜以
 柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也甘草緩

其急亦能生新血陽生陰長故也為臣穿山甲栝樓根
 桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗血為
 之使氣味相合使血氣各有所歸痛自去矣

方

蒲黃散

出聖惠方

治從高墜下落馬墜車輾着腕損骨碎

筋傷內損惡血攻心悶絕坐卧不安宜先湏按摩排
 正筋骨宜服此藥止痛散血

蒲黃 一兩 當歸 三分 桂心 三分 玄胡索 一兩 芎藭 三分 赤芍藥 二

一兩 菴藺子 三分 沒藥 一兩 附子 一兩 炮製 栗子 二兩 去壳陰乾

川大黃 一兩 剉 雲薑子 一兩 碎微炒

右搗羅為散每服以溫酒調下二錢不拘時候頻服

沒藥散 出聖濟 總錄

治墜墮損傷筋骨皮肉發熱疼痛

沒藥 研 澤瀉 當歸 切 桂 去粗皮 檳榔 剉 甘草 炙 白

芷 蜀椒 去目並開口 附子 炮製去皮 芎藭 各一兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

鎮心散 出聖惠方

治因傷折後驚悸心神煩悶宜服定魂

魄

虎睛 一對 用生羊血 一宿漉出陰乾 金箔 銀箔 各五十片 細研 茯神

遠志 去心 人參 去蘆頭 麥門冬 去心 蒲黃 羚羊角

屑 各一兩 硃砂 二兩 細研 水飛過

右為末用棗肉入鍊蜜同和搗三五百杵丸如梧桐

子大每服於食後並夜卧時以茯神湯三十九

續斷散 出聖濟 總錄

治從高墜下傷損筋骨發熱腫痛

續斷 剉 生乾地黃 焙 當歸 切 芎藭 附子 炮製去皮

桂 去粗皮 各一兩 澤蘭葉 蜀椒 去目並閉口 者炒出汗 甘草 炙剉 各半

兩

右為散每服三錢温酒調下不拘時候

破血散痛湯 治從高墜馬惡血流於脇下痛甚

不能轉側妨其飲食

羌活 防風 中桂 各一錢 柴胡 連翹 各二錢 當歸

梢 二錢 麝香 少許 別研 蘇子 一錢半 一方無 水蛭 炒去烟 盡研另

右分為二服每服酒二大盞水一盞除水蛭麝香外

另研如泥煎餘藥依一大觥去滓上火令燒熱調二味饑服之

乾地黄散 治從高墜下傷損疼痛

生乾地黄 一兩 當歸 一兩剉 微炒 附子 一兩炮製 去皮臍 川大黃

半兩 續斷 半兩 桂心 一兩 琥珀 半兩 枳殼 半兩麩炒 微黃穰 桃仁 一兩

湯浸去皮尖 雙仁微炒

右為細散温酒調下一錢不拘時候

芎藭散 治從高墜下車馬諸傷踉折疼痛不可忍

芎藭 延胡索 桂肉去粗皮 桃仁湯浸去皮尖 生

乾地黄 附子炮去臍皮 澤蘭半兩 虎脰骨二兩塗酥炙黃

當歸二兩對微炒

右為細末温酒調下二錢不拘時候

大膠艾湯 治男子傷絕或從高墜下傷五臟微者唾

血及金瘡傷經者

阿膠 艾葉 甘草 當歸 芎藭各一兩 乾薑一兩

乾地黄 芍藥各三兩

右以水八升煮三升去滓內膠令烊分服羸人分三

服兼治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激

痛下血不止

復元活血湯 治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不

可忍

柴胡五錢 當歸三錢 甘草 穿山甲炮 紅花 瓜樓根

各二錢 大黃酒浸一兩 桃仁去皮尖五子個

右桃研爛餘藥剉如麻豆大每服一兩水二盞半酒

半盞煎至七分去渣溫服食前以利為度得利後痛或不盡服乳香神應散方見本類後 黃帝鍼經云有所墮墜惡血流內若有所大怒氣上而不行下于脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陰宜以柴胡為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血甘生血陽生陰長故也為臣穿山甲瓜樓根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為之使血味和合氣血各有所歸痛

自然去矣

接骨丹 治從高墜墮傷損疼痛

當歸 切焙 二兩 甘草 剉炒 三兩 桂 去粗皮 一兩半 沒藥 另研 各半 乳香 另研 各半

澤蘭 一兩 自然銅 火燒紅 煅七次 一兩 研

右為細末入研藥令勻水麪糊和丸如梧桐子大每服三十九溫酒調下不拘時候日進三服

牽牛子散 治從高墜下傷折有瘀血不散脅肋疼痛

牽牛子 生取 末 當歸 切焙 各一兩 檳榔 剉 桂 去粗皮 木香 炮 各

半郁李仁湯浸去皮細研

青橘皮湯浸去皮白各一兩

右為散和勻每服一錢空心温酒調下取瘀血為效

外以敗龜膏貼方見本類後

附子散 治從高墜下落馬車碾一切傷折理血止痛

附子炮製去皮臍 沒藥 蒲黃 當歸 芎藭 薑黃

赤芍藥已上一各一兩

右為細散温酒調下二錢不拘時候

接骨草散 治從高墜下損骨折筋傷

接骨草 巴戟各二兩 紫葛根剉去根 丁香

續斷 阿魏麵裹煨麵熟為度已上各一兩

右為細散温酒調下二錢不拘時候

沒藥膏 治從高墜下傷損筋骨打破皮肉疼痛

沒藥 當歸剉微炒 麒麟竭 蒲黃 牡丹 骨碎

補橘仁微炒各一兩

右為細末以温酒調下二錢不拘時候

葵根散 治從高墜墮損車碾馬墜筋骨蹉跌甚者大

小腸不通皆被瘀血與衛氣不和致令不通

葵根一兩 木通 蘧麥 川大黃剉碎微炒 甘草半兩

災微赤剉 麤葱葉並根一兩

右擣粗羅為散每服四錢以水一盞煎至六分去粗不拘時候溫酒調下滑石末一錢

桃仁湯 治從高墜下落大木車馬間胃腹中有血不

得氣息者

桃仁四十枚 大棗二十枚 大黃 硝石 甘草各一兩 蒲

黃一兩半

右呔咀以水三升煮取一升絞去粗適寒溫盡服之當下不止清麻汁一杯飲之即止

乳香神應散 治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛

者

乳香 沒藥 雄黑豆 桑白皮 獨窠栗已上一各一

兩 破故紙炒三兩

右為末每服五錢醋一盞砂石器內煎至六分入麝

香少許溫服

巴戟湯 治從高墜下及打撲內損昏冒嗜睡不能飲食此謂血閉及臟腑不通

巴戟

去心半兩

當歸

地黄

芍藥

川芎

各一兩

大黃

半兩

右為粗末水煎服以利為度

桃仁散 治從高墜下傷損腹中瘀血滯疼痛

桃仁

湯浸去皮尖生研細半兩

當歸

搗末一分

牽牛子

生搗末半兩

琥珀

末一分膩粉一分

右研令勻分為二服生地黃二兩生薑一兩切細炒令紫色入小便一小盞酒一大盞煎至一大盞去滓空心調下一服當取下惡血疼痛立定

雲臺散 治從高墜下墮損惡血在骨節間疼痛

荆芥

藕節

各二兩陰乾

淨雲臺子

馬齒莧

陰乾

川芎

硝

各一兩

右為細末用蘇枋木半兩酒一大盞煎至七分調下

二錢不拘時候

敗龜膏 治從高墜下傷折有瘀血不散脇肋疼痛名一

靈龜膏

敗龜 酒浸炙 二兩半 大黃 生剉 一兩 木鼈子 去壳研 二兩 當歸 切焙 一兩

桂 去粗皮 二兩

右為末好酒一升煎至半升住火酒稍冷入藥末半兩以柳本裨不住手攪成膏以油單紙上攤貼傷損痛處立效

阿膠湯 治從高墜下傷五臟微者唾血甚者吐血及金瘡傷經崩中皆主之

阿膠 艾葉 乾薑 各二兩 芍藥 三兩

右以咀以水八升煮取三升去滓內膠令稍和分二服羸人分三服兼治女人產後崩傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止者服之悉愈

蒲黃散 治因墜墮內損血結不行

蒲黃 當歸 切焙 赤芍藥 剉 桂 去粗皮 各一兩

右為細末每用二錢温酒調下不拘時候

接骨散 治從高墜下馬逆傷折筋斷骨碎痛不可忍

接骨續經止痛活血

方見本門接骨類一名神授散

奪命散 治金瘡打損及從高墜下木石所壓內損瘀

血心腹疼痛大小便不利氣絕欲死

大黃 黑牽牛皮

各二兩

水蛭

石灰熅火炒令焦黃色半兩

右為末每服三錢熱酒調下如人行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之須臾轉下惡血成塊成片

其惡血盡即愈

當歸湯 治從高墜墮傷損肢體發熱疼痛

當歸

切焙四兩

大黃

生剉二兩

生乾地黄

焙五兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓温服不拘時候立效

蘇合香丸 治從高墜下挾驚悸血氣錯亂昏迷不省

急服大效

方見諸氣門

沒藥散 治被重物壓竿傷筋骨疼痛血不散

沒藥 虎脛骨 塗酥 炙黃 當歸 剉微 炒 延胡索 各二兩 補骨

脂 白芷 生乾地黄 微炒 川大黃 剉微 炒 蒲黃 微炒 獨

頭栗子 黃乾者 各一兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

雲薑子散 治壓竿傷損筋骨或墜墮內損瘀血攻心

腹脹滿悶亂下惡血

雲薑子 沒藥 蒲黃 膩粉 各一分 水蛭 七枚 炒

生薑汁 一合 酒 二合 生地黄汁 四合 川大黃 半兩 剉碎 微炒

右除汁藥外為細末研入膩粉令勻先將地黃生薑

等汁及酒同煎三兩沸調藥散二錢空心服之當轉

下惡血疼痛立止矣

桃仁散 治被壓竿損瘀血在腹中疼痛不散心胃短

氣大小便不通

荊芥 半兩 大黃 生用 各二兩 芎藭 木通 當歸

桂 各一兩 桃仁 四十枚 湯浸 去皮尖 麩炒

右為細末每服二錢酒調下不拘時候微利為度

又方 出聖惠方 治壓竿傷損筋骨或墜墮內損瘀血攻心

腹脹滿悶亂下惡血

水蛭 七枚炒令微黃 硃砂 三分 膩朴 二分 蚤蟲 七枚去翅足炒微黃 乾

漆 半兩搗碎 竈突墨 半兩

右為細末不拘時候以溫酒調二錢

又方 出肘後方 治被竿墜墮丹紅車碾馬踏牛觸胃腹欲

陷四肢摧折氣悶欲死

以烏鷄一雙合毛杵一千二百杵好苦酒一升相和

得所以新布搗病上取藥塗布以乾易覺寒振欲吐

不可輒去藥須臾復上一隻少則再作並以地黃酒

佳

荊芥湯 出聖濟總錄 治墜墮損煩悶 方見本門傷墮致損吐唾出血類

蒲黃散 出千金方 治從高墜下有瘀血

蒲黃 八兩 附子 一兩

右為末酒服方寸匕日三不知增之以意消息

導滯散 出聖惠方 治傷重物壓竿或從高墜下作熱五內

吐血不禁或瘀血在內胸腹脹喘麤氣短崩中方

當歸

大黃

或加桃仁或蘇木或芒硝亦可如大便實可加大黃半兩別後下

右等分炒為末溫酒調下每服二錢不拘時候或叵咀水酒各一盞煎一盞空心服

鷄鳴散

出醫方大成

治從高墜下及木石所壓凡是傷損

瘀血凝積氣絕欲死並久積瘀血煩躁疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈推陳致新治折傷神效

大黃

一兩酒蒸

杏仁

三七粒去皮尖

應驗加紅花

一錢當歸

二錢

右研細酒一盞煎至六分盪去滓鷄鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急擘開口以熱小便嚥之

麝香散

一名接骨散出肘後方

治從高墜下及打撲傷損

麝香

水蛭

各一兩

右用水蛭剉碎炒烟出研為末入麝香再研勻每服酒調一錢當下蓄血未效再服又治折傷用水蛭熱酒調一錢食須知痛更進一服痛止便將折骨藥封

直至平安方去

地黄糟裏方

出聖濟總錄

治墜墮撲損筋內疼痛瘀血凝

滯腫熱不消

生地黄

洗切細杵

酒糟

各一斤

右拌和令勻隨腫處用藥逐旋以大椀盛甑上蒸熱用布絹之類裏腫處日一易

桃仁散

出聖濟總錄

療從高墜下傷內血在腹聚不出療

下血方

取好大黃

二兩

桃仁

三十枚去皮尖

右搗以水五升煮取三升分為三服去血後作地黃酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下之虛極殺人也或用酒一椀煎去滓服之

治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

出危氏方

用木香調氣散加紅麴末少許童子小便同酒調空心熱服如無麴酒亦可

治破血從高墜下損瘀血在腹刺痛

出本草

以蒲蓆亦可當用此蒲合卧破敗者良取蒲黃赤芍

藥當歸大黃朴硝煎服 一方蒲蓆燒
灰二錢酒服

橘子酒 出聖濟
總錄 治墜墮打撲閃胸腰痛惡血蓄瘀痛

不可屈伸以橘子炒去皮破細每服二錢酒調未止

再作或用猪腰子一隻去筋膜破開入藥用葱白苗

香鹽濕紙裏煨熟細嚼温酒下一方治氣滯腰痛橘

核炒香研酒濾去滓下青本香丸一方橘核入大蒜

內濕紙裏煨令香熟酒吃一半盞研爛入少炒麩為

丸用蒜白炒酒吞下俱治風氣腰痛及胸閃腰痛

豆汁方 療足痛從高墜下瘀血脹心面青氣短欲死

又用大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之一方以

大豆五升水一升煮二升去豆服令盡或黑豆炒熱

水煎服麩如芎藭芍藥酒煎更妙

又方 出朱氏
集驗方 治墜墮跌折瘀血留血衄鼻吐血

用生地黄搗取汁服一升或二升尤佳一方用米醋

調敷瘡上

又方出本草 治從高墜下瘀血脹心面青短氣者

用烏鴉翅羽二七枚燒末酒和服如吐血即見效如得左翅羽尤佳

又方出聖惠方 療從高墜下若為重物所頓管得瘀血

用豉三升沸湯二升漬之食頓絞去滓內蒲三合投中攪調頓服之不過三四服神良

鷄鳴散出三因方 治墜墮死

急以手袖揜其口鼻一食頃眼開先與熱小便服若

覺氣絕不能急擘開口以熱小便灌或以酒冲小便服火傷冷小便灌之皆能起死甚驗

為重物所頓竿欲死出十便良方

以半夏如大豆者為末內鼻孔中此五絕法療五絕
一曰溺絕二曰牆壁所竿絕三曰壓絕四曰自縊絕
五曰產乳絕並可用納鼻孔立活雖經一日而心溫者亦可救

竹皮湯出十便良方 治為兵杖所加木石所竿血在胸背

及脇中痛不得氣息

青竹

刮取茹

亂髮

各如鷄子大二枚

右放炭火炙焦燥合搗篩以酒一升煮三沸上一服盡之三服愈

治從高墜下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在內出本草

以鼠屎燒令末以猪脂和傅痛上急裹不過半日乃止

苦杖散

出保命集方

治從高墜下涎潮昏冒此驚恐併也

以苦杖不以多少為細末熱酒調下如產後瘀血不散或聚血皆治之

療壓撲損傷

出本草

搗入胡桃肉和酒服少頃便瘥

治人忽被墜損傷

出本草

以冷水噴之令身噤腸自入也

治墜撲內損散敗血止痛及惡瘡發背等

出本草

以重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之硝石十二兩碎搗以不津瓶器大小約可盛內茄子者于器中先鋪茄子一重乃下硝石一重覆之如此令盡然後以紙數重密封之安置淨處上下以新磚墊覆令得地氣不覆地氣至有五月後取出去紙兩重日中暴之逐日如此至二三月度已爛即開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄紙蓋頭又暴直成膏乃可用內損酒調半匙空服飲之再惡血散則痛止而愈矣諸瘡

腫亦先飲酒半匙又用膏于瘡面塗之當覺冷如冰雪瘡乾便瘥其有根本在膚腠者亦可內消若膏久乾硬即以飯飲化動塗之

整骨丸 出楊氏家藏方 治從高墜下筋斷骨折內外俱損疼

痛難忍不問輕重並皆治之

白礬 十二兩 飛過 黃蠟 六兩 黃丹 密陀僧 另研 自然銅 另研

為末已上三味各四兩 乳香 另研 硃砂 沒藥 另研已上三味各一兩 猪

脂 十二兩 臘月者

右件用銀石器或新鍋內先下猪脂熬成汁去筋膜
 滓次下蠟候鎔退火候稍冷方下蜜佗僧黃丹自然
 銅末添慢火熬以柳木篦子攪候滴入水不散為度
 擡下鍋子於冷地上入硃砂乳香沒藥白礬更以篦
 子攪勻丸如梧桐子大每服二十九熱葱酒送下葱白
切如絲于熱酒中以如昏困不能嚥藥者即用葱酒
蓋合少時勿出氣化開灌下仍將二三十丸切開于紙下以火炙之如
 不化入油少許隨所傷大小攤成藥壓面恐此藥不

粘以雲母膏塗壓面周圍貼之良久糜變成痒若骨
 碎及蹉跌者並皆平正不成蘆節其傷破處便生肌
 肉多年傷折每遇陰晦發作疼痛者亦可服不拘時
 候

又方 出永類
鈴方

用水蛭茴香各一兩先以茴香三錢同水蛭炒去茴
 香又以茴香七錢微炒共為末用水煎蘇木加酒和
 調烏藥順氣散一貼作三服又法硃砂水蛭竹膜絲

頭四味將硃砂蛭去砂用蛭為末竹絲燒灰和温酒調服

治從高墜下瘀血脹心面青氣短欲死者

用飛駁鳥味甘寒翅羽七枚燒末酒服之得右翅者最

良飛駁鳥即雄鵲也若燒作灰以右接中散解者是雄也又燒毛作屑納水中沈者是雄也又其翼左

覆者是雄

又方

用韶粉味辛寒一盞匕和水服之即瘥

治從高墜下頭破腦出血中風口噤

用黑豆味甘平一升炒去皮勿使太熟杵末蒸之氣遍

令甑下盆中以酒一升淋之温服一升覆取汁膏傅

瘡上

墜車落馬附論

夫或因乘車馬或登陟危險誤多倒仆輕則蹉跌筋脈蹴損不得伸屈甚者乃至踣折筋骨治宜速以養血脈續筋骨之劑服之則收效速矣

方

乳香烏龍丹 治落車墜馬打撲閃胸損傷筋骨疼痛
悶亂活血治疼及中風癡瘕口眼喎斜婦人血風腰
腹四肢走注疼痺等疾

骨碎補 葫蘆巴 炒 破故紙 炒 川烏 炮去皮 菴蓉 酒浸

牛膝 酒浸 金毛狗脊 牡蠣 燒赤 甜瓜子 炒 黑牽牛

赤芍藥 自然銅 燒赤醋 川練子 茴香 炒 牡

丹皮 五靈脂 白芍藥 各一兩 蒼朮 二兩去皮炒 官桂

半兩 細墨 七錢 木鼈子 七個 沒藥 二錢半 乳香 二錢

右為細末研勻醋麵糊丸如梧桐子大每服七丸至
十九丸温酒下日三

神聖膏 出德生堂 凡跌傷後用此藥敷貼仍服後藥

赤小豆 木鼈子 去殼另研 草麻子 去殼另研 羌活 薑黃

草烏 血竭 大黃 知母 白芷 川烏

白芨 白斂 防風 各一兩

右為細末和勻隨病大小用好米醋蜜調敷傷損處

乾再敷即痛止骨接

當歸散 出德生堂

治落車墜車傷損

當歸 桂心 川椒 附子

各二錢 澤蘭一錢 芎藭六錢

甘草 五錢 沒藥 乳香 各二錢 半另研

右為細末每服二錢温酒調病上食服病下空心服

日三筋骨相連二十日痊可

止痛虎骨散 出聖惠方

治馬墜傷損

虎脰骨 二兩塗酥 炙微黃 敗龜 塗酥 炙微黃 當歸 剉微炒 薑黃

陽起石 酒煮半日細研 骨碎補 自然銅 細研 赤芍藥 甜

瓜子 沒藥 各一兩

右為細末每服以暖酒調下二錢日三四服

芍藥散 治倒仆筋脈蹶損 方見本門 因胸類

芎藭湯 出聖濟總錄 治墜墮倒仆蹶損筋脈

芎藭 一兩半 澤蘭 取葉一兩 生乾地黃 焙各三分 桂 去粗皮半兩 附

子 炮製去皮臍 牛膝 酒浸切焙 各一兩 蜀椒 去目並開口者炒出汗

右剉如麻豆大每服三錢水酒共一盞煎至七分去

滓温服不拘時候

槐子煎

出聖濟總錄

治倒仆諸筋蹶損

槐子

炒為末用酒一升浸一宿

桂

去粗皮 芫去苗土

白朮

劉續斷炒

附子

炮製去皮臍各一兩

右除槐子外搗為粗末將槐子酒先煎次入猪脂半

斤再煎沸入藥末再煎絞去粗磁盒盛每服一匙温

酒調服不拘時候

虎骨散

出聖濟總錄

治倒仆蹶損筋骨疼痛

虎骨

酥炙另為末一兩

酒

一升 生地黃汁一升

右將地黃汁並酒煎沸入虎骨末同煎數沸每服一

盞温服不拘時候

當歸湯

出聖濟總錄

治倒仆蹶損筋骨疼痛

當歸

切焙二兩

芎藭

二兩

熟乾地黃

焙四兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不

拘時候

地黃酒

出肘後方

治倒仆筋蹶不得舒展及瘀血不散亦

療馬墜

生地黄洗切 酒三升

右共煎數沸去滓每服一盞溫服不拘時候

桃仁地黄酒出聖濟總錄 治倒仆蹴損筋脈

生地黄汁一酒升 桃仁去皮尖另研一兩

右將地黄汁酒煎沸下桃仁再煎數沸每服一盞溫

服不拘時候

骨碎補散出聖惠方 治一切搥損落馬輓着傷折等服接

骨散惡血

骨碎補一兩 木香半兩 蒲黃一兩 玄胡索一兩 當歸半兩 剉微炒

芎藭 桂心各半兩 檳榔一兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

虎骨散出聖惠方 治一切搥損落馬車輓失墜傷折疼痛通

虎脰骨二兩 塗酥炙令黃 桂心 牛膝去苗 菴藷子 續斷

澤蘭 郁李仁湯浸去皮微炒各一兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

赤芍藥散 出聖惠方

治墜車落馬傷折內損疼痛

赤芍藥

芍藥

桂心 各一兩

買子木

夜合花

當歸 剉微炒

骨碎補 各三兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

牡蠣散 出聖惠方

治墜車落馬傷損筋骨疼痛皮肉破裂

出血不止

牡蠣 一片濕紙裏後却以洗更裏候乾用大火燒通赤

白礬 三兩燒令汗盡 黃丹

膩粉 三兩 雄黃 細研 麒麟竭 各一兩

雌黃 半兩 麝香 二錢

細研

右為細末仍于烈日中攤曬半日後入磁餅中盛如有墮損及骨折筋斷用生油稠調塗之如已後瘡乾傅之

骨碎補散 出聖惠方

治馬墜車碾踉折呼叫疼痛聲音不絕

絕

當歸

一兩半剉微炒

骨碎補

牡丹

虎脰骨

塗酥炙 白

芷 芍藥

赤芍藥

敗蒲

燒灰各一兩

右為細末每服以暖酒調下二錢日四五服

敗龜散

出聖惠方

治馬墜傷折止痛

敗龜

塗醋炙令黃

虎脰骨

塗醋炙令黃

牡丹

赤芍藥

熟

地黃

桂心

續斷

各一兩

當歸

一兩半剉微炒

右為細末每服以温酒調下二錢日三四服

敗蒲散

出聖惠方

治馬墜傷損筋骨疼痛内有瘀血腹中

疔刺不可忍

敗蒲

剉細

舊麻甌帶

各一握剉細

亂髮

如鷄子大

當歸

一兩

剉微炒

赤芍藥

桂心

各半兩

桃仁

四十九枚湯浸去皮尖微炒

右為散每服四錢以水一小盞煎至半盞去滓不拘

時候熱服

當歸散

出聖惠方

治落車墜馬諸傷腕折臂脚痛不止呼

叫不絕服此藥呼吸之間不復大痛三日筋骨相連

當歸散昔公實錢季毅皆曾合以救人

當歸

炒

桂心

蜀椒

炒出汗

附子

各二分炮製去皮臍

澤蘭

一分

芍藥

六分

甘草

五分

右並熬令香治下節酒服方寸匕日三凡是傷損皆服之十日愈如小兒被奔車馬所損裂其膝皮內決見骨即絕死小啼不可聽開服之便睡十數日便行其效神驗如此一方有檳榔一兩忌生葱猪肉冷水菘菜海藻

五傷接骨丸

治墜馬傷折及閃肭疼痛不可忍

方見本門

打撲傷損類

五骨散

出聖惠方

治落馬墜車腕折骨碎筋傷壓損疼痛

不止

鯪鯉項骨

獼猴項骨

虎項骨

黃犬項骨

野猫項骨

各一兩

天雄

半兩炒製去皮炒

肉蓯蓉

半兩酒浸一宿刮去

皴皮晒乾

右味骨細剉用酒醋各半升浸一宿漉出炙令黃色候冷入二味藥同為細散每服二錢以溫酒調下不拘時候又將黃米半升作糊入散藥一分調之勻塗貼骨折筋傷處疼痛立止

大黃湯 出肘後方

治墮馬及一切筋骨損腹中有驚風瘀血煩悶不省人事此藥利大便去驚風活血

大黃

一兩切浸湯沈下

緋帛

如手大燒灰

亂髮

如鷄子大燒灰

敗蒲

一握

三寸桃仁四十九個皮夫去

甘草

如中指節炙剉

以用粗單布

一尺燒灰

右以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃去粗分溫三服先剉敗蒲蓆半領煎湯浴衣被覆斯須通利數行痛楚立瘥利及浴水赤勿怪即瘀血治墮馬撲傷痛不可忍者

用仙鼠屎三兩細研以熱酒投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便瘥仙屎即服屎也

療忽落馬墜車及墜屋坑腕傷身體頭面四肢內外切

痛煩燥叫喚不得卧方

出肘後方

急覓鼠屎無問多少燒末以猪膏和塗封痛處急裹之仍取好大黃如鷄子大以亂髮如鴨子大以人所裁白越布衫領巾餘布以裏髮外乃令火燒烟斷搗末屑薄以酒服日再三無越布可糲用常當預備此

物為要備急用

療墜馬內損方

取廬藥一兩搗為末牛乳一盞煎五六沸和服或六

廬藥以羊肉汁和服一日內忌菜極效廬藥見陳威本草

白膏 治一切墜落打撲及腫毒疼痛

柳白皮切半兩 白蠟四錢 鉛丹二錢 胡粉三兩 油四兩 商陸根

分切三

右先以熟油入柳白皮商陸根煎候變色去滓入諸

藥數攪良久膏成每用看腫大小以故帛或軟紙攤

貼

神異立效方 治馬墜損傷

桃仁四十九枚湯浸去皮尖研爛 川大黃一兩剉碎微炒 敗蒲 麻甌

帶各一握 亂髮如鷄子大燒灰

右為散以無灰酒三盞煎至一盞去滓分為二服食

前服

沒藥散 治馬墜撲損內有敗血疔刺疼痛不可忍者

沒藥末 麒麟竭末 黃丹微炒 白礬燒灰各一分

右為細末以溫酒調下二錢不拘時候

沒藥鷄子酒 治墮落車馬筋骨疼痛不止

沒藥半兩研末 生鷄子三枚 細酒一升

右先將鷄子開破取白去黃盛碗內入沒藥以酒暖

令熱投於碗中令勻不拘時候溫服

治馬墜傷損腰筋疼痛不可忍者

益州麻布一尺燒灰細研 蒲索一握燒灰細研此索船家名燧索如無即以蒲黃代

之川大黃三兩切細如大豆

右先以酒一大盞半浸大黃一宿煎三五沸去滓入

煎藥灰攪勻微溫分為二溫如人行三二里再服當

利出惡血片效

羊腦方 治被馬墜損腫疼痛不可忍

羊腦一兩 龜甲半斤 生地黄三兩切

右以酒醅和搗如泥微熱裹損處冷即易之

烏頭散 治一切墜馬傷折損者先服此藥然後用手

接骨

當歸 草烏 白芷 各二錢半

右為細末每服半錢至一錢用溫酒調下微麻用手整骨平正方可用藥敷貼患處

當歸導滯散 治落馬墜車打撲損傷瘀血大便不通

洪腫暗傷疼痛昏悶蓄血內癰欲死

川大黃 一兩 川當歸 一分 麝香 少許

右除麝香另研外為極細末研勻每服三錢熱酒一

盞調下食前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以接骨類紫金丹服之或以醋煎服亦可

治墜車馬間馬鞍及諸物隱體內斷疼痛方

以醋和麵塗之一方如肢體碎折者用小麥粉子炒黃好酒調熱敷杉木夾住亦可一方小麥和好醋蒸之搗爛裏所傷處一方麵和醋蒸裏傷處

治墜馬失足或為物所壓痛極不可忍

先用香白芷末和降真末等分童子小便和酒調服

二錢外以澤蘭同當歸末搗爛微炒合盒傷處止痛
治墜馬折傷

用沒藥一味能推陳置新生好血丸服皆須研爛以
熱酒調近效

治墜車落馬筋骨疼痛不止

用胡延索一兩搗羅為散以溫酒調下二錢不拘時
候

治墜馬拗損疼痛不可忍方

以桑根白皮五片為末水一斗煎成膏傅于損處已
後亦無宿血終不發動一方用桑根白皮一斤以水
三大盞酒一大盞煎取一盞去滓以故烏糞可損處
大小搵藥汁裏冷即易之十遍痛止腫消

治墜馬撲損

用稻稈燒灰用新熟酒未壓者和糟入鹽和淋煎灰
取汁以淋痛處立瘥直至骨損亦可淋好糟灰亦得
不必新壓酒也

摩風膏

出聖惠方

羌活 躑躅花 甘菊花 當歸 烏蛇 莽草

細辛

白斂

各半兩

防風

桂心

去 鮫鯉甲

各三分

附子

去皮臍

川烏頭

去皮臍

皂莢

去皮子

芎藭

白芷

露蜂房

白芨

菰蘆根

紫葛

蝟皮

杏仁

湯浸去皮尖各一分

漢椒

一兩半去目

苦參

一兩

蠟

五兩猪脂切

右細判以米醋二升拌勻經二宿後以火微微炒之令乾用猪脂和藥以慢火煎一日以綿濾於磁盒內

盛不冷水汚着如有傷折處將用摩之

挺子膏

出聖惠方

治傷折

麒麟竭 沒藥 亂髮灰 蜜陀僧 丁香 麝

香 木香 膩粉 雄黃 雌黃 自然銅 黑

狗肝膽

右各一兩細研先於鐺中鎔黃蠟然後入藥末熬鍊成膏取一小竹筒子熱灌之待冷方可取出於黃丹中出色若有患者先以熱水洗病上用生油於漆捺

中磨藥塗痛處立效

乳香膏 治傷折皮肉破冷久不合宜用長肉合瘡口

方見膏藥門
瘡腫傷折類

摩痛膏

出聖
惠方

治傷折筋骨腫痛不可忍

細辛

去苗
葉

牛膝

去苗各
半兩

駝脂

十兩

臘月猪脂

十二兩

木

鼈子

去殼

丁香

另搗
為末

麝香

另研

羌活

去蘆
頭

芎藭

防風

去
又附子

去皮臍
生用

枯薑根

右除駝脂猪脂丁香麝香外細剉以米醋二升拌勻

經三宿入鐺中炒令乾下駝脂及諸脂等以慢火再

煎候藥焦黃色即住火用綿濾去滓候下丁香去攪

勻納磁盒中盛施取摩之

治為馬墜內損

出本
草

用錦紋大黃一兩杵羅以為末用頭醋半升同熬成

膏丸如梧桐子大患者用温醋七分盞化五丸服之

良久下瘀血

長安石史君常至通衢有從後呼其姓名者曰吾無求

於人念汝有難故來救汝出一紙卷授石曰有難即用之乃治折傷內外損方書也明年因趨朝坐馬為佗馬所蹠折足墜地又躅一臂折家人急合此藥且灌且裹至夜半痛止後手足皆堅牢如未傷時方出良方

用川當歸鉛粉各半兩礪砂三錢同砂令細濃煎蘇木汁調服一大錢匕損在腰以上先喫淡粥半盃然後服藥在腰以下即先藥後食仍頻頻咽蘇木汁別以糯米飲入藥末拌和攤紙上或絹上封裹傷處如

骨碎用竹夾之乃以紙或衣物包之紙閉氣口宜紗絹之類其妙如此故表而出之

治墜馬撲損瘀血在內煩悶

右取東引杏枝三兩細剉微熬好酒三升煎十餘沸去滓分為服空心如人行三四里再服

治諸傷折淋熨貼燻

附論

凡傷折有輕重淺深久近之異治法亦有服食淋熨貼燻之殊當詳所損之勢而藥之去毒敗滯生肌長肉亦

各有序無致差紊乃明傷折之本末也

方

神驗摩風麝香膏

出聖惠方

治折傷蹉跌筋骨暗腫疼痛

及傷外風毒口面不正但是傷風等症宜用此軟筋

骨潤及肉止痛

麝香

細研

虎脛骨

細辛

防風

去

獨活

桂心

當歸

芍藥

白芷

白僵蠶

生乾地黄

白

芫

白朮

附子

去皮臍生用

旋覆花

赤芍藥

連

翹 甘菊花

木鼈子

去殼

天南星

牛膝

去苗

躑躅

花 甘松香

石斛

去根各一兩

川椒

蘇藪根

烏

蛇

各一兩半

野駝脂

十兩

棘針

二兩

蠟

五兩

臘月猪膏

二斤醋

好酒

各三升

石淨洗曬乾細剉入酒醋中浸三宿漉出陰乾却入

臘月猪脂駝脂內以慢火煎候白芷黃焦藥成以綿

濾去滓入麝香末調勻以磁盒之有患者火上煖手

心點藥摩痛處五七度亦用温酒調半匙服之

先花麤散熨方 治傷折瘀血不散

先花 原蠶砂各三兩 生地黄二斤 生薑四兩 蜀椒去目及閉

口者 當歸各一兩 牛膝 桑根白皮 艾葉 白芷各二兩

右細判麤搗以醋拌炒熟用青布裏熨之立效

淋煤芎湯 治傷折疼痛

芎藭 甘草炙 蜀椒去目及閉口者 當歸切焙 吳茱萸浸炒

各一兩 桑根白皮炙判 澤蘭各二兩 松脂一兩 黑豆一升 研碎入松

脂內炒

右麤搗節每用藥三兩水一斗煎沸淋煤痛處立效

淋煤頑荆散 治從高失墜及一切傷損骨碎並瘀血

結痛

頑荆葉一兩半 蔓荆子 白芷 細辛去苗 桂心 防

風去 川芎 丁皮 羌活各一兩

右為細末每用藥二兩鹽半匙葱白連根五莖將水五升煎五七沸去滓通手淋煤痛處冷則再換淋煤

了宜避風暖蓋量病大小臨時加減用藥

治傷折浮腫疼痛膏

厚朴去麤皮 白芷各二兩 檳榔 芎藭各一兩 桂心二兩

沒藥 麒麟竭各半兩 當歸三兩剉 硃砂三分

右為散以酒二升熬藥成膏于帛上攤貼于痛處立

效如食前熱酒調下亦佳

桂附貼燭膏 治接骨因傷損筋脈時發疼痛遇寒則

甚名痛止貼燭膏

桂去粗皮 附子去皮臍 乳香研 蜀椒去目閉口 白礬

碎 吳茱萸浸炒各一兩 生薑汁 酒各五合

右搗碎六味為散將薑汁並酒各五合共煎取七合

入藥末調令勻於油單紙上攤貼患處急裏縛之其

痛立定一方無白礬有白芨

應驗塗貼獼猴骨燭膏 治一切傷折並蹉跌骨碎壓

腫曉夜疼痛不可忍者

獼猴骨 穿山甲骨 狗食絲骨 虎脰骨 野

狸骨 水獺骨 猫兒食絲骨 各三兩 膈胸臍 三兩

右麤搗以米醋拌入瓶子以密封頭令乾以大火燒令稍熱為度候冷取出搗羅為末磁器中密盛每用時先以醋煮黃米粥看損折痛處大小入藥末半錢調令勻攤於油單紙上裏之上面以綿裏繫縛重者不過三度驗其傷折處先依法度排正後即封裏如貼藥時疼痛先用温酒調藥末半錢服之藥入口其痛立定

燭塗藥方

乳香 各二兩 綠礬 各二兩 骨碎補 川朴硝 川椒 去目 桔

梗 去蘆 白礬 燒令汁盡 鹽梅肉 三兩炒

右為末煎米醋如羔勻攤于帛上貼之每日一易

塗貼方 治傷折腕損蹉跌暗腫皮肉疼痛

菜豆末 五兩 桂心 附子 川椒 去目 蛇牀子 松脂

各二兩 吳茱萸 當歸 剉微炒

右為末用薑汁調如膏貼于患處乾即再換如有瘡

口不可用之

貼燭敗龜膏 治傷折止痛消腫毒氣散瘀血

敗龜 塗酥炙 沒藥 川大黃 各三兩 百草霜 木鼈

子仁 當歸 剉微炒 桂心 芎藭 各二兩

右為散每用之時先以好酒一升煎至半升下火停

酒稍冷入藥末一兩却于火上重煎以時不住攪成

膏攤于紙上貼

走馬貼燭乳香膏 治傷折骨筋疼痛不止

乳香 二兩 蛇牀子 皂莢 炙去皮子 附子 生用各一兩 桂心 一兩

半 芥菜子 赤小豈 各三兩

右為末用生薑汁一中盞調如膏看傷損處大小攤

於油單紙上封裏候乾即易之

當歸湯 治傷折車碾落馬蹉跌筋脈俱傷疼痛不可

忍先用此方治之

當歸 頑荆 藁本 蔓荆子 白芷 各二兩 芎藭

一兩 丁香皮 一兩

右為散每度用藥三兩入鹽半匙葱白一握漿水一

斗煎十餘沸漸添淋煤痛處日二用之

桂附散 治傷折筋骨疼痛 方見木門傷折疼痛類

洗瘡湯 治傷損令洗用之煎湯

烏鵲飲 老干根 松樹兒 樟葉 忍冬藤

鷄脚草 烏挾樹兒 各二兩

右令洗者用之煎湯

虎骨湯 出聖惠方 治傷折後或人脚膝腰胯被冷風攻擊手

疼痛行履不得

虎脛骨 桑根白皮 剉 五加皮 白礬 各二兩 松木

節 樟木節 各十兩 川椒 一兩去目

右為散每度用藥三兩以水一斗煎十餘沸漸漸煤

痛處

熨藥方 出聖惠方 治傷折腕損蹉跌筋傷骨碎暗腫疼痛

筋脈急腫展縮俱難坐卧不得

生地黄 二斤切研 生薑 半斤細切 川椒 去目搗末 白礬 搗末各一兩 蠶

砂五兩乳香搗末芫花各二兩

右相和於鐺中醋拌炒令熟以青布裏熨痛上並四向筋急腫痛處冷即重炒熨後更用接骨止痛膏封貼如是傷接骨碎即先須依法度排正碎骨及蹉跌歸原後用綿裏柳木篦擊縛夾正便服補益丸散神效

軟骨塗藥方出聖惠方 治傷折

海桐皮 木鼈子去殼 陳橘皮各二兩 五加皮一兩半 遠

志去心 百合各一兩

右為末每日以米醋調如膏勻攤於帛上貼之

熨藥方出聖惠方 治傷折腕損蹉跌筋骨俱傷暗腫痛無

瘡口

生地黄一斤 生薑半斤 艾葉 川椒去目各三兩 芫花

松脂各五兩

右搗篩入前二味攪和令勻分為三分用醋三合于鐺中燒令熟用熱布裏熨痛處冷則再炒熨之

又方 出聖惠方

生薑 一斤 芫花 一斤 鹽 各五兩 白芷 各五兩 桑根白皮 各五兩 故

烏氈 一尺

右細剉用醋一升炒令熟以絹裏熨之痛處冷即炒

炒熨之三二十度

木鱉子貼煨膏 出聖惠方 治折傷接骨

木鱉子 去殼 蜀椒 去目閉口 虎脰骨 酒炙 龜甲 醋炙

兩 松節 二兩 細剉醋一升炒令醋盡

右為細散用小黃米半升作稠粥調藥五錢攤于絹

上封裏傷折處效

又方 出聖惠方 治傷折筋骨疼痛不止

松脂 三兩 當歸 剉微炒 細辛 各一兩 白芷 各一兩 川椒 二兩

右為散用生地黃汁並醋相和調如膏臨時看患處

大小塗貼每日換之

又方 出聖惠方 治從高失墜及一切傷折筋傷骨碎瘀血

結痛

黑豆二升乳香

白礬 桑根白皮

判各三兩接骨草五兩

右為末每用漿水一斗藥末三兩煎至七沸去滓通

手淋燥患處冷即易之

法鍊黑豆熨藥方

出聖惠方

治傷折

生黑豆

三升

葱白連根

三十根細切

布用青布裹之湯內煮乘熱替換熨痛處立效

淋洗方

出永類鈐方

右用生葱荆芥杜仲當歸等入煎湯內溫洗或連翹

防風白芷黃連

又方

出永類鈐方

用南蓼杜仲獨活藁本黃柏生薑煎洗如有口除薑
蓼損而青腫用此二味若肉冷痺痛骨斷而腫不可
洗傷口有濃水別用合口藥如前風流散

治涼血消腫

出永類鈐方

右用千金草

即荆芥

山查皮藁本石南藤皂角連根葱

煎水洗

普濟方卷三百十二

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官學錄臣常循

謄錄監生臣高象觀