

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十

傷寒門

傷寒一日候論

夫傷寒受病其外邪客於腰脊主於頭項故得病一日而

頭項腰痛也

傷寒一一日發熱惡寒頭痛腰脊強尺寸脈俱浮此是太陽膀胱經之病也

太陽病頭痛發熱汗出惡風宜桂枝湯輕者只宜柴胡桂枝湯太陽病頭痛發熱無汗惡風宜麻黃湯輕者只桂

明周王朱橚撰



枝麻黃各半湯麻黃湯桂枝湯二者均為解散正分陰陽不可不慎也仲景初謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃常須識此勿令悞也令人纔見身熱頭痛便發汗不知汗空閉而用麻黃汁空疎而用桂枝湯傷寒傷風其治不同古人有無汗者可發汗

方

桂枝湯

出聖惠方

治傷寒一日太陽受病頭痛項強壯熱

惡寒

桂枝

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮製

甘草

炙微赤剉已上各半兩

麻黃

二兩去根節

右為散每服四錢水一中盞入葱白二莖煎至六分

去滓不計時候稍熱服如人行五里以稀葱粥投之

衣蓋取汗如未汗一依前法再服

麻黃散

出聖惠方

治傷寒一日頭痛身體百節酸疼惡寒

宜服

麻黃

一兩去根節

桂心

三分

甘草

半兩炙微赤剉

芍藥

一兩三分

湯浸去皮尖

附子

三分炮製

赤芍藥

三分

白朮

三分

右為散每服四錢水一中盞入生薑半片分棗三枚

煎至六分去滓不計時候稍熱服如人行五里再服厚覆取汗

解肌湯

出聖惠方

治傷寒初患一日體熱頭痛

麻黃

一兩去根節

甘草

一分亦作一分半炙微赤剉

赤芍藥

半兩葛根

一兩半剉

石膏

兩

桂心

三兩去粗皮

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋以汗出為効

一方不用棗

細辛散

出聖惠方

治傷寒初得一日壯熱頭目四肢疼痛

細辛

一兩

赤芍藥

一兩

桂心

三分

乾薑

半兩炮製剉

附子

半兩炮製

去皮 甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候熱服良久吃蔥粥投之衣

蓋出汗

治傷寒一日脈弦而數頭項腰脊痛身熱煩滿不得睡

卧

出聖惠方

麻黃

一兩去根節

乾薑

炮製半兩到

石膏

一兩

右為散每服五錢以水一大盞入豉半合蔥白二莖

煎至五分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋出汗

桔梗散

出聖惠方

治傷寒一日壯熱頭痛惡寒

桔梗

二兩去芦頭

細辛

半兩

川烏頭

一兩炮製去皮臍

麻黃

半兩去皮

臍根

白朮

半兩

防風

半兩去芦頭

桂心

一兩

乾薑

半兩炮製到

芎藭

一分湯浸七遍焙乾微炒

右為末每服不計時候以溫酒調下二錢衣蓋出汗

如未汗出即再服之

人參散

出聖惠方

治傷寒一日頭痛壯熱煩悶其脈洪數

宜服

人參

半兩去芦頭

桂心

三分

赤芍藥

半兩

白朮

半兩

對麻黃

三分去根節

甘草

一分炙微赤到

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服四五服汗出即効

石膏飲子

出聖惠方

治傷寒一日頭痛壯熱心神煩悶

石膏

一兩 搗碎

柴胡

半兩 去苗

豉

一合 微炒

麻黃

一兩 去根節

葱白

二莖

薄荷

一分

右細剉都以水二大盞煎至三分去滓不計時候稍

熱分為三服如人行三二里相續服盡厚蓋取汗

解肌湯

出聖惠方

治傷寒一日邪氣毒在皮膚肌肉宜服

麻黃

半兩 去根節

桑根白皮

半兩 剉

赤芍藥

一分

梔子仁

前胡

一分 去芦頭

甘草

一分 炙 微赤剉

桂心

一分

杏仁

一分 湯浸 去皮尖雙

微黃

麩炒

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候稍熱頻服以厚衣蓋出汗

前胡散

出聖惠方

治傷寒初覺頭痛膈上痰雍宜服

前胡

一兩 去蘆頭

人參

一兩 去蘆頭

細辛

半兩

桂心

一分

陳橘皮

一兩 半湯浸 去皮瓢焙

赤茯苓

一分 兩

附子

二兩 炮製 去皮臍

阿膠

一兩

半用 皮

甘草

一分 炙 微赤剉

右為散每服五錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

麻黃散

出聖 惠方

治傷寒初覺一日頭項腰脊痛惡寒

麻黃

半兩去根節

乾姜

半兩炮製

蔥白

三莖一合

右細剉以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候

稍熱分為三服衣蓋出汗

治傷寒初得一日壯熱頭項腰脚疼痛宜服

出聖 惠方

麻黃

一兩半去根節

葛根

一兩剉

赤芍藥

三分

柴胡

一兩去苗

石膏

三分

剉

右為散每服五錢水一大盞入豉半合椒二十七粒葱

白二莖薄荷二十葉煎至六分去滓不計時候稍熱

服藥後喫葱豉粥投之以衣蓋出汗

治傷寒初覺增寒壯熱頭痛口苦宜服

出聖 惠方

桂心

一兩

赤芍藥

一兩

甘草

三分炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候稍熱服須臾喫葱豉粥投之

衣蓋取汗出為度如若未汗即再服

知母散

出聖 惠方

治傷寒一日頭痛項強上連風府壯熱

增寒體痛口苦宜服

知母

一分

麻黃

半兩去根節

乾薑

半兩炮製

蔥白

四莖半合

右俱剉和均分爲二服水一大盞煎至五分去滓不計時候稍熱服之衣蓋取汗如若未汗即再服

葛根湯

出聖惠方

治傷寒一日初覺頭痛惡寒壯熱腹內

熱脈洪大

葛根

一兩一作半兩

蔥白

五莖

豉

一合

柴胡

半兩去苗

生薑

一兩

兩半

右都細剉水三大盞煎至一盞半去滓不計時候稍

熱分爲三服如人行五里再服衣蓋取汗

又方

出聖惠方

麻黃

一兩去根節

附子

半兩炮製去皮臍剉

生薑

半兩剉切

蔥白

五莖切

豉

一合

右都細剉以水二大盞煎至一盞半去滓不計時候稍熱分爲三服如人行五里再服衣蓋出汗

神丹丸

出聖惠方

治傷寒一日頭痛遍身壯熱時時惡寒

宜服發汗

人參 一兩去蘆頭

川烏頭

一兩炮製去皮臍

半夏

三分湯洗七遍去滑剉

赤茯苓 一兩

硃砂 半兩細研水飛過

右為末煉蜜和搗百餘杵成丸如梧桐子大每服不

計時候以生薑湯下十九丸良久喫蔥豉粥投之以衣

覆體取汗出為度如若未汗即宜再服

附子湯

出聖惠方

治傷寒一日壯熱頭痛其背惡寒者宜

服

附子

一兩炮製去皮臍

赤茯苓

半兩

赤芍藥

半兩

人參

半兩去蘆頭

白朮

半兩桂心半兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候溫服

治傷寒一日頭痛先宜煎菟藿湯淋背發汗

出聖惠方

菟藿

五兩

槐枝

三兩

柳枝

四兩

桃枝

三兩

構葉

四兩

豉

一升

白芷

右細剉以水三斗煎取二斗去滓放無風處看冷煖



淋背訖便喫葱豉粥了以衣蓋出汗

葱豉湯 出聖惠方

治傷寒初得一日壯熱頭痛宜服

葱白 三莖切 麻黃 一兩去根節 豉 一合 生薑 半兩碎

右以水二大盞煎至一大盞半去滓不計時候稍熟分爲三服頻服衣覆出汗

治傷寒一日服葱豉湯不得汗宜服 出聖惠方

葛根 一兩 葱白 三莖切 豉 一合

右以水二大盞生薑半兩同煎至一盞五分去滓不

計時候稍熱分爲三服頻服衣蓋取汗

青膏方 出聖惠方

治傷寒初得一日在皮膚頭痛項強四

肢煩疼宜用

當歸 三兩 川椒 三兩去目及閉口者 芎藭 三兩 吳茱萸 三兩 白芷 三兩

附子 三兩去皮 川烏頭 三兩去皮 莽草 二兩

右細剉以醇酒浸之良久漉出以鍊成猪脂四斤煎至藥色黃絞去滓不計時候以溫酒服如生棗大日

三服稍稍增之若頭項強即摩之

黃膏方 出聖 惠方

治傷寒一日目赤頭痛頸強直賊風所

重宜用

川大黃 半兩 兩 附子 半兩 兩 去皮 臍生用 細辛 半兩 乾薑 半兩 川椒 半兩

去目及 閉目者 桂心 半兩 巴豆 二十一粒 去皮心

右細剉以醋浸一宿漉出以臘月猪脂一斤煎之附子黃色即止漉出滓以瓷合盛之傷寒赤色發熱酒服一丸如梧桐子大又以摩身數百遍兼治賊風及毒氣走注肌膚之間隨風氣所在摩之甚良

白膏方 出聖 惠方

治傷寒一日赤色惡寒肢節疼痛并瘰

惡瘡小兒頭瘡牛頭馬鞍瘡癰腫摩之背差宜用

天雄 三兩 去皮 臍生用 川烏 三兩 去皮 臍生用 莽草 三兩 躑躅花 三兩

右以酒三升浸一宿漉出用鍊了猪脂三斤與藥一處於銅器中文武火煎令諸藥皆焦黃色即成膏去滓以甕器中盛有患者摩之百遍即藥力行於傷寒咽痛含如棗核大日三嚥之差其膏不可近日

治傷寒一日至三日應汗者作此湯

葛根半兩 烏梅十四枚 蔥白一握 豉一升 錦

右以水九升煮取三升分爲三服初一服便厚覆取汗出服之

治傷寒暴發出本草

以荊芥豉汁煎服之

治傷寒二日論

夫傷寒三日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脈絡於鼻入於目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸

經在表表始受病在於皮膚之間故可摩膏火灸發汗

而愈也傷寒二三日身熱目痛鼻乾不得卧尺寸脈俱長皆是陽明胃經受病也傷寒一日陽明經受

病可發其汗非正陽明也正陽明者身熱汗出不惡寒反惡熱故可下也今言二三日傳陽明經身熱目疼鼻

乾不得卧尺寸脈俱長者是太陽陽明可表而已若無汗尚惡寒宜升麻湯有汗惡寒者表未解也宜桂枝湯無

汗脈出其人喘者與麻黃湯又問十三經皆一而陽明有三何也有太陽陽明有太少陽陽明有正陽陽明

也太陽陽明者本太陽病若發汗後下若利小便此亡津液胃中乾燥因本傳屬陽明也太陽陽明脾約是也

大便堅小便少其脾為約少陽陽明者本轉到少陽因發汗利小便胃已燥寔大便難也正陽陽明者病人本

風盛氣寔也三陽明可下唯惡寒中寒病爲在經與太陽合病屬表可後其汗蓋太陽與陽明合爲脈必浮大

而長外證必頭痛腰疼肌熱目痛鼻乾也脈浮大者太陽也長者陽明也頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻乾者陽明也尚惡寒者可升麻湯汗之若不惡寒反惡熱大便不秘者白利解利之不惡寒反惡熱大便便秘或譫語者屬胃家氣也可調胃承氣湯下之又問二陽有合病有併病何也脈浮大而長頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初得病時發其汗汗先出不徹病轉屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也三陽皆有合病唯三陰無合病不可不知也太陽證罷但發出熱手足畏冷汗出大便難而譫語者下後愈宜用大承氣湯若太陽証不罷不可不用桂枝麻黃各半湯小發汗設面赤色湯氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹湯氣怫鬱不得越散當汗不汗煩燥不知痛處其人短氣但坐蓋以汗出不徹故也更以麻黃發其汗則愈何以知汗出不徹以脈濇知之

方

桂枝附子湯

出聖惠方

治傷寒二日陽明受病陽明者主

於肌肉其氣往來如寒熱鼻乾不得眠卧面赤身熱有此病証宜服

桂枝 一兩

附子 一兩炮製

甘草

半兩炙

赤芍藥

兩半

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服汗出即愈

人參湯

出聖惠方

治傷寒二日頭痛鼻乾面赤壯熱四肢

煩疼

人參三分去蘆頭 訶梨勒皮三分 乾薑一方炮製對 桂枝三分赤

茯苓一分 附子三分炮製對去皮臍 甘草一分炙微赤對

右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服汗出瘥

麻黃湯出聖惠方 治傷寒二日頭痛發熱煩悶宜服

麻黃一兩去根節 桂心三分 石膏三分 黃芩兩 甘草一分炙微赤對

芍藥半兩一方赤芍藥 杏仁二十一枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候稍熱頻服汗出愈

解肌湯出聖惠方 治傷寒二日頭痛壯熱骨節煩疼宜服

乾薑二兩炮製 麻黃一兩去根節 赤芍藥三分 黃芩三分 石膏一分

右為散每服五錢水一大盞入葱白二莖豉半合煎

至五分去滓不計時候稍熱服如人行三里再服汗

出即差

吳茱萸散出聖惠方 治傷寒二日皮膚頭痛項強四肢煩

疼宜服

吳茱萸一兩湯洗七遍焙乾微炒當歸一兩微炒芍藥一兩附子一兩

炮製去皮白芷一兩炮製川烏頭一兩炮製麻黃一兩

節川椒一兩去目及閉口者微炒出汗

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至七分去滓不計時候稍熱分為二服以衣覆取汗

即瘥

荊芥湯出聖惠方

治傷寒二日頭項強四肢煩疼

荊芥一兩附子一兩炮製前胡一兩麻黃二兩去根節甘草

半兩炙白朮一兩人參一兩去蘆頭陳皮一兩湯浸

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服以衣覆出汗即瘥

白薇散出聖惠方治傷寒二日不解宜服發汗

白薇半兩麻黃一兩去根節貝母三分煨杏仁三分湯浸

仁麩炒微黃

右為細散每服不計時候以溫酒服二錢衣蓋出汗

即愈

柴胡散 出聖 惠方

治傷寒二日頭項四肢煩熱疼痛

柴胡 一兩 去苗 人參 一兩 去蘆 甘草 一兩 炙 微赤剉 麻黃 一兩 半 去根節

芩 一兩 赤芍藥 一兩 桂心 一兩 石膏 二兩 葛根 一兩 剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服以衣蓋取汗如人行

五里未汗再服

建中湯 出聖 惠方

治傷寒二日心中悸而煩者

桂心 一兩 甘草 一兩 炙 微赤剉 白芍藥 一兩 桔梗 一兩 去蘆 人參 一兩

去蘆 白朮 一兩 陳橘皮 一兩 湯浸 去瓤白炒 厚朴 一兩 去粗皮 生薑汁製

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

附子湯 出聖 惠方

治傷寒二日頭疼壯熱發表

附子 一兩 炮製 去皮臍 桂心 一兩 麻黃 一兩 去根節 白朮

吳茱萸 半兩 湯浸 七遍焙乾微炒

右為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候熱服宜頻服令有汗出即瘥

治傷寒二日發汗立効方 出聖 惠方

附子 半兩去皮 白附子 一分半 半夏 一分半

右並生搗細羅為散每服一錢水一中盞入生薑半

分煎至六分不計時候和滓熱服衣覆出汗

半夏散 出聖 惠方 治傷寒二日痰逆頭疼四肢壯熱

半夏 一兩水煮一伏時 澤瀉 一兩 桂心 一兩 乾薑 一分炮 甘

草 一分炙微赤剉

右為細散每服一錢水一中盞入生薑半分煎至六

分不計時候和滓熱服

走馬散 出聖 惠方 治傷寒二日頭疼壯熱

草烏頭 半兩燒灰 桂心 半兩 硫黃 半分細研

右為細散每服一錢水一中盞入生薑半分煎至六

分不計時候和滓熱服衣蓋出汗瘥

霹靂散 出聖 惠方 治傷寒二日頭痛腰背強硬憎寒壯熱

遍身疼痛



大黑附子

一枚入急火內燒化存性少多在臨出火時便用瓷器合蓋不合去却烟焰

右為細散每服一錢不計時候以熱酒調下汗出立瘥

治傷寒時氣瘟疫頭痛壯熱脈盛始得一二

右取真砂一兩以水一斗煮取一升頓服覆衣被取汗忌一切生血物

治傷寒及溫病頭痛壯熱脈盛始得一二日方

出肘後方

右破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別煮一升

水令沸以鷄子水投其湯中急攪調適寒溫頓服覆

取汗

雞子湯治發汗後二三日不解頭痛肉熱

麻黃

一兩去節 甘草 一兩炙

右切以水二升扣雞子白令置水和勻內藥後攪令  
和上火煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之蓋覆汗  
出粉傳之有效忌海藻菘菜

治傷寒初患二三日頭痛壯熱不解者

方見本門傷寒頭痛類

治傷寒一日二日壯熱頭痛渾身碎痛筋脈拘急鼻塞  
 顙乾語聲不出胸中談實多下清涕因冒雨傷風急  
 行夜行傷冷憎寒發熱更兼頭痛或因時氣之寒感  
 寒而咳嗽或因傷感寒氣目頭昏眩項脚痠痛百節  
 拘急精神不快頭痛不安渾身沉重忽因感寒間背  
 徹骨寒冷但是傷寒有此一件病証並宜進此藥凡  
 傷寒須是一二日內有憎寒兼壯熱者謂之傷寒若  
 纔得病並無增寒頭痛欲碎身熱如火頭面赫赤眼

睛赤露大腸秘熱小便黃赤此不名傷寒謂之熱病  
 即不可喫此藥治之別有方出護命方

麻黃去根節 官桂去皮 白朮各一兩 芎藭三分 藁本 香白

芷 細辛 羌活 芍藥 桔梗 甘草各一分 南

椒三銖

右細杵重羅令極細每服二錢七分水一盞煎一兩  
 沸非時和滓熱喫若增寒甚連進一盞平常喫減南  
 椒一味專治傷寒四日五日六日七日壯熱頭痛非

時尚餘憎寒渾身沉重頻頻發嗽忽間背上寒冷項脚酸痿多因少力頭目昏眩額角清痛身如痛痺脈氣微小不浮不數並宜喫上方若傷寒經四日五日身大發熱脈氣洪大浮數即不可喫也

蒼朮散 一家寶方

治傷寒一日二日已前逼毒氣令散

蒼朮 去粗皮米泔浸一宿一兩 甘草 一兩半炙 香附子 三兩半炙炒

右為末每服二錢水一中盞入蔥白三寸淡豆豉三十粒同煎至七分熱服不拘時候連服三服汗出即愈

愈

蒼朮散 出活人書

治傷寒一日二日頭痛發熱增寒身體疼痛

疼痛

石膏 一兩煨

桔梗 半兩

麻黃 一兩湯洗過焙乾杵

山茵陳 去根

甘草 炙

蒼朮 各半兩米泔浸去皮切

右為細末每服二錢水一盞煎至八分連服出汗

麻黃葛根湯 出活人書 治傷寒一日至二日頭項及腰脊拘急疼痛渾身煩熱惡寒

芍藥三兩 乾薑四分 蔥白七莖 麻黃三兩 用沸湯炮

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎一中盞去滓

溫服服了以厚衣蓋覆如人行四五里間再服良久

如未得汗出更煮蔥粥少許熱服取汗

治傷寒三日候論

夫傷寒三日者是少陽受病少陽者膽之經也其脈循

於脇上於頭耳故得病三日胸脇熱而耳聾也三陽經

絡始相傳病未入於臟可汗而解也傷寒三四日胸脇痛而耳聾或口苦

舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脈俱弦此是少陽膽經受病也太陽病不解轉入少陽脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下診其脈緊若小柴胡湯主之蓋脈弦細頭痛發熱屬少陽少陽受病口苦咽乾目眩小柴胡湯以解表不可發汗仲景少陽証唯柴胡湯為解表藥耳發汗則譫語譫語屬胃胃和則愈不和則煩而燥宜調胃承氣湯此屬少陽陽明也

方

麻黃散出聖惠方 治傷寒三日不解頭痛肌肉熱

麻黃一兩 去根節 甘草半兩 微 葛根一兩 剉 厚朴一兩 去麁皮塗

生薑汁炙 今香熟

右為散每服四錢用水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱頻服衣蓋汗出瘥

赤茯苓散 出聖 惠方 治傷寒病五日腹痛小便不利而嘔

者屬少陽病症

赤茯苓 一兩 赤芍藥 半兩 白朮 半兩 附子 半兩炮製 去皮臍 乾薑

半兩炮 赤剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍熱溫服

石膏散 出聖 惠方 治傷寒已經三日不得汗頭痛發熱

石膏 二兩 桂心 一兩 麻黃 一兩去根節 黃芩 一兩 甘草 一兩炙

杏仁 二十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色 赤芍藥 一兩 白朮 一兩 芍藥

香附子 各一兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候分為二服

細辛散 出聖 惠方 治傷寒三日咳嗽胸膈不利四肢煩疼

壯熱頭痛

細辛

一兩去根節

葛根

三分剉

荊芥

一兩

白朮

一兩赤

芍藥

一兩三分洗

桔梗

一兩去蘆頭

桂心

一兩

甘草

三分

炙微赤剉

五味子

三分

右為麤末每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

丁香散

出聖惠方

治傷寒已經三日頭痛壯熱不解咳嗽

痰逆

丁香

前胡

附子

炮製去皮臍

麻黃

去根節

白朮

細

辛

桂心

各一兩

甘草

一兩微赤剉

右為細散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

香豉湯

出聖惠方

治傷寒三日壯熱不解發汗

麻黃

去根節

葛根

梔子仁

各一分

石膏

半兩

荊芥

半兩生

薑

一分

豆豉

一合

糯米

一合半

右為細剉水三大盞先煎麻黃等七味至一盞半去滓下米煮作稀粥不計時候熱服之衣蓋出汗瘥

石膏散

出聖惠方

治傷寒三日雖發汗後頭痛壯熱未得

全解毒氣猶盛

石膏

一兩

薺芫

一兩

葛根

一兩

黃芩

三分

麻黃

草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞煎至六分去滓不計時

候溫服

麻黃散

出聖惠方

治傷寒三日不得汗煩熱悶亂

麻黃

二兩去根節

葛根

二兩

桂心

一兩

豉

二合

赤芍藥

二兩

石膏

二兩搗碎

右為細剉和勻每服半兩水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓不計時候熱服便喫葱粥投之

衣覆取汗如未汗即再煎服之

通關散

出聖惠方

治傷寒三日不得汗四肢不利

附子

一夥炮製去皮臍

乾薑

半兩炮製剉

桂心

一分

麻黃

一分去根節

右為散每服四錢水一中盞入蔥白二莖煎至五分

去滓不計時候熱服

正陽丹 出聖惠方

治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利

太陰玄精

二兩 硝石

二兩 硫黃

二兩 礞砂

一兩

右都細研入甕瓶中子固濟以火半斤於瓶中周一寸煖之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐中堂屋後北陰下陰乾又入地理二寸取出細研以麩糊和為丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為度

治傷寒三日服藥之後不得汗宜用蒸法

活人書

右用薪火燒地良久掃去火微用水洒地取蠶沙桃葉糠及麩麥等皆可用之鋪著地上令二三寸布席卧上蓋覆以汗出為度不得過熱當審細稍出汗周身良久不止後以粉粉之勿令汗出過多無蠶沙單桃同栢亦得葫藿亦可

仙授散 出衛生家寶方

治傷寒三日

蒼朮

四兩米泔浸一夕洗淨秤

麻黃

四兩去根節

香附子

去皮毛秤

甘草

二兩 杏仁

二兩 去皮尖

麵炒白研



右為細末每服三錢白湯調下如人行五里間進三服服訖避風如一服便有汗即不必再進米元暉云此乃李先生弟子陸先生方醫愈翟伯壽陸弟子元道人傳元暉於三茅山

葛根龍膽湯

出干金方

治傷寒三四日不瘥身體煩毒而

熱

葛根

八兩

龍膽草

大青

各半兩

升麻

石膏

姜蕤

各一兩

甘草

桂心

芍藥

黃芩

麻黃

各二兩生

薑

三兩

右咬咀以水一斗煮葛根取八升內餘藥煮取三升分四服日三夜一方無黃芩

治傷寒汗出不歇已三四日胸中惡物欲令吐者

苦參

二分

甘草

一分

瓜蒂

赤小豆

各二七枚

右切以水一升煮取半升服之當吐吐不止者作蔥豉粥解之必止忌海藻生菜

柴胡湯

出聖濟總錄

治傷寒三日已前表証不除

柴胡去蘆 麻黃去節 石膏各一兩 甘草半兩

右為散每服三錢水一盞入鹽豉三十粒蔥白二寸煎至六分去滓併三服汗出為度

芎藭湯 一名神朮散 出聖濟總錄 治傷出初病三日脈浮有表証

芎藭四兩 蒼朮一斤半對麩炒熟木白 藁本去苗土一兩

甘草二兩

右麤搗篩每服三錢水一盞生薑五片煎至六分去滓稍熱併三服

白犬湯 一名立勝散 出聖濟總錄 治傷寒三日頭痛壯熱骨節疼

痛

白朮 五味子 甘草 石膏各四兩 乾薑

右麤搗篩每服三錢水一盞鹽一捻煎至八分去滓連併熱服不問有汗無汗自解如傷寒挾冷腹痛加生薑三片棗二枚同煎

治傷寒三五日疑有黃則宜服此油方

右取生烏麻油一盞水半盞以鷄子白一枚和之熟

攪令相得作一服令盡

茵陳散

出王氏傳濟方

治傷寒大解表發汗三日內並宜服

新產前不復服

山茵陳

二兩

麻黃

二兩一兩

荆芥

一兩

細辛

大黃

一兩

乾薄荷

一兩

官桂

二兩

右為麤末每服三錢水一大盞生薑五片蔥白一莖

煎六分去滓熱服輕蓋出汗

黃連阿膠湯

出濟生拔碎方

治少陰病二三日已上經病日

去中心煩不得卧者少陰本受熱也

黃

一兩

黃連

二兩

阿膠

一兩

梔子仁

半兩

右為細末每服四錢水二盞煎服

神朮散

出廣南衛生方

治解利四時傷寒凡三日以內乃可

服若得經不可服尋常頭痛體疼項背拘急鼻塞清

涕小可傷風服之甚妙

蒼朮

以生而包繫去皮用米泔浸乾切作片子焙乾麩炒黃去越四兩

川芎

一兩洗淨切

膏土

一兩洗去土切

甘草

八錢

右為細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分  
溫服不計時候

凡初覺傷寒三日內

出本草

但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出瘥  
重者亦減半

治傷寒二三日咽痛者

出本草

右取甘草二兩炙水三升煮取一升半服五合日三  
服

治傷寒四日候論

夫傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也為三陰之首  
是故三日已後陽受病訖傳之於陰而太陽受病焉其  
脈絡於脾主於喉咽故得病四日腸滿而咽乾也其病

主胸膈故可吐而愈

傷寒四五日腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腸滿時痛尺寸俱

沉細此是太陰脾經受病也傷寒手足必微冷若手足自溫者繫太陽也自別不歇屬太陰也腹滿時痛屬太陰也自利不渴者臟寒也當溫之宜四逆湯理之湯也腹滿脈浮者可桂枝微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯又問古人以四日太陰証病在胸膈可吐而愈向也答曰不然有太陰証脈大胸滿多

普濟方

二六

痰者可吐之脈大而無吐症者可汗而已大抵在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者泄之瓜蒂花豉隨豉施用不可拘以日數也

方

恒山散 出重 惠方 治傷寒四日太陰初受病宜服吐之

恒山 三分 甘草 三分 鼈甲 三分塗醋炙 石膏 三分 柴胡 三分

去苗 知母 三分

右為散每服三錢水一中盞入淡竹葉十片煎至六分去滓不計時候溫服之當吐頑涎後再服和氣治

中湯

治太陰初受病服恒山散吐後宜服和氣治中湯 出聖 惠方

人參 半兩去蘆頭 藿香 半兩 白朮 三分 甘草 二分炙 乾薑 一分

炮製 白茯苓 一分 陳橘皮 三分湯浸去白穰焙

右為細散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

麻黃散 出聖 惠方 治傷寒四日吐後或壯熱頭痛身體酸

疼口苦心煩

麻黃 三分去根節 葛根 三分 柴胡 一兩去苗 知母 三分 赤芍藥 一兩

梔子仁 三分 石膏 一兩半 生熟地黄 一兩 陳橘皮 半兩湯浸去白

穰 焙

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡散 出聖 惠方

治傷寒四日頭痛背膊急痛心腹壅滯

柴胡 一兩去苗 川大黃 一兩對碎微炒 恒山 一兩半 茵陳 一兩知母

赤芍藥 一兩 甘草 一兩炙微未判 鼈甲 一兩半塗醋炙今微黃去裙欄

右為散每服五錢以淡漿水一大盞煎至六分去滓

不計時候溫服以微吐為度吐後不必再服

半夏湯 出聖 惠方

治傷寒四日嘔吐頻發煩悶頭痛大渴

此証是脾胃痰

半夏 三分湯浸七遍去滑 甘草 半兩炙微赤判 人參 一兩去蘆頭 厚朴 二兩

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分

去滓不計時候稍熱服一方無人參

大青龍湯

出聖惠方

治傷寒四日脈浮頭痛大發熱惡寒

身體疼痛無汗而煩者

麻黃

二兩去根節

桂心

一兩

甘草

一兩炙微赤剉

石膏

二兩

杏仁

三十

枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢水中盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服取汗為度不可過汗恐亡陽也若

汗多不止用溫粉止之一方有大棗同煎

小青龍湯

出聖惠方

治傷寒四日因下後大渴服冷藥過

多喘急者

桂心

一兩

五味子

半兩

麻黃

一兩去根節

白芍藥

一兩

細辛

三分

乾薑

三分炮製剉

甘草

一兩炙微赤剉

半夏

半兩湯洗七遍

杏仁

三十枚湯

浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服一方無杏仁虛噫去麻黃加熟

附子一錢小便不利小腹滿加茯苓一錢喘加杏仁

七枚去皮尖

前胡散 出聖惠方

治傷寒四日雖經發汗後心胸不利頭

目多疼胃氣不和少思飲食

前胡 半兩去蘆頭

半夏 一兩湯浸七遍去滑

甘草 半兩炙

桂心 半兩

微赤剉

人參 半兩去蘆頭

赤茯苓 半兩

白芷 一分

白朮 半兩

乾薑 一分炮製

剉當歸 半兩

剉葛根 半兩

柴胡 半兩去蘆頭

陳橘皮 半兩湯浸

去白穰焙

木香 半兩

旋覆花 半兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

白朮散 出聖惠方

治傷寒四日腹脇脹滿心胸不利四肢

疼痛咳嗽惡寒喘急壯熱

白朮 三分

前胡 一分去蘆頭

葛根 三分

桑根白皮 三分剉

川升

麻 半兩

赤芍藥 一兩

石膏 半兩

荆芥 半兩

子苓 三分

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分豉五十粒

煎至五分去滓不計時候溫服

朴硝散 出聖惠方

治傷寒四日煩熱不解大小腹澀

川朴硝 三分

犀角屑 三分

梔子仁 半兩

赤芍藥 三分

黃芩 三分



陳橘皮

三分湯浸去白穰焙

川大黃

三分剉碎微炒

柴胡

一兩去苗

右為散每服四錢水一中盞入淡竹葉三十片生薑

半分煎至六分去滓不計時候溫服以利為度

葛根散

出聖惠方

治傷寒四日頭重身強腰脊痛

葛根

一兩剉

甘草

一兩炙微赤剉

桂心

一兩

大青

膏

一兩赤芍藥

麻黃

一兩去根節

右為細散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

犀角散

出聖惠方

治傷寒四日煩熱不解大小腸秘澀

犀角屑

三分

黃芩

一兩

柴胡

一兩去苗

梔子仁

川大黃

一兩半剉碎微炒

川朴硝

一兩

木通

三分剉

右為散每服四錢水一中盞煎至五分去滓不計時

候溫服利為度

茵陳散

出聖惠方

治傷寒四日頭痛背膊急悶骨節煩疼

心燥口乾

茵陳

一兩

柴胡

一兩去苗

甘草

半兩炙微赤剉

赤芍藥

三分

欽定四庫全書

普濟方

三十五

去蘆附子 一兩炮  
頭製去皮

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分  
去滓不計時候溫服

瀉心湯 出聖 惠方 治傷寒四日未經吐

川大黃 一兩剉 碎微炒 黃連 一兩 去頭 黃芩 一兩 附子 一兩炮 製去皮

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時  
候溫服

三黃散 出聖 惠方 治傷寒四日三陰受病其脈浮而滑腹

滿口熱舌乾而渴大便不利宜服

黃芩 一兩 梔子仁 一兩 川大黃 一兩半剉 碎微炒

右為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片朴砂末  
二錢煎至六分去滓食前溫服大便利即藥止未利  
再服

吐痰散 出聖 惠方 治傷寒四日毒氣入胃喉中閉悶

瓜蒂 一分 丁香 一分 赤小豆 半合 炒熟

右為細散每服以溫水調下二錢空腹服之當吐後

便可喫葱豉粥補之

治傷寒汗出不止已三四日胸中惡但欲吐宜吐之方

出聖  
惠方

豉五鹽半蜜一  
合兩合

右件藥以水二大盞煎至七分去滓空腹頓頭服之

良久當吐如人行十里未吐再服一方不用蜜

又方出聖  
惠方

苦參半兩甘草一分生赤小豆三十粒  
剉用剉炒熟

右以水一中煮取半盞去滓空心都作一服服之當

吐吐不瘥者更以苦參一兩生地黃三兩別以水二大盞

煎至一盞分作二服甚者作葱豉粥投之以吐出毒

為度

松羅散出聖  
人方

治傷寒四日寒熱不退頭痛百節煩疼

毒在胸中

松羅半兩川升麻一兩甘草一兩恒山半兩  
生用

右為散每服五錢水一大盞煎取七分入茶末二錢

更煎一兩沸出滓空腹溫服如未吐相去約人行三里再服以吐為度

治傷寒四日已嘔吐更宜吐者出聖惠方

右取苦參二錢以溫酒五合調服之得吐即瘥

柴胡散出聖濟總錄

治傷寒四日以後煩熱不解大小腸

澁

柴胡去苗黃芩去黑心犀角鎊芍藥各三分木通剉一分

山梔子仁半兩朴硝一兩大黃細研炒一兩半

右麤搗篩每服五錢水一盞半入竹葉三七片同煎

至一盞去滓空腹服大小腹利為度如未通再服

四味承氣出聖濟總錄

治傷寒四日已後腹脹滿痛喘麤壯

熱

大黃細剉醋炒二兩朴硝二兩甘草三分炙剉枳殼去穰麤炒三兩半

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞空腹溫服

治傷寒四日心胸中滿悶取吐出聖惠方

右用猪膽一枚取汁以醋一小盞內猪膽汁相和溫

過分為二服當吐為度

治傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛出聖惠方

右為苦參五兩烏梅十枚細剉以水二升煎取一升分服

小柴胡湯 治傷寒四日五日身熱惡風頸強項脇下

手滿足溫而渴者

柴胡半斤 枳椇根四兩內少黃脈者 桂心三兩 黃芩 牡礪

甘草炙 乾薑各三兩

右切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服初服微須溫服汗出者便愈也忌生

蔥海藻菘菜

治傷寒已四五日頭痛體痛內熱如火病入腹胃宜利

瀉之

麥門冬生一升去心 生地黃切一升 知母二兩 生薑五兩半 芒

硝二兩半

右以水八升煮取二升半內芒硝煎五沸分五服取

利為度忌無莖

治傷寒五日論

夫傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脈貫於腎  
 絡於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在臟  
 故可下而愈也傷寒五六日尺寸脈俱沉或口燥舌乾  
 而渴或口中和而惡寒此是少陰腎受病也少陰病口  
 燥舌乾者急下之宜大承氣湯若不渴不口燥舌乾而  
 脈沉者散溫之宜四逆湯太陰厥陰背不惡寒只有少

陰有惡之証不可不知也少陰病得之三日口中和其  
 背惡寒者宜著灸并四逆湯也大抵傷寒陽明証宜下  
 少陰証宜溫之仲景於少陰証口燥咽乾即云急下之  
 蓋少陰主腎繫舌本傷寒熱氣入於臟流於少陰之經  
 腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴須宜急下之非若陽  
 明証宜下而故可緩也雖然陽明亦有一証發熱汗出  
 多急下之陽明屬胃汗多則胃汁乾亦須急下也

方

柴胡湯 出聖惠方

治傷寒五日舌乾而渴煩熱不解大小

腸背澀

柴胡 一兩去苗 犀角屑 一兩 赤芍藥 三分 黃芩 一兩 梔子仁 十四

枚 川大黃 一兩剉碎微炒 川朴硝 一兩半

右為散每服四錢水一中盞竹葉二十七片煎至六分

去滓不計時候溫服如四里再服以利為度

猪苓散 出聖惠方

治傷寒五日頭痛目眩大渴飲水口乾

小便不利憎寒壯熱腿膝酸疼不可忍者

猪苓 一兩去黑皮 赤茯苓 一兩 白朮 半兩 桂心 半兩 澤瀉 半兩

右為細散每服不計時候以新汲水調下二錢日三

四服若嘔吐不可下食者服之亦効

麥門冬散 出聖惠方 治傷寒五日口熱舌乾頭痛脚脛酸

疼四肢壯熱

麥門冬 一兩去心 子苓 三分 葛根 一兩 前胡 三兩去蘆頭 知母 三分

玄參 半兩 赤芍藥 三分 犀角屑 半兩 檳榔 三分 甘草 二兩炙微赤剉

川升麻 半兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡桂枝湯 出聖 惠方 治傷寒五日發熱惡寒肢節疼痛

微嘔吐心下痞結外証未解

柴胡 二兩 去苗 桂枝 一兩 黃芩 一人 參 一兩 去 蘆頭 甘草 一兩 炙微

赤 半夏 一兩 湯浸 七遍 去滑 赤芍藥 一兩 厚朴 一兩 去 麤皮 塗 生薑汁 炙 令香

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

川大黃散 出聖 惠方 治傷寒五日煩熱未退大小便澀

川大黃 一兩 剉 碎 微炒 黃芩 一兩 赤芍藥 一兩 知母 一兩 川升麻

一兩 塗 醋 炙 兩 令 去 裙 襴 赤茯苓 一兩 梔子仁 半兩 柴胡 一兩

去 苗 川朴硝 兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服以大小便稍利為度

拉黃丸 出聖 惠方 治傷寒五日不能言語熱在胃中

犀角屑 半兩 麻黃 半兩 去 根 節 川大黃 一兩 剉 碎 微炒 川朴硝 一兩

善濟方

四十



黃芩兩半 釜下黃土兩半 梁上塵兩半 竈突墨兩半

右為細末鍊蜜和搗二三百杵丸如彈子大每服不計時候以新汲水研服一丸如渴飲新汲水當有汗出良久未汗即更服一丸汗止熱退能語若小兒即量力服之

治傷寒五日熱毒氣在臟令人心腹煩燥壅悶不得眠  
卧宜服此方

川大黃一兩碎 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒黃 犀角屑三分

殼三分麩炒 甘草半兩炙 川朴硝一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服取利為度如不利再服

前胡散出聖惠方 治傷寒五日心腹壅滯煩熱不退

前胡一兩半 杏仁三分湯浸去皮尖 川大黃一兩

黃芩一兩 川朴硝一兩 檳榔一兩

右為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服取利為度如不利再服

檳榔散 出聖惠方

治傷寒五日少陰受病口舌乾燥煩渴

欲水心膈不利大腸秘澀其脈滑者生小弱不足者

死若氣逆不順

檳榔 一兩 牽牛子 一兩 川大黃 半兩碎 青橘皮 半兩

去白穰焙

右為細散每服不計時候以溫茶調下二錢良久喫

薑粥投利三兩行便止如未利再服

白朮散 出聖惠方 治少陰病服檳榔散下之後宜和氣白

朮散

白朮 半兩 人參 半兩 枳殼 半兩麩炒微 白茯苓 半兩

厚朴 半兩 去麩皮生 白芷 半兩 陳橘皮 半兩湯浸 桂

心 半兩 白芍藥 半兩 高良薑 半兩 甘草 半兩炙

右為散每服三錢水一中盞入蔥白一莖煎至六分

去滓不計時候溫服

升麻散 出聖惠方 治傷寒五日但通體熱面如桃花皮膚

乾燥無潤澤口乾渴此名陽氣攻胃大腸結澀

川升麻一兩黃連一兩川大黃一兩地骨皮一兩

芩一兩大青一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉三

七片煎至六分去滓不計時候溫服

石膏散

出聖惠方

治傷寒五日頭疼口舌乾燥煩渴欲飲

水

石膏

一分

黃芩

一分

甘草

一分

川大黃

半兩

對

兩

兩

微赤對

兩

對

右為散都以水二盞半入竹葉三七片煎至一盞二

分去滓不計時候分溫三服

黃芩湯 治傷寒五日口乾頭痛大便澀

黃芩

去黑心

山梔子仁

大黃

各一兩

陳橘皮

湯浸去白

穰焙一分

右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

治傷寒五日吐利後身熱不去煩而腹滿卧起不安宜

服此藥

出聖惠方

梔子仁 一兩 厚朴 二兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟 枳殼 二兩麩炒微黃去穰

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

加減小柴胡湯 治傷寒五六日往來寒熱或微喘咳

嗽

柴胡 二兩去苗 黃芩 去黑心 半夏 湯浸去滑 甘草 炙各三分 乾薑 半兩

炒 五味子 炒一合

右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑四

片煎至六分去滓溫服

梔子散 出聖惠方 治傷寒五日頭痛壯熱四肢煩疼不能

飲食嘔逆不定

梔子仁 三分 黃連 三分去鬚 黃蘗 三分剉 川大黃 三分剉 蘆

根 一兩剉 葛根

右為散每服四錢水一中盞入豉半合蔥白二莖煎

至六分去滓不計時候溫服

三黃承氣湯 出聖惠方 治傷寒五日口熱舌乾頭痛脚脛

酸疼

梔子仁

一兩

黃芩

一兩

川大黃

一兩

剉

川芒硝

一兩

陳橘

皮

一兩湯浸  
去白穰焙

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治傷寒五六日已上者

出肘  
後方

右用作青竹瀝少煎令減數飲之以衣厚覆取汗即

愈

麥奴丸

治傷寒五日熱在胃中不能言語者

方見本  
門過經

不解  
類

柴胡

桂湯

出鮑  
氏方

治傷寒四五日身熱惡風頸項強

脇下滿手足溫口苦而渴自汗其脈陽浮陰弦或因

發汗多亡陽而譫語者

柴胡

三兩  
一錢

半夏

四錢  
一分

甘草

三錢  
一分

芍藥

黃芩

人

參

官桂

各半  
錢

右為散每服五錢以薑五片棗一箇煎前服

三黃熟艾湯

出活人方

治傷寒四五日而大小下熱痢作

白通湯藥多不得止宜服此湯除熱止痢

黃芩

黃連

黃蘗

各三分

熟艾

半雞子大一塊

右剉如麻豆大水二大盞煎取七分去滓溫服

治傷寒四日五日六日不得汗頭痛壯熱渾身不知痛

疼處睡卧不安心神煩躁脈氣洪大緊急大腸秘熱

不得通宜服此百解散凡人患傷寒忽熱病經數日

飲食不進大腸秘澀不通醫者多以其飲食不進胃

氣虛弱不肯疎轉致令傾損性命此緣熱毒之氣蒸

鬱臟腑傷損正氣所以不能食凡患傷寒之人經及

五六日未曾得汗頭痛壯熱心神煩躁渾身骨節四

肢八節俱病大俯熱秘不通者雖飲食不得亦當疎

轉行不病氣即自然平安飲食增進凡下疎藥先當

審五臟脈氣觀何臟得病然後下藥取之即萬無失

一但三部之中一部偏太緊者是即其臟得病也若

脈候未精尺喫此百解散永無差誤緣此方皆治五

臟之病也若是狂言妄語急喫後面藥轉下便安効

出護命方

前胡去毛柴胡去毛知母 貝母 牡丹皮去心 桔梗

羌活 獨活 荆芥穗 黃芩 山茵陳 山梔

升麻 麻黃去根 大黃 麥門冬去心 杏仁去尖 紫苑

玄參 秦艽去皮各一分

右細杵羅為末每服六錢清水兩盞半生薑三片同煎取二盞食後臨卧去滓熱服留滓再煎服若大腑

不通忽狂言妄語即煎此藥取汁用調後面藥

半夏半兩 芎各一分 大黃各一分 牽牛二兩 硝石十銖

右研硝石并杵羅眾藥合為末每服三錢入葱三枝生薑三片依法煎前方藥取汁用調此藥末三錢食後臨卧熱氣此藥末不撞三錢若是大腑秘甚任意加減進服以轉為度仍不得過劑轉後便喫此小熱粥投之此藥須至大腑不通方可進服

加味二陳湯出活人書 治三五日之內發熱發寒乾嘔飲

水即吐粥食入口即吐

陳皮二錢茯苓三錢半夏三錢甘草三錢枳實二錢竹茹三錢

右以咀每服三錢水二盞生薑七片煎至七分去滓

徐徐一口服畢再服一口以盡為度不可急嚥此等

汗之輕者

治傷寒熱病經四五日熱毒上衝心胃噎塞滿悶渾身

壯熱頭痛不止大腑大通胃中痰實寸關脈實大有

骨力狂言妄語宜服此方出護命方

黃芩 麻黃去根 柴胡去毛 桔梗 羌活 連翹子

玄參 木香 貝母各一分 牡丹皮去心 大黃煎剉

芥穗各半 牽牛兩 半夏四錢 硝石一分已上三味  
作一處杵為末

右為杵羅為末每服六錢眾藥末三錢牽牛半夏硝

石末三錢以水一盞半生薑五片蔥三枝同煎眾藥

三錢沸一沸急取出用汁調牽牛子等末食後和滓

喫

芎朮散出衛生家寶方

治解截四時傷寒或以病四五日表



欽定四庫全書

卷一百三十

裏未分亦可服

川芎 甘草微炮 升麻 香附子 白芷 羌活

蒼朮 人參 當歸 白芍藥各等分

右咀咬每服四大錢水一盞生薑四片煎至七分去滓稍熱連進三兩服熱漸退脈緩頭輕為効

傷寒六日候論

夫傷寒六日是厥陰受病厥陰者肝之經也其脈循陰絡於肝故得病六日煩滿而陰縮也此是陰陽俱受病

毒氣在胃故可下而愈也傷寒六七日煩滿囊縮其脈尺寸俱為緩此是厥陰肝經受病也厥陰病其脈微浮為欲愈不浮為未愈宜小建中湯脈緩者必囊不縮外証必發熱惡寒似瘡為欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺寸脈俱沉短者必是囊縮毒氣入臟宜承氣湯下之大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故次第傳入陰經似陽主生故太陽水傳是陽明土土傳是少陽木微為邪也陰主殺故木傳是太陰土土傳是少陰水水傳是厥

陰木至六七日當傳厥陰肝木為移氣尅於脾主脾再服賊邪則五臟六腑皆困而危殆衛榮不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古人云脾熱病則五臟危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脈得微緩微浮為脾胃脈也故知脾氣全不再受剋邪無所容否極泰來榮衛將復水升而火降則寒熱作而大汗解矣

方

小柴胡湯

出聖惠方

治傷寒病六日其病深結在臟是三

陰三陽俱受病若五臟六腑榮衛皆不通其人難治

柴胡

二兩去苗

黃芩

一兩

芍藥

一兩

半夏

半兩湯浸七遍去滑

枳實

半兩麩炒微黃

人參

二兩去蘆頭

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至一分

去滓不計時候溫服

大承氣湯

出聖惠方

治傷寒六日體重四肢煩疼多渴或

譫語不知人事如此病症者胃中有結燥不通

川大黃

二兩剉碎微炒

枳實

二兩麩炒微黃

川芒硝

二兩厚朴

一兩去麁

皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服四錢用水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服以利為度如人行十里未利再服

瀉心湯

出聖惠方

治傷寒六日心胃妨悶煩熱不解面赤

大渴壯熱身體疼痛此証是毒氣攻心

半夏

半兩湯浸七遍去滑

人參

半兩去蘆頭

木通

一兩剉

甘草

一兩炙微

赤剉黃芩

一兩川大黃

一兩剉碎微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候

人參散

出聖惠方

治傷寒六日嘔噦不定頭疼體痛時有虛

汗此証是冷熱未和

人參

三兩去蘆頭

柴胡

三兩去苗

黃芩

一兩

甘草

一兩炙微赤剉

白朮

一兩半夏

半兩湯浸七遍去滑

厚朴

一兩去麁皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢用水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

黃芩湯

出聖 惠方

治傷寒六日發汗不解嘔逆小便不利

胃脇痞滿微熱而煩

黃芩

桂心

赤茯苓

各一兩 前胡

三兩去蘆頭

甘草

半兩

炙微赤剉

半夏

一兩湯浸七遍

厚朴

一兩去外皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候溫服

柴胡桂枝湯

出聖 惠方

治傷寒六日發熱惡寒肢節疼痛

微嘔心下痞結外証未去

桂枝

一兩 柴胡

二兩去苗

芍藥

一兩 人參

一兩去蘆頭

黃芩

一兩 赤

芍藥

一兩 枳殼

二兩麩炒微黃去穢

甘草

半兩炙微赤剉

半夏

一兩湯浸七遍

去滑

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候溫服

牡蠣散

出聖 惠方

治傷寒六日其人已發汗而不解胸脇

滿小便不多利渴而不嘔但汗出往來寒熱而煩

牡蠣

一兩燒為粉

甘草

一兩炙微赤剉

乾薑

半兩炮製剉

柴胡

二兩去苗

菰蘆根一兩木通一兩桂心一兩黃芩一兩厚朴二兩去

生薑汁炙  
令香熟

右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不計時  
候溫服

人參散出聖  
惠方治傷寒六日吐瀉百骨疼痛脚冷腹熱

人參三分去蘆頭柴胡三分白茯苓三分牡蠣三分燒黃

苓三分白芍藥三分桂心三分半夏七分湯浸甘草三分炙微

赤乾薑三分燒  
製對

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎  
至五分去滓不計時候溫服

猪苓散出聖  
惠方治傷寒六日發熱煩悶渴欲飲水得水

而吐其脈浮數小便不利者

猪苓三分去黑皮白朮三分澤瀉一兩桂心半兩赤茯苓三分丁

香三分厚朴一分去外皮生薑汁炙甘草三分炙微赤對

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分  
去滓不計時候溫服

葛根散 出聖惠方

治傷寒六日躁煩渴肢節解痛小腹急

滿陰縮

葛根 三分剉

石膏 一兩

柴胡 一兩

川升麻 三分

知母 三分

梔 三分

子仁 半兩

甘草 三分炙

川大黃 一兩剉

碎微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

大青散 出聖惠方

治傷寒六日心躁煩悶四肢疼痛小腹

滿急

大青 三分

柴胡 一兩

梔子仁 一分

川升麻 三分

知母 三分

石

膏 一兩

甘草 三分炙

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

通關散 出聖惠方

治傷寒六日脈沉細不足者

附子 一兩炮製

乾薑 半兩炮製

甘草 半兩炙

黃耆 三分

桔梗 半兩

防風 三分

羌活 半兩

五加皮 半兩

桂

心 三分

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

柴胡散 出聖惠方

治傷寒六日頭疼壯熱百節疼痛

柴胡 一兩去苗 川升麻 三分 黃芩 三分 知母 一兩 赤芍藥 一大兩

青石膏 三分 梔子仁 一兩 川大黃 一兩 杏仁 三分

去皮尖雙仁 麩炒微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分豉五十粒煎至六分去滓不計時候溫服一方無生薑

麻黃升麻湯 治傷寒六七日其人大小寸脈沉遲手

足厥逆下部脈不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止

麻黃 二兩半去節 升麻 五分 當歸 五分 葶藶 一作葛蒲 知母 黃

芩 各二分 麥門冬 去心一作天門冬 桂心 芍藥 乾薑

石膏 碎 甘草 炙 茯苓 白朮 各一兩

右切以水一斗先煮麻黃減二升掠去上沫內諸藥煮取三升去滓溫分三服相去如炊三斗米頃令盡

汗出便愈忌海藻菘菜葱醋桃李雀肉等

黃芩湯 治傷寒六七日不解寒熱往來胸脇苦病默

默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛

前胡 八兩 半夏 半升 生薑 五兩 黃芩 人參 甘草 炙

三兩 乾棗 十二枚 擘

右切以水一斗煮取三升分四服忌羊肉錫海藻菘

菜

黑奴丸 出聖惠方 治傷寒六日熱毒在臟胸中煩悶口噤

不能言唯欲飲水成塊傷寒醫所不療

麻黃 二兩去根節 竈下黃土 二兩 川大黃 二兩 黃芩 二兩 川芎

硝 二兩 竈突墨 二兩 梁上塵 二兩

右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服不計時候以井

華水下一丸

治傷寒熱病五六日愈加困重喫疎藥後不糞如紫黑

色病勢不減神思昏昏小腹脹滿狂妄不省人事甚

則腹中有塊堅硬不散其脈反結伏此其毒氣攻血

腹內有瘀積物此乃九死一生之症也



牡丹皮去心射干 羌活 荆芥穗 大黃 黃芩

桃仁去尖并雙仁者連翹 玄參 麥門冬去心柴胡去山

梔 麻黃去根沉香

右細杵羅為末每服三錢水一盞半煎二三沸食後

和滓服

苦參湯出仁存方 治傷寒熱病五六日已上熱不除

黃芩二兩苦參三兩生地黃一兩

右咀咬每服四大錢水一盞半煎至七分去滓服

傷寒七日論

夫傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病終故也今七日已後及甚者欲為再經病也再經病者是經絡重受病也

方

桂枝湯出聖惠方 治傷寒七日不解頭痛有熱有裏大腸

秘澀與承氣湯後其小便清者病不在裏屬在表也

當須發汗若頭痛者必衄

桂枝一兩 赤芍藥一兩 甘草一兩 麻黃一兩 柴胡一兩

去苗 芎藭一兩 厚朴二兩 蒼皮去塗生薑汁炙令香熟

右搗篩羅為散每服四錢水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至六分不計時候熱服衣覆微汗如人行十

里未汗再服

知母散出聖惠方 治傷寒七日脈浮發熱無汗渴欲飲水

無表證

知母一兩 石膏一兩 甘草半兩 粳米半兩 人參半兩 蘆頭去

葛根半兩

右都對以水二大盞半煎至二盞去滓不計時候分

為三服溫服

前胡湯出聖惠方 治傷寒六七日發熱汗出不解心中痞

堅

前胡二兩 赤茯苓二兩 白朮二兩 川大黃一兩 赤蘆頭碎微炒

芍藥一兩 枳實一兩 白芷半兩 半夏一兩 厚朴二兩

皮塗生薑汁炙令香熟 甘草一兩 微赤到

右搗篩羅為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓不計時候溫服

麻黃散 出聖惠方 治傷寒七日大下後脈沉遲手足厥逆

喉咽不利胃膈煩躁唾膿血泄利不止為難治此方

主之

麻黃 二兩去根節 當歸 一兩剉 川升麻 一兩 知母 一兩 赤芍

藥 一兩 天門冬 一兩去心 桂心 一兩 赤茯苓 一兩 甘草 一兩炙

石膏 二兩 白朮 一兩 乾薑 一兩炮 製剉

右搗篩羅為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓不計時候溫服

柴胡散 出聖惠方 治傷寒七日不解心煩腸中有結燥譫

語

柴胡 二兩去蘆頭 半夏 一兩湯浸七遍去滑 赤芍藥 一兩 甘草 半兩炙微

赤知母 一兩 黃芩 一兩 川大黃 二兩剉碎微炒 陳橘皮 一兩去穢湯浸

人參 一兩

右搗篩羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時候溫溫頻服稍利為度

葶藶苦酒湯

出活人書

治傷寒七八日內熱不解

葶藶

一合紙上炒研膏

生艾汁

半升無生艾煮艾汁或用艾根搗取汁

苦酒

半醋是也半升五合

右三味同煎取七合作三服

傷寒八日論

夫傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣不盡所以病根猶在也

方

鱉甲散

出聖惠方

治傷寒八日熱勢彌重大便結澁心腹

痞病飲食不下精神恍惚譫言妄語

鱉甲

一兩塗醋炙令微黃去想爛

細辛

一兩

吳茱萸 三兩湯浸七遍晒乾微炒

白鮮皮

一兩

附子 三分炮製去皮臍

枳殼

一兩麩炒

茵陳

一兩

川大黃

一兩半剉碎微炒

桂心

三分

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服微利為度

犀角散 出聖 惠方

治傷寒八日煩熱不退四肢疼痛

犀角屑 一兩 川升麻 一兩半 柴胡 一兩半 葛根 一兩半 吳

藍 一兩 甘草 一兩 微赤剉

右搗篩為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓次

入馬牙硝三錢更煎三二沸不計時候溫服

又方 出聖 惠方

柴胡 一兩 黃芩 一兩 犀角屑 三分 茯苓 三分 人參 一兩 去苗 鬚頭

甘草 半兩 炙 微赤剉

右搗篩為散每服四錢水一大盞煎至六分去滓次

入馬牙硝三錢更煎三二沸不計時候溫服

柴胡散 出聖 惠方 治傷寒八日不解默默煩悶腹中乾燥

大腸結澀在言

柴胡 一兩 知母 半兩 人參 一兩 半夏 半兩 湯浸 去苗 芦頭 七遍去滑川

大黃 一兩 黃芩 半兩 赤芍藥 半兩 甘草 半兩 葳蕤 半兩 剉 微赤剉

兩半

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候溫服以微利為度

附子湯 出聖 惠方 治傷寒八日風溫相搏身痛心煩不能

自轉側不嘔不渴下之浮脈者

附子 一兩炮製 去皮臍 桂心 一兩 白朮 一兩 白芷 一兩 甘草 半兩 炮炙

微赤 葛根 一人參 一兩去 芦頭 陳橘皮 一兩湯浸 去白穰焙

右細剉和勻每服半兩水一大盞入生薑半分棗三枚煎至七分去滓不計時候分溫二服

茵陳湯 出鮑 氏方 治傷寒七八日內熱結身黃如橙小便

不利腹脹并酒傷瘀熱在內發熱頭有汗身無汗

茵陳 一兩 淡竹葉 三錢 大黃 半 梔子 五大 通草 二錢

右為散水二盞煎茵陳次下後藥至一盞調三硃五苓散下紅丸子甚効 千金只前三件專治傷寒發

黃汗并治谷疸

生地黃丸 出濟生 投粹方 病人七八日後兩手脈沉遲細微

膚冷臍下滿或狂或躁大便實而色墨小便自利者此畜血証具也若年老及小年氣虛弱者宜此方主

之

生地黄

自然汁一升如無生地黃只用生乾地黄二黃

乾漆

半兩炒煙欲盡

生藕

自然汁半升如無藕用刺薊汁半升如無刺薊汁用刺蘇末一兩

藍葉

一握切碎乾者用末

半水蛭

十个炒

大黃

一兩剉如散子大

桃子仁

半兩

蜜

二

個去翅足麩肉炒黃

右一處入水三升半同慢火熬及二升以來放冷分

三服投一服至半日許血未下再投之此地黃湯比

抵當湯丸其勢稍輕如無地黄與藕汁計升數添水

同煎抵當湯丸恐用之太過有不止損血之候故立

此湯衄不可汗者蓋為脈微也脈緊者浮者麻黃湯

主之脈浮緩者桂枝湯主之脈已微者犀角地黄湯

主之

普濟方卷一百三十

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十一

明周王朱橚撰

傷寒門

傷寒九日以上候論

夫傷寒傳三陽訖而不能傳於陰至停滯累日病証不罷或三陰陽傳病已畢又重感於寒名爲兩感傷寒則臟腑俱病故曰數多而病候改變也



方

前胡湯

出聖 惠方

治傷寒九日不解心腹堅滿身體疼痛

内外有熱煩嘔不安

前胡

去芦 湯洗七遍去滑

半夏

湯洗七遍去滑

白朮

枳實

麩炒 微黃

赤芍藥

黃芩

各一兩

甘草

半兩炙 微赤剉

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

石膏湯

出聖 惠方

治傷寒病九日曾經發汗吐下未解三

焦生熱其脈滑數昏憤沉重欲入百合壯

石膏

三兩

黃蘗

各一兩

麻黃

一兩去根節

豉

二兩

去鬚 川大黃

二兩剉 碎微炒

甘草

一兩炙 微赤剉

梔子仁

一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時候溫服如人行十里再服以微

利為度

茯苓湯

出聖 惠方

治傷寒九日之後胃膈煩滿小便不利

譫語一身不可轉側

赤茯苓

柴胡

去苗龍骨

各二兩

川大黃

二兩到碎微炒

黃芩

人參

去蘆頭

牡蠣

燒馬粉

桂心

半夏

湯洗七遍

陳橘皮

湯浸

去白甘草

炙微赤剉

右為散每服四錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

犀角散

出聖惠方

治傷寒九日心肺熱氣急喉中有膿血

犀角屑

柴胡

去苗青竹茹

各一兩

桔梗

去芦頭

川大黃

剉碎麥門冬

去心各一兩半

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓下芒硝

末一錢攪令和勻不計時候溫服

檳榔散

出聖惠方

治傷寒九日心中滿悶腹脹喘急

檳榔

訶梨勒皮

陳橘皮

湯浸去白

甘草

炙微赤剉各半

兩桑根白皮

三分剉

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分蔥白一莖

煎至五分去滓不計時候溫服

半夏散 治傷寒九日不解往來寒熱壯如溫瘧胃膈

滿悶時有痰逆不止

半夏湯洗七遍去滑柴胡去苗各二兩葛根剉白朮去人參去

頭陳橘皮湯洗去白穰焙黃芩厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟甘

草炙微赤剉各一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

芒硝散 治傷寒九日不解胃脇滿送日晚即潮熱此

由夫下內實故也

川芒硝二兩前胡一兩去枇杷葉半兩拭去毛炙微黃葛根一兩

剉川大黃二兩剉碎微炒半夏一兩湯洗七遍去滑

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服以利為度

大前胡湯 治傷寒八九日不解心腹堅滿身體疼痛

内外有熱煩嘔不安

半夏半升洗生薑五兩枳實八片炙前胡半升黃芩三兩乾棗

十二芍藥四兩

右切以水一斗煮取三升分四服日三夜一服忌羊  
肉錫器等物 張仲景用柴胡不用前胡本草云加  
大黃二兩不加大黃恐又名大柴胡湯

石膏湯 治傷寒病已八九日三焦熱其脈滑數昏憤  
身體壯熱沉重拘攣或呼呻而已攻內體猶沉重拘  
攣由表未解令直用解毒湯則攣急不瘥直用汗藥  
則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救  
其內有所增加以解其外是故名石膏湯

石膏

黃連

黃蘗

黃芩

各三兩

香豉

一升

梔子

十枚

麻黃

三兩

去節

右切以水一斗煮取三升分爲三服一日併服出汗  
初服一劑小汗其後更合一劑分兩日服常令微汗  
出拘攣煩憤即瘥得數行利心開令語毒折也忌諸  
肉冷水

桂附湯 治傷寒八九日風濕相搏身體疼痛煩不能  
自轉側不嘔不渴脈浮虛而澹者此主之若其人大

便小便自利者去桂加白朮湯主之

一名桂附散屬太陽方見本門

中風類

未附湯 治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自

轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若

其人大便自利者此主之

屬太陽

白朮 二兩 甘草 一兩 附子 一個半

炙

炮去皮

右剉如麻豆大每服五錢生薑五片大棗一枚水一盞半煎至七分去滓溫服一服覺身痺半日許再服

三服都盡其人如胃狀忽怪也即是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使之耳法當加桂 一其大便堅小便自利故不加桂也

療傷寒八九日至十日餘大煩渴熱盛而三焦有瘡蜜者多下或張口吐舌呵欠目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止利以龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服五合漸進之隨意飲尤宜老少治傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血

桃仁

三十個去皮尖

麩炒赤色研碎

蜚蠊

三十枚去翅

水蛭

二十枚各炒

大黃

一兩

右為末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆大每服二十九丸桃仁湯下利瘀血惡物便愈未利再服

傷寒可汗

附論

夫傷寒病汗之而愈者以初得病一日至三日陽經受邪未傳諸陰其邪在表故當發汗此大約也然病數日脈浮太陽症不罰者亦可汗之當以脈症為準凡頭疼

發熱惡風振惡是為可汗之証其脈浮者是為可汗之脈陽虛則惡寒脈浮為在表或浮而弱或浮而緊或浮大而數皆宜汗之衄家脈雖得之不可汗故內經曰其在脾者汗而發之 變汗發陽明與太陽合病有惡寒症屬表可汗用升麻湯又太陽陽明合病胃滿而喘麻黃湯陽明本多汗若脈浮無汗而喘可發汗亦用麻黃湯又陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可與桂枝湯又陽明煩熱汗出如瘧或日晡發潮熱而脈浮虛

者並與桂枝湯若脈實者當用承氣湯太陰腹滿脈浮  
 桂枝湯凡太陽症有用五積散者非謂發汗蓋去積耳  
 少陰初得病脈沉反熱者溫之而微取其汗用麻黃細  
 辛附子湯下利手足冷而身熱者非屬通脈四逆湯又  
 少陰病二三日常見少陰而無陽熱中滿之症者用麻  
 黃附子甘草湯微汗之二藥皆陰症傷寒解表之劑陰  
 症初病便屬少陰不待傳次

方

蔥豉湯 治傷寒初覺一二日頭項腰脊痛惡寒

蔥白 十二莖 半合 乾薑 炮製 一分 麻黃 去根 桂皮 去麤 芍

藥 各半 兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服良久  
 投蔥豉熱粥蓋覆出汗

蔥粥方 治傷寒服蔥豉湯後未得汗再服

蔥白 十一莖 三合 生薑 半兩 拍碎

右用水五盞入前三味煎至二盞半去滓入白米依

常法煮粥入少鹽攪勻任意食之衣蓋出汗未汗再服

葛根湯 治傷寒服葱豉湯不得汗可服

葱白 十四根 豉 一升 葛根 三兩切

右咬咀以水五升煮取二升分為再服溫服取汗不出更服余時用此一服輒汗畧不再服救數十人甚

効

麻黃葛根湯 治傷寒初得一二日出汗

麻黃 一兩半 葛根 剉 柴胡 去苗各一兩 芍藥 三分

右搗篩每服五錢水一盞半豉一百粒開口椒一七粒連鬚葱白三寸薄荷二十葉同煎至八分去滓熱服後蔥豉湯一盞投之衣覆取汗汗未快再服

解毒湯 治傷寒初覺煩熱頭脚疼痛

柴胡 半兩 黃芩 去黑心 荆芥穗 各一分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑一棗拍碎煎至八分去滓入生地黃汁合一白蜜半斤更煎三



五沸熱服

葛根湯 治傷寒三日頭疼壯熱遍身疼痛其脈洪數

葛根剉 白木 乾薑炮各半兩 芍藥半兩 麻黃去根節 桂去粗

皮各三分 甘草炙一分半

右搗篩每服五錢水一盞煎至八分去滓熱服如脈

微即加附子半兩

石膏人參解肌湯 治傷寒初得一二日頭疼壯熱惡

寒脈浮緊者

石膏碎 麻黃去根節各一兩 柴胡去苗 人參各半兩 桂去麤皮 甘

草炙各一分 葛根剉二兩

右搗篩每服三錢水一盞入蔥豉生薑煎至七分去

滓熱服不拘時

荊芥湯 治傷寒初得一二日至三日頭疼痰逆肢體

煩躁惡風身熱增寒者

荊芥穗四兩 前胡去芦頭 旋覆花各三兩 甘草炙二兩 白木

半夏湯洗七遍焙乾 麻黃各一兩 芍藥各一兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘煎至七分去滓熱服不拘時

五味桂枝湯 治傷寒一二日頭痛體疼發熱

桂去麤皮 葛根剉各一兩 麻黃去根節一兩 山梔子仁半兩 石膏

一分

右搗篩每服三錢水一盞蔥白一莖切豉三十粒煎至七分去滓熱服良久再服以蔥白稀粥投之微汗即瘥

五解湯 治傷寒三日內表散不解者

麻黃去根節二兩 白朮一兩半 葛根剉 甘草炙 山梔子仁

桔梗炒 石膏碎 杏仁湯浸去皮尖麩炒各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入蔥白鹽豉同煎至七分去滓連併熱服不拘時汗出為度

六味桂枝湯 治傷寒頭痛發熱惡寒解表

桂去麤皮 麻黃去根節 石膏 乾薑炮 白朮生用 蒼朮米泔

浸麩炒各一兩

右馬散每服三錢水一盞生薑三片蔥白二寸豉七粒同煎至八分去滓熱服不拘時

人參湯

出聖濟總錄

治傷寒一日至三日頭痛壯熱煩悶

其脈洪數

人參

一兩

白朮

半兩

甘草

炙半兩

麻黃

去根節

桂

去麋皮各三分

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓連併溫服不拘時衣覆出汗

十味人參湯

出聖濟總錄

治傷寒頭痛體疼寒熱不解調

理榮衛進飲食解利經絡去久滯風邪

人參

厚朴

去粗皮生薑汁炙

桂

去粗皮

甘草

炙

白朮

乾

薑

白茯苓

去黑皮

杏仁

湯洗去皮尖雙仁麩炒

陳橘皮

湯浸去白

焙各一兩

麻黃

去根節湯煮掠去沫二兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗一枚擘破煎至七分去滓熱服纔覺傷風併三兩服汗出立瘥

香朮湯

出聖濟總錄

治傷寒二三日頭痛肌熱煩躁不解

四肢倦痛可汗

蒼朮 米泔浸一宿 切焙二兩 陳橘皮 湯洗去白焙 防風 麻黃 去根

節湯煮掠 去抹焙乾 當歸 切焙 桂皮 去粗 甘草 炙各一兩 白茯苓 去黑皮

吳茱萸 洗焙乾炒 人參 厚朴 去粗皮生薑汁炙 羌活 去芦各半兩

右除桂外剉碎文火炒黃入桂同麤搗篩每服三錢水一盞入蔥白一寸生薑二片同煎至六分去滓溫服不拘時候

蔥豉湯 出聖濟總錄 治傷寒一日至三日以前身熱脈大

身體疼痛汗不出者

蒼朮 米泔浸去皮剉麩炒黃 麻黃 去根節湯煮掠去抹焙各二兩 甘草 炙剉 桂

去粗皮 各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入蔥白三寸鹽豉二十粒同煎至七分去滓熱服不拘時候

前胡湯 出聖濟總錄 治傷寒表不解取汗

前胡 去蘆頭 柴胡 羌活 去蘆頭 芎藭 人參 枳殼

去穰 麩炒 甘草 炙 芍藥 各半兩 麻黃 去根節湯煮掠去抹焙一兩

右搗篩每服三錢水一盞入蔥白三寸煎至七分去

滓熱服如要發汗更入薄荷三五葉同前服訖以厚被蓋覆如人行五里再服徐令汗透遍身即旋去被避風若傷寒後餘毒未解潮熱往來數服即解

消飲茯苓湯 治傷寒表未解氣脈閉塞津液不通水

飲氣停在胃腑結而成痰膈腕痞悶倚息短氣體重

多唾頭目旋暈嗜卧好眠額角偏痛膝理開疎體常

汗出

白茯苓去黑皮 前胡去蘆 芎藭 羌活去蘆頭 桔梗炒 人

參 獨活去蘆頭 甘草炙 柴胡去苗各半斤 陳橘皮去白

右為散每服三錢沸湯默服不計時候或剉如麻豆

用前件藥半兩水三盞煎至一盞半去滓分溫二服

前胡湯 治傷寒頭痛惡寒發熱肢體疼倦

前胡去蘆頭 羌活去蘆頭 防風去文 蒼朮去蘆頭 桔

梗炒三兩 蛇脫皮一兩煎碎 蟬殼去土 陳橘皮湯浸

乾稱四兩 甘草炙剉 一人參二兩

右搗篩每服四錢水一盞半入生姜二片薄荷七葉

煎至五分去滓溫服

桂心湯 治四時傷寒初覺

桂去粗皮芍藥 甘草炙葛根剉各等分

右搗篩每服四錢水一盞半生薑二片棗三枚擘同煎至八分去滓溫服

麻黃桂枝各半湯 治傷寒表解不明

麻黃去節桂枝各三兩芍藥 杏仁去皮尖各一兩半

右咬咀如法脩製每服三錢水一盞半生薑三片棗

一枚同煎七分去滓熱服汗出為愈

葱豉湯 治傷寒一二日頭項及腰背脊拘急疼痛渾

身煩熱惡寒脈緊無汗一名麻黃湯

麻黃一兩去節豉二大合乾薑二兩蔥白十五莖

右咬咀每服以水二升先麻黃六七沸掠去白沫乾薑煎二十餘蔥豉沸下豉煎取八大合去滓分溫兩服如人行五六里服訖良久煮蔥豉粥熱喫即以衣

覆出汗

文方 治傷寒不得汗取汗最妙

良薑 一兩 丁香 五錢

右為細末醋和為丸如在心中掌衣被蓋之汗出為度

六物青散 出干金方 治傷寒救色惡寒

附子 各一兩 白朮 六銖 防風 各一兩 細辛 十二銖

桔梗 各三兩 烏頭 十八銖

右治下篩以發溫酒服五錢不知稍增之服後食傾

不汗出者進溫粥一杯以發之溫服汗熱熱可也勿令流離勿出手足也汗出止若汗不出不止者溫粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹丸

神丹丸 出干金方 治傷寒救瀉惡寒發熱體疼者

附子 各四兩 烏頭 各四兩 人參 茯苓 半夏 各五兩 硃砂

一兩

右末之蜜丸以真丹為色先食服如大豆二丸生薑

湯下日三須臾進粥二升許重裹汗出若不得汗汗少不解復服如前法若得汗足應解面不解者當服桂枝湯此藥多毒熱者令飲水寒者溫服解之治瘧先服發二丸要畧用細辛不用人參別有射干棗大一枚名赤丸主寒氣厥逆

人參散

出聖惠方

治傷寒表解利四肢和胃氣調理榮衛

進飲食解利經絡去久帶風邪

人參

二兩去芦頭

桂心

一兩

陳橘皮

二兩湯浸去白穰焙

乾薑

二兩炮製

白朮

二兩

赤茯苓

二兩

杏仁

二兩湯浸去皮尖

雙仁麩炒微黃

甘草

二兩炙微赤剉

麻黃

四兩去根節

厚朴

二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候熱服如纔吹著連煎兩三

服汗出立愈

通神散

出聖惠方

治傷寒頭痛寒熱心胃躁悶不得汗者

麻黃

厚朴

桂心

川大黃

一兩剉碎微炒

附子

一兩炮製

去皮 甘

草

半兩炙微赤剉

白朮

半兩

人參

半兩去蘆頭

五味子

半兩



右為散每服不計時候以新汲水調下三錢良久以熱水嗽口三五度後喫熱薑茶衣蓋汗出

抵聖散 出聖 惠方 治傷寒解肌

麻黃 二兩去根節 甘草 一兩炙 桂心 一兩 附子 一兩炮製去皮臍

白朮 半兩 五倍子 半兩 陳橘皮 半兩湯浸去白穰焙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服汗出為度

治傷寒頭疼項強壯熱增寒四肢不利宜服此方 出聖 惠方

附子 半兩炮製去皮臍 羌活 半兩 桂心 一兩 乾薑 半兩炮製 防風

三分去蘆頭 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾微炒 桔梗 三分去蘆頭 當歸 三分

剉微炒 五加皮 三分 甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分

去滓不計時候熱服

通關散 出聖 惠方 治傷寒徧身壯熱頭痛腰疼肢節不利

吳茱萸 湯浸七遍焙乾微炒 羌活 附子 炮製去皮臍 芎藭 五

加皮 甘草 炙微赤剉 防風 去蘆頭 麻黃 去根節 旋

覆花

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分薄荷七葉煎至六分去滓不計時候稍熱服汗出為度

治傷寒頭痛壯熱鼻塞惡風宜服 出聖 惠方

羌活 一兩 五加皮 一兩 桂心 一兩 乾薑 半兩 炮製 兩 海桐皮 一兩

剉青橘皮 一兩 湯浸 去白 焙麻黃 去根 甘草 一兩 炙附子 微赤剉

一兩 炮製 吳茱萸 半兩 湯浸 七 遍焙乾 微炒 去皮臍

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候熱服

正氣散 出聖 惠方 治傷寒四肢頭目疼痛

麻黃 三兩 去根節 桂心 二兩 甘草 一兩 炙乾薑 一兩 炮製 兩 川

大黃 二兩 剉 青橘皮 一兩 湯浸 去白 穰 焙 吳茱萸 一兩 湯浸 七 遍焙炒

厚朴 二兩 去粗皮 生薑汁炙香熟

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

附子散 出聖 惠方 治傷寒頭痛身熱四肢不利宜服解表

附子一兩炮製 乾薑一分炮製 麻黃半兩去根節 桂心半兩

芎藭半兩 烏頭半兩炮製

右為散每服一錢水中盞入生薑半分煎至六分

去生薑和滓不計時候熱服良久更以熱酒調下一

錢當便出汗

敗毒丸 出聖惠方 治傷寒陰陽二症出汗

乾葛半兩 麻黃半兩去根節 躑躅花一分 芫花一分醋炒 硃砂一分

細研

右為末以水研豉心和丸如梧桐子大陽毒煎薑豉

湯下七丸陰毒熱水下七丸不用衣覆汗自當出

三神丸 出聖惠方 治傷寒表裏不解

附子半兩燒令半黑 芫花一兩醋拌炒令黃 皂莢一兩不蛀者去皮子炙黃

右為細末以豆豉心宿用湯浸至來旦研絞取細稀者用和藥末為丸如梧桐大每服不拘時以粥飲下十九服藥後或吐或汗或瀉若得一般當便為効

治傷寒發汗極効方 出聖惠方

蒼朮 四兩剉 去皮 甘草 二兩 猪牙皂角 四錢 麻黃 三兩去根節

右件生用搗細羅為散每服一錢水一中盞煎三兩沸不計時候和滓溫服蓋覆令汗出立効

治傷寒發汗神驗白散方 出聖 惠方

白附子 半兩 皮臍 附子 半兩去皮臍 半夏 一分 乾薑 一分 天南星 一分

白莢子仁 一分

右件生用搗細羅為散每服一錢水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服當有汗出即瘥

治傷寒發汗方 出聖 惠方

附子 一兩炮製 去皮臍 太陰玄精石 一兩 細研 硫黃 半兩 細研 馬牙

硝 半兩 細研

右研令勻每服不計時候以生薑熱酒下一錢良久以稀蔥粥投之當身有汗

浮萍草散 出聖 惠方 治傷寒發汗

浮萍草 一兩四月十五日者 麻黃 半兩去根節 桂心 兩 附子 半兩炮製

去皮 臍

右搗細羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出立効

神白散 出濟生 拔碎方 治四時傷寒在表渾身壯熱口苦舌

乾惡風無汗

白朮 米泔浸一宿去皮 焙乾秤一兩半 乾薑 一兩 麻黃 一兩 去根節 甘草

一兩 防風 一兩 去蘆 石膏 一兩 研 川芎 一兩 香白芷 半兩 瓜蒌

根 半兩

右為末每服二錢水一盞入生薑三片蔥白三寸煎

至七分熱服如傷風身熱面赤脈大以衣覆出汗即愈

可溫論

夫傷寒病雖有三陰三陽然在陽則太陽病多在陰則少陰病多以二經為表裏故也至於陽明太陰病頗稀少而少陽厥陰病又少也然完觀古人治陽明則多下於少陰則多溫蓋陽明者胃也胃受病則不惡寒反惡熱濇濇汗出大便秘譫語潮熱須下之乃愈若乃氣若

本虛人初中病腠理邪寒氣更不經三陽而便見少陽  
蓋少陰者腎也腎受病則身冷惡寒四肢厥逆脈微  
細心煩但欲寐或自利而渴須溫之乃愈雖然三陰病  
大約可溫而古人特於少陰詳言之者則少陰病尤宜  
思故也 變溫法太陽發汗漏不止惡風小便難四肢  
急難屈伸桂枝加附子湯太陽發汗後病不解而惡風  
者虛也芍藥甘草附子湯又尤陽汗後或下後病不解  
而煩燥者茯苓四逆湯太陽心中悸而躁者小建中湯

又太陽七八日脈細惡寒為陰陽俱虛病不可汗下其  
人素無熱者芍藥甘草附子湯素有熱者黃耆建中湯  
又太陽病八九日風濕相搏身煩病難轉側不嘔渴脈  
浮虛而濇桂枝附子湯若大便硬而小便自利者去桂  
枝加白朮又太陽風濕相搏骨節煩身體微腫不能屈  
伸汗出短氣惡風而小便不利者甘草附子湯陽明病  
反無汗皮上如虫行者為久虛可溫之用朮附湯黃耆  
建中湯此非冬陽明無汗症也當加體認

方

附子湯 治傷寒少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之方

附子 二兩炮製去皮臍 人參 一兩 白朮 四兩 芍藥 白茯苓 去黑皮各三兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎取七分去滓溫服日三服

附子飲 出聖濟總錄

治傷寒頭痛壯熱恐成陰毒

附子 炮製去皮臍 白朮 各半兩 桔梗 細辛 去苗葉各一兩

右剉如麻豆每服五錢用水一盞半煎至七分去滓空心溫服衣蓋取汗或得吐即瘥如未吐汗再服

通關散 出聖濟總錄 治厥陰陽寒脈弦長者生沉細不足者死

附子 炮製去皮臍一兩 桔梗 乾薑 炮 羌活 去蘆頭 五加皮

各半 桂心 去粗皮 黃耆 炙剉一分 防風 半兩 甘草 炙剉半兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至七分去滓食

前溫服日二三服

桂心湯

出聖濟  
總錄

治傷寒陰盛身寒脈候沉細頭痛體

疼

桂

去粗皮

麻黃

去根節

甘草

炙

人參

各半兩

白朮

附子

炮製去皮臍

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各三分熏

右咬咀每服五錢用水一盞半入生薑半分拍碎同

煎取七分去滓溫服

迴陽湯

出聖濟  
總錄

治傷寒陰盛手足厥冷體寒脈微

延胡索

炒

半夏

切薑汁炒黃

甘遂

醋炒乾各一兩

陳橘皮

湯浸去白

皮附子

炮製去皮臍

桂

去粗皮各半兩

檳榔

一枚

麻黃

去根節湯煮去沫焙

乾半兩

天南星

一枚

右剉如麻豆每服二錢酒八分煎至七分去滓溫服

後一坎頃患人頭面渾身覺熱時便與衣服蓋覆令

汗出

溫白丸

出聖濟  
總錄

治傷寒面青心不堅硬問口出氣身

體不熱頭面多汗四肢厥冷



白附子

炮

硫黃

研

半夏

湯浸去滑切  
焙各一兩

右搗研為末同粳米飯搗和為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下吐逆妙生薑鹽酒下或艾醋湯下陰毒病喫三五沸不計時候

白朮散

出聖濟  
總錄

治傷寒伏陰氣胃膈妨悶吐逆不定

手足厥冷

白朮

炒

附子

炮製去  
皮臍

高良薑

炮

桂

去粗  
皮

人參

乾薑

炮各  
一兩

藿香

去梗  
一分

右丸如麻豆大每服三錢水一盞同煎至七分不計時候去滓溫服

益智湯

出聖濟  
總錄

治傷寒四肢厥冷其脈沉細

益智

去  
皮

烏頭

炮製去皮  
臍各一兩

青橘皮

湯  
浸

麻黃

去根  
節

乾薑

炮各  
半兩

右丸如麻豆每服三錢水一盞入生薑三片鹽半煎至六分去滓不計時候稍熱服

正元湯

出聖濟  
總錄

治傷寒陰症脈候沉細

麻黃 去根節

陳橘皮

去白焙

大黃

生剉

甘草

剉

乾薑

桂

去粗皮芍藥

附子

炮製去皮臍

吳茱萸

湯浸七遍焙

半夏

湯浸

七遍炒各半兩

右丸如麻豆每服二錢水一盞入生薑三片棗二枚

煎至七分去滓熱服以衣被蓋覆取汗未汗如人行

五里再服或連喫三服汗出立瘥

退陰湯

出聖濟總錄

治傷寒手足逆冷脈息沉細頭痛腰

重

烏頭

炮製去皮臍

乾薑

炮各半兩

右粗搗炒令轉色放冷再搗篩每服一錢水一盞鹽

一捻煎至半盞去滓溫服此藥大治陰毒傷寒手足

逆冷脈息沉細頭痛腰重連喫三服小兒傷冷每服

一錢入正元散內同煎入鹽一捻陰毒傷寒嗽逆煎

一服細細熱呷立止

吳茱萸散

出聖濟總錄

治傷寒渾身手足厥冷面青唇口

無色心中寒慄宜服

欽定四庫全書

卷一百三十一

硫黃研 芎藭各一分 桂去粗皮 附子炮製去皮臍 吳茱萸湯洗

焙炒

右搗羅馬散煎艾葉湯下三錢陰盛者兼灸每海數

十壯

青白散出聖濟總錄

治陰盛傷寒身體疼痛

石膏半斤 乾薑炮 烏頭捶碎 草烏頭沖碎各一兩已上四味先用鐵

器盛用枝合定石膏燒通赤不令透氣候并研末 麻黃去根節 藿香去根各一兩

皂莢灰 自然銅燒通赤醋碎七次各半兩

右搗研為細散每服一錢空心食前溫酒調下如瘧

傷寒艾茶煎湯調下

返陰散出聖濟總錄 治傷寒四肢厥冷脈微自汗心胃痞

滿

陽起石 石膏 寒水石三味同燒令赤出火毒細研入諸藥 乾薑

炮附子炮製去皮臍 甘草微炙各一兩 硫磺研半兩

右搗研為散每服二錢匕生薑汗溫水調下陰毒併

服之

附子湯 治傷寒憎寒壯熱頭痛膈悶四肢疼倦

附子

炮製去皮  
臍半兩

白茯苓

去黑皮

人參

細辛

去苗葉

柴

胡

去苗陳橘皮

去白焙  
各一兩

甘草

炙

黃耆

炙

厚朴

去粗皮  
生薑汁

炙  
莎草根

去鬚

赤芍藥

各半  
兩

右挫如麻豆每服二錢水一盞入生薑五片棗二枚

擘同煎至六分去滓溫服不拘時

均氣湯 治傷寒表裏未解榮衛氣逆手足厥冷上喘

陰症或霍亂瀉吐非時腹脹及年高榮衛虛弱臟腑

不和膀胱緊急腰腹痺痛及婦人產後勞冷等疾

白朮

米泔浸  
焙乾微炒

天台烏藥

細剉微炒  
各二兩

人參

青

橘皮

去白  
焙

甘草

炙

白芷

各一  
兩

白茯苓

去黑皮  
半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚同煎

至七分去滓溫服如吐逆入藿香少許

四物桂枝湯 治傷寒陰盛

桂

去粗  
皮

麻黃

去根節  
各三分

乾薑

炮

附子

炮製去  
皮臍一兩

右咬咀每服五錢用水一盞半生薑半分切棗三枚

擘破同煎至八分去滓不計時候溫服

桂心湯 治傷寒服冷藥過多心腹脹滿脚膝厥冷昏

悶不知人

桂去粗皮

厚朴去粗皮生薑汁炙各三分

芍藥

乾薑

炮半兩

檳榔

剉半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎取八分去滓入童

子小便一合攪勻空肚腹溫二服

蒸慰方 治傷寒四肢厥冷

用吳茱萸湯洗焙乾三升以溫酒浸令通濕以生絹

袋二個盛蒸令極熱取茱萸袋子更烙熨四肢前後

心及手足心候氣通徹即止

又用前藥熨氣通暢後宜服此方

人參

煨切二兩

右細剉用水一盞半煎至八分去滓溫服如食頃再

服二

韓祗和溫中例

夫傷寒之說始自黃帝以開其端至仲景方陳其條目後世膚淺之學莫知其數立言者只言病在表可發汗病在裏可下或云不可汗不可下即未嘗有溫中說仲景傷寒例尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也辨太陰症云太陰症脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴宜四逆湯又腸滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰症云少陰病始得之發熱脈沉麻黃附子細辛湯又陰病二三日麻黃附子

甘草湯又少陰病脈沉緊溫之宜四逆湯又少陰病身體疼痛手足寒骨節痛脈沉附子湯辨厥陰症云厥陰病吐利手足逆冷煩躁欲死吳茱萸湯今與仲景論中數條最是三陰病之良法今世之用尚有未盡証者愚嘗校自至和初歲迄如今三十餘年不以歲之太過不及為則每至夏至已前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胃膈滿悶或嘔逆或氣塞或腹鳴或腹痛與仲景三陰病說理同而症不同因茲不敢妄投仲

景三陰藥方見脈沉及胸膈滿便投下藥下之往往不  
救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者即膈中便  
快其病勢重者半日許滿衣然或有病人脈沉細遲投  
仲景四逆益湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校量  
此形證今別立不以治之得多對症藥不可不傳焉病  
人但兩手脈沉細數或有力或無力或關脈短及力小  
胃膈塞悶氣短不能相接者便可隨脈症投溫中藥以  
治之病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短

及力小於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹  
滿身體拘急手足逆冷急宜溫之若立春以後至清明  
以前宜溫中湯主之清明以後芒種以前宜橘皮湯主  
之芒種以後至立秋以前宜七物理中丸主之

方

溫中湯

丁皮一兩 乾薑二錢 白朮 丁香各二錢 陳皮二錢 厚朴

製

右為細末每服二錢水一盞蔥白三寸荊芥三錢煎至七分去滓熱服未快手足尚逆嘔吐加舶上丁皮二錢乾薑二錢

橘皮湯

陳皮一兩藿香三錢白朮 葛根各三錢

右為末每服二錢水一盞生薑一塊如棗大槌破同煎至七分去滓熱服如三服未快手足尚逆嘔吐不定加半夏半兩丁香桂枝半兩每服加蔥白三寸煎

服

七物理中湯

白朮五錢乾生薑二錢半人參七錢半桔梗七錢葛根 藿香五錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九水一盞煎至七分和滓熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏半兩乾薑半兩病人手脈沉細無力雖三部脈力停亦是陰氣盛也更不須候寸脈短治之或胃膈滿



悶身體拘急疼痛手足逆冷速宜溫中藥和之至若  
立春以後至清明以前宜厚朴丸主之清明以後至  
芒種以前宜白朮湯主之芒種以後至立秋以前宜  
橘皮湯主之

厚朴丸

當歸 半兩 丁皮 枝枝 厚朴 一兩 細辛 二錢 人參 七錢

甘草 半兩 乾薑 半兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一盞煎至

六分和滓熱服三服後脈尚細及寸脈尚細無力每  
服加蔥白三寸同煎服

白朮湯

白朮 半兩 當歸 厚朴 乾薑 炮已上 丁香 各半兩

錢七

右為細末每服三錢水一盞生薑棗許大搥碎同煎  
至七分去滓熱服三五服脈未有力寸脈尚小加細  
辛半兩每服加蔥白三寸同煎服之

欽定四庫全書

卷一百三十一

橘皮湯

橘皮半兩 藿香兩 葛根各三錢 半夏 厚朴各半兩

右為末每服三錢水一盞生薑如棗大同煎至七分去滓熱服三五服脈尚小手足逆冷加細辛半兩

二苓湯 治病胃膈悶滿時時嘔吐逆肢節疼兩脇下痛腹中鳴此是停飲宜服

赤茯苓 朮猪苓 白朮各半兩 滑石一兩 通草二錢 桂枝二錢半 白豆蔻仁二錢半 丁皮七錢半 陳皮五錢

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服小便未快加瞿麥七錢半嘔未止加半夏半兩浙浙惡寒甚每服加蔥白三寸

灰包熨法

病人服前藥胃膈滿悶者此上焦有陽也或藥力太過上焦有熱也腹滿氣虛耳鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦陰氣併入下焦也雖是下焦積寒冷上焦陽盛更雖投溫下焦藥也當用包灰法炭灰或桑柴灰三

欽定四庫全書

普濟方

三十五

二升許入好酒拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裏置臍下熨之頻換灰包令常熱以腹不滿痛為度或熨時病人不受者勿聽但令極熨之不住灰包可也如灰包熨後得下利三二行或小便二三升或微似有汗此是陰去外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而解病人三部脈沉寸脈小於關尺此為陰盛當溫中藥以消陰氣宜服厚朴丸陳皮人參白朮藿香當歸細辛之類是也神朮湯亦同治陰躁而渴不可誤用

涼藥若熱藥冷服內有伏陽則可若脈虛按之全無力或病人素無食養只可溫服

海藏所製神朮白朮二湯

神朮湯 治內飲冷外感寒邪無汗者

蒼朮 二兩 防風 二兩 甘草 二兩

右咬咀生薑水煎加蔥白三寸如治吹妳煎成調六一散三五錢如神如太陽

發熱惡寒脈而緊者加

羌活如太陽 脈浮緊中帶弦數者是有少陽也加

柴胡如太陽 脈際中帶洪者是有陽明也加黃芩  
已上三法約量每服加二錢不論三陽婦人服者加  
當歸

神朮湯六氣加減例

太陽寒水司天加桂枝羌活  
陽明燥金司天加白芷升麻  
少陽相火司天加黃芩地黃  
太陰濕土司天加白朮藁本

少陰君火司天加細辛獨活

厥陰風木司天加川芎防風

上神朮湯六氣加減法非止為司天之氣設也至於  
歲之主氣與月建日時同前應見者皆當隨所見依  
上例而加減之

神朮加藁本湯每服內加二錢七以意消息

神朮加木香湯每服內加二錢七以意消息

白朮湯出濟生治傷寒冷物外感風邪有汗者

白朮 三兩 防風 二兩 甘草 一兩

右咬咀每服秤三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服無時一日止一二服待三二日漸漸汗出為解風濕症面赤自汗嘿嘿不欲語但欲寐兩手脈浮而緩或微弱此症不宜發汗若汗之令人筋惕肉瞤或譫語獨語或煩躁不卧若下之直視失溲便若火之發狂似驚癇一逆尚引日再逆促命期活人本方葳蕤湯以有麻黃故不敢用宜上白朮湯主之若

頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡蠣若腰背強硬者加羌活若舌乾發渴者加人參若身灼熱甚者加知母若體重多汗者加黃耆若內傷寒者不加

可下論

夫傷寒邪入於陰其病在裏法當下之諸腹滿不大便或口燥舌乾而渴或潮熱譫語皆為可下之病諸診得脈沉而實即為可下之脈但脈證已具不必拘以日數急宜攻裏若病雖過經而裏症未備者未可下也故經

云陽盛陰虛下之而愈其法謂此也變下法太陽發熱汗出不解嘔吐下利而心中痞硬者大柴胡下之又太陽病十餘日熱結在裏往來寒熱亦用大柴胡湯無表裏症發熱七八日脈雖浮數可下大柴胡若大便難身微熱者大柴胡急下太陰腹滿時時痛甚者桂枝加大黃湯少陰口燥咽乾而渴大承氣湯急下之若口乾燥下利清水心下痛者為積証亦用承氣湯又少陰症六七日腹脹滿不大便用承氣湯又少陰惡寒而踈時煩

不欲衣被為表寒重熱大柴胡下之厥陰脈沉短舌卷囊縮為毒氣入臟承氣湯下之若厥冷耳聾囊縮而脈沉眩脈為少勿厥陰兩感下治條又厥陰下利譫語末脈不微細宜小承氣湯

調胃承氣湯 出聖濟總錄 治陽明病不吐不下心煩者可

與調胃承氣湯太陽病三日發汗不解蒸熱者可與調胃承氣湯傷寒吐後腹脹滿者可與此方諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然者或日深心下溫溫欲

吐胃中痛大便溏腹滿鬱鬱微煩此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之致真陰損虛邪熱轉甚因而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結胃俱為熱利不止心下滿鞭或痛煩渴咽乾脈滑數而實諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞭脈滑實際

甘草 二兩 灸 大黃 以清酒洗四兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入芒硝

一錢更煎三沸溫服

調胃承氣加橘皮湯 出聖濟總錄

治傷寒發熱汗不解蒸

蒸發熱者

大黃 剉醋炒 一兩 甘草 灸 陳橘皮 湯洗去白焙各半兩

右細剉每服四錢水一盞半煎至一盞入芒硝一錢攪令勻更煎三兩沸溫服

柴胡大黃湯 出聖濟總錄 治傷寒日數過多心中氣悶或

發疼痛狂言不定煩躁不得眠大小便不通

柴胡去苗 大黃濕紙 朴硝 枳殼去穢炒 甘草炙

兩半

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服日二服不可過多若大小便通則汗自出

宣毒散

出聖濟總錄

治傷寒脈大潮燥伏熱

大黃剉炒 甘草炙剉各半兩 朴硝研一分 牽牛子一兩半生用半炒用

右為散每服二錢用龍腦膩粉蜜水調下一方煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸龍腦膩粉水下

小黃芩湯

出聖濟總錄

治傷寒八九日大便不通心神悶

亂

黃芩去黑心 枳殼去穢炒 大腹剉醋炒 大黃剉炒

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不計時候溫服如人行三五里未通再服以利為度

大青散

出聖濟總錄

治陽盛發狂有斑大小便秘澀

大青 知母 黃芩去黑心 大黃煨 山梔子仁 升

麻 黃連去鬚各一兩 甘草炙剉半兩



右為散每服三錢入朴硝一錢用蜜水調下

承氣丸

出聖濟總錄

治傷寒時氣溫熱病大便不通

大黃

剉炒三分

郁李仁

湯浸去皮研

枳實

去穰麩炒

朴硝

研各一各

右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九生

薑湯下未利再服不拘時候

桃仁承氣湯

出儒門事親

桃仁

去皮尖十二個

官桂

甘草

芒硝

已上各半兩

右剉如麻豆大每服三五錢水一大盞煎至七分去

滓溫服

握宣丸

出儒門事親

白檳榔

肉桂

乾薑

附子

甘遂

良薑

韭子

巴豆

已上各等分

硫黃

一錢

右為細末軟米和丸桐子大早晨先椒湯洗手放溫

措乾用生油少許塗手心男左女右磨令熱握一丸

宣一二行

可吐論

夫諸病吐之而愈者邪在胃中也傷寒大法謂四日以  
 上若入陰經其傳未深邪氣高而裏實客於胃膈下之  
 則動胃發之則亡陽宜吐而出之然亦不必拘此凡寒  
 邪熱毒痰實實在胃中者及有宿食在胃脘者當吐之但  
 診其脈寸口或浮或滑或數或緊與諸部不同者其證  
 胃中心痞滿鬱鬱而痛不能息多涎唾飲食人則吐欲  
 吐復不能出或手足厥冷反心下滿而煩飢不能食吐  
 下後心中懊悶者是也內經所謂其高者則因而越之

即其法也

方

治溫病胃中滿悶取吐

出聖濟  
總錄

猪膽三枚 苦酒二合

右同攪勻錦濾過頓服未吐再服

人參湯出聖濟  
總錄

治傷寒出汗後心胃煩悶煩熱未通

人參半兩 燈心一小束

枳殼去穰麩  
炒一分

大腹皮一枚 茶末

錢二 生甘草半兩

右除茶末各細剉用淡漿水二大盞煎至一盞去滓  
下茶末攪勻分溫二服以紙摵于於咽喉中引取吐  
為度

治胃心痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者

出肘  
後方

以鹽末一大匙以水或煖湯送下須臾則吐吐不快

明旦更服良

治傷寒汗出不解已三四日胃中悶吐

出肘  
後方

以豉并鹽一合水四升煎取一升半分服當吐一方

無鹽用蜜一兩煮三沸頻服安卧當得吐不瘥更服

取瘥

又方

出肘  
後方

以生地黃三斤細切水一斗煮取三升分三服亦可  
服藜蘆吐散及苦參龍膽散

治傷寒心胃中滿悶取吐

右以猪膽一枚取汁醋一小盞酒一小盞內猪膽汁  
相和溫過分為二服當吐立瘥

傷寒過經不解論

夫傷寒為病六經受邪始傳於三陽病在表者可汗其病三日傳於三陰病入裏者可下其不兩感於寒更不傳不加異氣者至七日太陽病裏頭痛少愈八日陽明病衰身熱少歇九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿減如故十一日少陰病衰渴止舌乾而嚏其十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽快也故傷寒愈者皆在十二日若過此經病循不解者

為熱結於裏其狀或譫言妄語或鬱鬱微煩或腹滿吐下皆緣治之宜邪氣稽留故病過經不能解也當隨其症以治若更感異氣變為他病者當依壞病法藥之

方

犀角湯

出聖濟總錄

治傷寒過經不解熱結在裏往來寒

熱煩渴痞悶

犀角屑

一兩

柴胡

去苗

吳藍

各三分

大青

各一兩

升麻

各一兩

烏

梅核黃芩

去黑心各三分

甘草

炙剉半兩

右搗篩每服五錢水一盞半入竹葉三十片煎取七分去滓食後溫服

鼈甲湯 治傷寒過經半月不解

鼈甲去裙攔 醋炙 柴胡去苗 升麻各一兩 烏梅去核 半兩 枳實去穰

麩炒 犀角屑 黃芩去黑心 各一兩 甘草炙剉 半兩

右搗粗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓地黃汁二合攪勻食後分溫二服

木通湯 治傷寒十三日過經不解臍腹脹滿小便淋

澀煩悶乾渴

木通剉 葛根剉 檳榔剉 滑石 瞿麥穗 青橘皮

湯洗去白 鹽炒各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入蔥白二寸同煎至六分去滓溫服不計時候

萬應散 治傷寒過經心胃痞滿煩燥狂言積熱毒氣及婦人血風血氣經候不調寒熱有積

甘遂連珠者 威靈仙去土 五靈脂各一兩

右為散每服一錢如傷寒日數多有積熱者用鷄子青蜜水調下如婦人前見件病症者綿灰酒調下尋常熱氣蜜水調下冷即用蔥湯調下陽毒積熱入臍粉白丁香各半錢生薑汁蜜水調下

柴胡湯 治傷寒發汗下之後過經不解胃脇滿結而不嘔但頭汗往來寒熱小便不通

柴胡 去苗 桂皮 去粗 黃芩 去黑心 牡礪 生用 甘草 炙各半兩

栝蒌根 一兩 木根 剉一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎蔥白五寸同煎至七分去滓食後溫服

保安散 治傷寒過經不解三焦滯悶身重疼痛

黃耆 剉 木通 剉 青橘皮 湯浸去白 桑根白皮 剉 白朮

陳橘皮 湯浸去白 木香 三分 黑牽牛 炒搗取細末一兩

右搗羅為散每服二錢濃煎棗湯調下

麥奴丸 治傷寒五六日以上不解熱在胃中口禁不能言惟欲飲水為壞傷醫所不能治為成死人情魂

已竭心下纔溫以杖發其口開灌藥咽中藥得下則愈麥奴一日黑奴丸二日水解丸

釜底墨 窰底墨 梁上墨 麥奴 黃芩 一方無黃

芩 大黃 芒硝 各一兩 麻黃 二兩

右為末蜜丸彈子大以新汲水五合研一丸破清置水中當藥消盡服之病者渴欲飲飲水極意不問升數欲止復強飲能多飲為善不欲飲水當強飲之服須臾當寒寒竟汗出便解若服藥日移五尺許不汗

如前法不過再三服住小麥黑殼名麥奴乃小麥未熟時叢中不成麥捻之成黑勃是也無此亦得此藥須是病人大渴倍常盛渴者乃可與之不渴者與之反為禍耳

柴胡飲子 治解一切肌骨蒸積熱作發寒往來表熱裏和則發寒裏熱表和則發熱邪熱半在表半在裏出入進退無和積寒熱往來陰陽相盛也畜熱寒戰表之陽和正氣與邪熱並畜脈道不行故身冷脈絕

寒戰而反煩渴也及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後未熱愈汗後榮傷或骨蒸痿喘嗽婦人餘疾產後經病及治小兒傷寒五七日陰陽不和唇焦口乾燥咽乾大便秘澀

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃 當歸 芍

藥各半兩

右為末每服炒三錢水一盞生薑三片煎至七分溫服日三服病熱甚者加減之崔氏方加半夏五味子

桔梗各三錢劉氏方用柴胡甘草各二兩黃芩當歸芍藥大黃各一兩人參半夏各半兩右如大勞熱病五七錢以利為度未利更加使病不再發也

和解湯 治氣血虛弱外感寒邪身體疼倦壯熱惡寒腹中疼痛鼻塞頭昏痰多咳嗽大便不調

白芍藥

桂各三分

厚朴

甘草

乾薑

白朮

各一

兩人參

茯苓

各一兩半

右為粗末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至



六分去滓溫服不計時候

順氣人參散 溫和表裏祛逐風寒治壯熱頭痛項強  
腰痛心胃氣痞咳嗽痰多發熱惡寒咽膈不利

人參 桔梗 乾薑 白芷 白朮 甘草  
各一兩 半

右為粗末每服二錢水一盞薑三片蔥白二寸煎至  
七分去滓溫服

大神木湯

出濟生  
拔粹方

通解四時傷寒

蒼朮 四兩 製 羌活 防風 川芎 薊 黃芩 枳殼

一作 枳實 兩 甘草 各半 白芷 一兩 半 石膏 二兩 半 細辛 三兩 知母

七錢

右咬咀石膏為細末入藥水煎飲汗之熱服湯投春  
倍防風羌活夏倍黃芩知母季夏淫雨倍朮五錢各  
加至一兩亦可以意消息隨症增損非發熱而渴非  
裏實心下滿不可用枳實也

麻黃升麻湯

出直  
指方

治傷寒發汗解利不止血氣壅泄

謂紅汗者是也

麻黃

去節湯泡  
二兩半

升麻

一兩

黃芩

芍藥

石膏

煨甘

草

生

茯苓

各一兩

右剉散每服四大錢水一盞半薑三片煎至七分去

滓熱服微汗散

敗毒散

出直  
指方

傷寒熱證通用

人參

赤茯苓

川芎

北梗

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

甘草

炒等分

右剉散每服三錢薑五片三服

人參順氣散

出鮑  
氏方

治傷寒壯熱肢節疼痛手足冷麻

半身不遂

麻黃

三兩

乾薑

一兩

乾葛

白朮

白芷

桔梗

各六兩

川芎

茯苓

陳皮

各四兩

甘草

三人

參

二兩

右為末每服用二錢薑三片白三寸薄荷三葉煎

不拘時有汗應勿服

中風傷寒論

夫中風傷寒三陽三陰候各不同大陽中風其脈陽浮

陰弱其症發自汗蓋陽浮熱自發陰弱汗自出音音惡寒淅淅惡風燿燿發熱鼻鳴乾嘔又曰太陽病發熱汗出脈緩者名爲中風不可燔灸若以火發其汗邪風爲火熱所劫血氣流溢榮衛失常兩陽熏灼其身發黃陽盛即衄陰虛即小便難陰陽俱虛竭則身體枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫言甚者至噦手足搔擾循衣摸牀其小便利者可治陽明中風積陽明病能食爲中風其症口苦咽乾腹滿微

喘發熱惡寒脈浮若緊下之則腹滿小便難不能食爲中風少陽中風兩耳無聞目赤胃中滿而煩不可吐下吐下之則悸而驚太陰中風四肢煩疼其脈陽微陰澀而長爲欲愈少陰中風其脈陽微陰浮爲欲愈厥陰中風其脈微浮爲欲愈不浮爲未愈凡此六經中風之病其狀雖異大抵其脈皆浮經所謂浮爲風是也又曰人之冒風也輕則爲傷重則爲中足之三陰三陽皆有傷風漢張長沙論何獨於太陰一經云有汗惡風爲傷風

無汗若寒爲傷寒傷風可解肌宜用桂枝湯傷寒可發汗宜用麻黃湯二藥均爲解散正分陰陽不可不謹也其餘諸經並爲分別蓋風邪客於肌表在經絡中循經流注以日傳變與傷寒無異故前輩但以太陽一經格量傷寒傷風症治不同其餘語經可以類推但後之學者未明其理余遵先哲以太陽爲始分注六經傷寒脈證使之開卷易明無使疑惑且風傷於陽干於衛自汗餘各隨其經絡而見其經也足太陽膀胱經傷風其脈

陽浮而陰弱其證惡風自汗頸項痛身體疼腰脊強以其脈從巔入絡腦還出別下項循肩膊內使脊低腰中足陽明胃經傷風脈浮強長而數其證惡風自汗嗜卧身重口燥煩渴能食小便難腹中滿微喘以其脈俠鼻絡目下膈屬絡脾俠臍氣街中足少陽膽經傷風其脈陽浮而陰弦其症風自汗經項強弱下滿手足溫口苦咽乾而渴以其脈起目兌皆上抵頭角入缺盆下胃貫膈循脇裏出氣街中足太陰脾經傷風其脈弦大而緩

其症自汗咽乾胃滿腹痛手足自溫四肢倦怠以其脈入腹絡胃上膈俠咽連舌本足少陰腎經傷風其脈沉而弦其證自汗咽口燥舌乾胃滿心煩腰疼連胛骨痠痛嘔吐涎沫以其脈貫脊屬腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本足厥陰肝經傷風其脈尺寸俱微而遲其證惡風自汗而倦小腹急滿寒熱如瘧骨節煩疼以其脈循股入陰器毛中環陰器俠胃絡膽而脇助與督脈會於巔故六經傷風脈症不同也治之各有其法至於手

足三陰三陽並無傷風惟肺有者蓋肺爲五臟六腑華蓋主行氣溫於皮毛形寒飲冷則傷之肺傷風證自汗惡風皮膚熱痛隱隱頭疼咳嗽聲重但以清涕鼻酸者驗其肺之有熱涕出若濁者肺經俠寒也其脈三部俱浮者重但見寸口者輕脇熱者宜羌活湯有汗者宜麻黃細辛湯又有風溫風濕諸症不同用藥亦異學者當明辨之

方

防風湯 治中風傷風

防風 去心 麥門冬 去心 山芋 大黃 剉 炒 去粗皮 白

朮 白附子 炮 牛膝 去苗酒 浸切焙 半夏 湯洗七遍與生薑等分同搗焙

芍藥 肉蓯蓉 酒浸切焙 遠志 去心 黃耆 剉 乾薑 炮 各三分

甘草 炙半兩

右搗粗篩每服五錢水一盞入生薑一棗大拍碎棗

二枚去核同煎八分去滓溫服空心日午臨卧各一

服

石膏湯 治中風傷寒頭痛四肢痠痛身體沉重

石膏 甘草 炙 麻黃 去根節煎 掠去沫焙 桂 去粗皮 芍藥 各三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎

煎至八分去滓空心溫服

薑附湯 治傷寒巨陽中風項背強脊惡寒汗不出

附子 炮製去皮 臍一兩 乾薑 炮 葛根 甘草 炙 剉 去粗皮 桂 各三分

芍藥 半兩 麻黃 去根節煎 掠去沫焙一兩半

右剉如麻豆每服三錢水一盞入棗二枚去核同煎

至七分去滓食前溫服取汗未汗再服

桂附湯 治中風傷寒頭目四肢疼痛惡寒乾嘔

桂去粗皮芍藥各一兩半甘草炙一兩附子炮製去皮臍三分麻黃

去根節先煎掠去沫焙乾一兩

右挫如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍

碎棗二枚去核同煎至八分去滓食前溫服以熱粥

投之取汗避風

麻黃桂心湯 治中風傷寒脈浮腎發熱惡寒身體疼

痛汗不出而煩

麻黃去根節先煎掠去沫焙二兩桂去粗皮甘草炙剉乾薑炮各一兩石

膏一兩半乾薄荷葉 杏仁去皮尖雙仁麩炒各半兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半入棗二枚去核同煎

至八分去滓食前溫服

麻黃湯 治中風傷寒頭痛沉重

麻黃去根節先煎掠去沫焙二兩附子炮製去皮臍一兩細辛去苗乾

薑炮各三分甘草炙剉杏仁去皮尖雙仁半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓食前服日三服

桂心湯 治中風傷寒頭痛發熱胃中氣逆惡寒嘔噦

小便難足冷

桂去粗皮芍藥 附子炮製去皮臍麻黃焙各三分甘草炙杏

仁去皮尖乾薑炮各半兩半夏湯洗七遍生薑等分同搗焙

右剉如麻豆每服三錢水一盞入蔥白三寸生薑一棗大拍碎同煎至七分去滓食前溫服日三服

桂枝湯 治中風傷風寒初得其外症頭項疼腰背強

硬壯熱語澀恍惚涕唾稠黏偏身拘急

桂去皮三分芍藥 芎藭 菖蒲 半夏湯洗七遍生薑等分同搗焙附子

炮製去皮臍麻黃去根節先煎去沫焙羌活去芦頭細辛去苗葉白

芷一分

右挫如麻豆每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎煎至七分去滓食前溫服蓋覆取汗

天麻湯 治中風傷寒身體反強



天麻

麻黃

去根節先煎  
掠去沫焙

羌活

去蘆頭

附子

炮製去  
皮臍

桂

去粗皮  
各半兩

杏仁

去皮尖  
雙仁炒

人參

細辛

去苗  
葉

白朮

各一  
分

右挫如麻豆每服四錢水一盞酒半盞入生薑一棗

大拍碎同煎至八分去滓食前溫服

二附湯

治中風傷寒頭痛四肢煩疼

附子

炮製去  
皮臍

白附子

炮半夏

湯洗七遍炒  
乾各一分

右搗羅為散每服半錢濃煎生薑湯調下不拘時候

得汗即止

麻黃細辛丸

治中風傷寒頭痛惡寒四肢煩疼心中

燥悶

麻黃

去根節煎掠  
去沫焙一兩

細辛

去苗  
葉

人參

甘草

炙白茯苓

苓

去黑  
皮

白朮

各半  
兩

栝樓根

三  
分

右搗羅為末煉蜜和丸如鷄頭大每服一丸食前薄

荷蜜湯研下

白朮湯 治中風傷寒初受病一日至三日頭痛肢節

疼煩躁惡風身熱增寒

白朮 石膏 各二兩 乾薑 炮半兩 五味子 炒 甘草 炙人

參 芍藥 麻黃 去根節煎掠去沫焙各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚同煎

至七分去滓稍熱服

石膏芍藥湯 治中風傷寒壯熱肢節疼痛頭目昏眩

并咳嗽喘麤

石膏 碎 芍藥 前胡 去蘆頭 葛根 柴胡 去苗各一兩 升

麻 半兩 桑根白皮 剉 荆芥穗 各三分 黃芩 三分

右粗搗篩每服三錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服

前胡湯 治中風傷寒頭目昏眩壯熱肩背拘急疼痛者用

前胡 去蘆頭 蔓荆實 去白皮 芍藥 麻黃 去根節煎掠去沫焙 甘

菊花 防風 去叉 羌活 去蘆頭 白茯苓 去黑皮 石膏 碎 甘

草 炙剉各三兩 枳殼 去穰炒 黃芩 一兩半

右藥搗篩每服三錢水一大盞入生薑一片煎至七

分去滓溫服

石膏獨活湯 治中風傷寒頭痛體疼發熱惡寒

石膏 碎一兩 羌活 去蘆頭 獨活 去蘆頭 麻黃 去根節煎掠焙 甘草

炙 天南星 炮 青橘皮 去白麩炒 枳殼 去穰炒 乾薑 炮 柴胡

去苗 益智 去皮 桂 去粗皮 各半兩

右粗搗篩每服三錢水一大盞葱白二寸豉二十七粒

煎至七分去滓熱服蓋覆取汗

荊芥湯 治中風傷寒頭目昏眩增寒壯熱四肢煩倦

荊芥穗 木通 剉各四兩 羌活 去蘆頭 獨活 去蘆頭 芎藭

甘草 炙 麻黃 去根節煎掠去沫焙各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

前胡白朮湯 治中風傷寒百節痠疼

前胡 去蘆頭 白朮 防風 去叉各二兩 柴胡 去蘆苗 草白

鮮皮 各一兩半 石膏 碎三兩 甘草 炙二兩 麻黃 去根節煎掠去沫焙四兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入薄荷五葉同煎至七

分去滓溫服不拘時

百解湯 治中風傷風身熱頭痛肢體煩疼

前胡 去蘆頭 柴胡 去苗 甜葶藶 微炒 半夏 湯洗七遍 羌活 去芦頭

獨活 去蘆頭 桔梗 人參 白朮 枳殼 去穰炒 甘草

炙杏仁 湯洗雙對 陳橘皮 湯洗去白焙 白茯苓 去黑皮 石膏

碎芎藭 麻黃 去根節湯煮掠去沫焙等分

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七

分去滓溫服不拘時候

姜蕤湯 療冬溫及春月中風傷寒則發熱頭眩痛咽

喉乾舌強胃中內疼心胃痞滿腰背強

姜蕤 二兩 石膏 三分米 白薇 麻黃 去節 獨活 一方用羌活

杏仁 去皮尖雙仁 芎藭 甘草 炙 青木香 各二兩無可用射香一分

之伐

右切以水八升煮取三升分三服取汗若一寒一熱者加朴硝一分及大黃三兩下之忌海藻菘菜一方

有葛根二兩

陽旦湯 療中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風項頸

強鼻鳴乾嘔

大棗十二枚 桂心 芍藥 生薑各三兩 甘草炙 黃芩

各二兩

右咬咀以泉水六升煮取四升分四服日三服自汗者去桂心加附子一枚炮渴者去桂加栝蒌三兩利者去芍藥桂加乾薑三累附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦主之煎得二升內膠飴半升分爲再服若脈浮緊發熱者不可與

也忌海藻菘菜生蔥等物

三七湯 治傷寒憎寒壯熱三日至七八日不解胃脇

痛四肢逆乾嘔水漿不下腹中宿食不消重下血一

日數十行

茯苓如鷄子大 黃芩 人參各三兩 栝樓根四兩 芒硝 乾

地黃各一升 大黃 麻黃 寒水石各半斤

右搗篩令相得以散三方寸水一升煮令三沸絞去

滓服之日三溫服覆汗出即愈病劇與六七

麻黃湯 治傷寒中風頭疼腰膝痛四肢不利壯熱取汗不出而喘滿及發熱惡風骨節疼痛

麻黃 三兩去根節 桂心 去粗皮 甘草 各一兩炙微赤對 杏仁 研如膏

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服頻服之汗出為度若病自汗者不可服

葛根湯 治傷寒中風項背強急漉漉汗不出者

葛根 一兩對 麻黃 去根節 甘草 炙微赤對 芍藥 桂心 各一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎

至六分去滓溫服頓服汗出為度患傷寒無汗惡風項既屈而且強予曰項強兀兀葛根湯症或人問曰何謂兀兀予曰兀兀者兀足疾屈而強也謝復古謂病人羸弱項憑凡而起誤也蓋仲景論極有難曉處振振欲擗地心中懊懷外氣怫鬱鬱胃不仁高內拒痛如此甚多宋迪其猶予感傷寒之初不能下其病症見其消渴而汗多以掠藥解治至於再三遂成陰毒六日卒迪痛悼之遂著陰毒形症訣三篇

姜蕤散 治傷寒中風發熱頭痛咽乾舌強胃中痞滿

腰背強不得汗

葳蕤 一兩 石膏 二兩

白薇

麻黃

去根節

獨活

甘草

炙

赤杏仁 對

湯浸去皮尖雙仁炒微黃

木香

各一兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服汗

出為度

菰蘆湯 治傷寒中風五六日已上但胃中燥乾嘔

菰蘆 一兩

柴胡 二分

去苗一作半斤

黃芩

甘草

各一兩炙微赤對一作各

三兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎

至六分去滓溫溫頻服一方作生薑四兩棗十枚擘

破切之勿令大碎吹去沫以水一斗二升煮取六升

絞去滓更煎取三升適寒溫服一升日三服忌海藻

菘菜

猪苓散 治傷寒中風發熱六七日不解而煩渴欲飲

水而吐逆

猪苓 去黑皮

澤瀉

赤茯苓 各一兩

桂心

白朮 各半兩

葛根 一兩剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服頻

服

甘草瀉心湯 治傷寒中風下之後日數多腹中雷鳴

心下痞堅而滿乾嘔而煩非是結熱是胃中虛氣上

逆也

甘草 一兩炙微赤剉碎

黃芩

乾薑 炮製剉

半夏

湯洗七遍去滑黃

連木通 去鬚剉各半兩

右為細散每服三錢水一中盞入棗二枚煎至五分

去滓溫服日三四服

桂心散 治傷寒中風脈浮熱往來汗出惡風項強鼻

鳴乾嘔

桂心 赤芍藥 獨活 黃芩 各三分 甘草 半兩炙微赤剉

杏仁 三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚



煎至六分去滓温温頻服

大青龍湯 治傷寒中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛

汗不出煩燥宜服此方

麻黃 二兩去根節 桂心 甘草 炙微赤各一兩 石膏 一兩半 杏仁

半兩湯洗去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓稍熱頻服汗出為度一方不可再服服之則筋惕肉瞤此為逆也不汗乃再服

附子散 治傷寒中風四肢不舉言語蹇澀煩疼壯熱

附子 炮製去皮臍 人參 去蘆頭 桂心 麻黃 去根節 茯苓 各二

兩 漢防已 黃芩 各一兩 甘草 炙微赤對 赤芍藥 各一兩 枳

殼 二兩麩炒微黃去穰

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓稍熱頻服

治傷寒中風陽虛熱自發陰弱汗自出漉漉惡寒翕發

熱鼻鳴乾嘔

桂心 甘草

炙微赤剉

赤芍藥

各一兩

葛根

一兩半剉

右為細散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二

枚煎至六分去滓溫服日三服夜一服一方無桂心

桂附散 治傷寒中風身體疼不煩燥能自轉側脈浮

虛者可發汗

桂心 附子

炮製去皮臍各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓稍熱服衣覆出汗若大便鞭小便自利去桂

加白朮一兩三錢

治傷寒中風骨節疼痛煩悶不得屈伸近之則痛劇汗

出短氣小便不利惡寒或身微腫

麻黃

二兩去根節

附子

一兩炮製去皮臍

白朮

各二兩

赤

芍藥

甘草

各一兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服每日四五服

柴胡散 治傷寒中風汗後虛躁頭疼四肢乏力

柴胡 一兩半 去苗

石膏 三兩 去蘆

茯神 枳實 麩炒 微黃

桑根白皮 剉 麥門冬 去心 各一兩 桂心 白朮 防風

去蘆 地骨皮 甘草 各三分 炙 微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服日三服夜一服

藿香散 治傷寒中風頭昏皮膚疼痛

藿香 一兩 炮製 白附子 半兩 炮製 零陵香 一兩 半夏 半兩 湯浸 七遍去滑 甘松

香 一兩 川烏頭 半兩 炮製 去皮臍 牛黃 細研 射香 各一錢 細研

右為細散與牛黃射香同研令均每服以熱葱酒調

下二錢日三服夜一服

天麻散 治傷寒中風筋脈拘急

天麻 附子 炮製去皮臍 川烏頭 炮製去皮臍 乾蠍 微炒 石膏

白附子 炮製 天南星 炮製各半兩 雄黃 一分 細研 射香 一錢 細研

右為細散每服生薑湯調下一錢日三四服

白附子散 治傷寒中風頭疼項強身體壯熱服諸藥

不得汗者用

白附子

附子

天麻

各半兩

天南星

朱砂

細乾研

蠍

各一分

半夏

烏頭

各半錢

麻黃

半兩去根節

右為細散入研了朱砂令勻每服以生薑湯調下一

錢良久以熱葱豉粥飲投之當便出汗

烏頭散

治傷寒中風語澀四肢拘急壯熱

川烏頭

半兩炮製去皮臍

防風

去蘆頭

羌活

各一分

丹參

麻

黃

去根節各半兩

桂心

白朮

各一分

乾蠍

一分微炒

黑豆

一合炒熟

右為細散每服不計時候以熱酒調下二錢良久再

服以汗出為度

治傷寒中風頭強汗不出煩悶

麻黃

去根節

防風

各一兩去

川烏頭

炮製去皮臍

桂心

乾

薑

各半兩炮製剉

右為散每服不計時候以溫酒調下二錢頻下二服

以衣覆之汗出為度

桂苓甘露散

治傷寒中風冒暑飲食內外一切所傷

傳受濕熱內甚頭痛口乾或吐瀉煩渴或小便赤澀

大便急痛或瀉痢間作病一切濕熱霍亂吐瀉轉筋  
急痛腹滿痛悶或中外諸邪所傷而并吐瀉者溫之  
熱時尤宜服之

桂半茯苓兩白朮各半甘草炙澤瀉兩石膏兩寒

水石各一滑石二

右為細末熱湯調下三錢欲飲冷者新水調下或生  
薑湯調下尤良小兒服一錢一方有猪苓半兩

薑附湯 治傷寒已經轉下又當發汗內外俱虛邪氣

未解表証不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即  
安靜不嘔不渴脈候沉細者宜服之又治暴中風冷  
久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾薑一兩附子生去皮臍

右令勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫  
服

桂枝麻黃各半湯 治風症見寒脈寒証見風脈

桂枝兩麻黃兩芍藥各半生薑兩杏仁十四大棗個

二個

右為散每服四錢煎溫服

羌活湯 治傷寒協熱

羌活 麻黃去節 石膏 細辛去苗 前胡 川芎 防

風各一兩 黃芩 枳殼炒去瓢 甘草炙各半兩 薄荷葉一分

右為細末每服五錢水二盞薑三片煎至一盞去滓

溫服

細辛湯 治傷風協寒

細辛去苗 甘草炙各一兩 麻黃去節 桂枝去粗皮 杏仁半兩去皮

尖

右為細末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服

神末散 治傷風肌疎多汗

蒼朮二兩米泔浸去皮薄切用麥炒 川芎 藁本 荆芥各一兩

右為粗末每服五錢水二盞薑三片煎一盞去滓熱

十棗湯 治太陽中風吐下嘔逆者

芫花 熬 甘遂 大戟 各等分

右各節末取大棗十枚水一升半煮取八合去滓內諸藥強人一錢羸人半錢溫服之不下明旦更加半錢下後糜粥自養病懸飲者亦主之

治傷寒鼻塞

以東霜作團食之

普濟方卷一百三十一

總校官候補知府 臣 葉佩蓀

校對官編修 臣 祁韻士

謄錄監生 臣 魏 鎔