


聖濟總錄

卷三

內閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200 (141)		
函號	300	212	



大學東
校典藉
局之印



痔瘻門

大德重校聖濟總錄卷第一百四十二



脉痔

血痔

腸痔

氣痔



總錄一百四十二



大醫正統聖教醫藥卷一百四十二

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

脉痔

論曰脉痔者藏府蘊積風熱不得宜通也風熱之氣乘虛流注下部故肛邊生瘡痒痛血出也蓋實為痛虛為痒今實熱乘虛下攻肛腸故痒且痛又脉者血之府得熱則妄行故血乃出也
治脉痔生瘡下血痒痛槐莢煎丸方

槐莢

壹斤淨洗并子爛研入水半升同研振取汁

白蜜

貳兩與槐莢汁同熬成膏

枳殼

去瓢麩炒壹兩

黃耆

防風

去叉各半兩

杏人

湯去皮尖雙入人麩炒研入

皂莢子

炮去皮各參分

右七味除前膏并杏人外搗羅為末與杏人和勻以

槐莢膏再和杵二三百下丸如梧桐子大每服二十丸清米飲下早晚食前服

治脉痔下血大腸腫痒大聖散方

枳殼

拾肆枚

胡桃

拾枚

荆芥穗

木賊

炒各兩

延胡索

兩半

右五味將枳殼胡桃同入藏瓶內用泥固濟燒存性搗後三味為細末再同研勻每服二錢匕米飲調下

治脉痔有蟲時或痒痛血不止薑附湯方

生薑

艾葉

各半兩

附子

炮裂去皮臍

枳殼

去瓢麩炒各參分

生地黄

壹兩半

右五味判如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓早晚食前溫服

治脉痔下部痒痛生瘡血出阿膠湯方

阿膠

艾葉

當歸

切焙

青箱子

各壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓早晚食前溫服

治脉痔痒痛下血不止檮根散方

檮根皮

洗切

枳殼

去瓢麩炒各參兩

皂莢子

取人炒貳兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調下早晚食

前服

治脉痔肛邊生瘡痒痛殺蟲散方

獼皮

右一味燒灰細研空心米飲調下二錢七日晚再服

治脉痔下部痒痛成瘡塗痔槐白皮膏方

槐白皮伍兩

赤小豆伍合

棟實

槐實

各伍拾枚

當歸切焙參兩

白芷

甘草各貳兩

豬脂參斤

右八味剉細七味先熬脂令沸下諸藥同煎候白芷黃赤色綿絞去滓瓷合盛每用塗摩瘡上日三五次

治脉痔生瘡痒痛下部如蟲齧熏痔湯方

苦桃皮

李株皮

萹蓄

苦參

各壹兩

右四味剉碎以水六升煎至四升去滓乘熱熏洗日三五次

治脉痔下部痒痛四松腫起出血搨痔大豆帛方

大豆

升參

甘草壹兩

槐白皮參兩

右三味除豆外細剉先以水一斗入豆煎汁至二升去豆次下甘草槐皮同煎至一升去滓浸故帛三四重搨下部冷即再煖日三五次

治脉痔下部如蟲齧內下部露蜂房方

露蜂房

生螺屬各壹兩

右二味燒灰細研為末以綿裹二錢匕內下部中日

晚再易

治脉痔有蟲或下膿血熏痔槐白皮湯方

槐白皮貳斤

右一味細剉以水一斛五升煎至一斛去滓傾盆中

坐熏冷即再煖蟲當隨便利自出更搗槐白皮末綿

裹一錢內下部中

治脉痔下部如蟲齧出蟲方

桃葉

壹斤

右一味蒸令熱內小口器中布覆熏之蟲即出

治脉痔下部如蟲齧痒痛出血滌痔散方

白礬

末半兩

右一味取小便三升入礬末乘熱洗之

治脉痔下部如蟲齧傅痔蝟皮散方

蝟皮

右一味燒灰研為末每用少許生油調傅之

血痔

論曰血痔者肺熱流毒也肺與大腸為表裏今肺藏蘊

熱毒氣流滲入於大腸血性得熱則流散故因便而肛腸重痛清血隨出也

治血痔蛭皮散方

蛭皮

燒灰存性

黃耆

剉

熟乾地黄

焙

續斷

柏葉

地榆

剉

白芷

黃連

去須各等分

右八味搗羅為散每服二錢匕食前溫湯調下

治血痔清血隨大便出雷丸丸方

雷丸

參兩

紫參

秦艽

去苗土

藥本

去苗土

石南葉

白芷

廣蟲

炒

厚朴

去麤皮薑汁炙

亂髮

燒灰

貫衆

紫苑

蟲蟲

去翅足炒各半兩

豬後懸蹄殼

炙令焦拾肆枚

右一十三味搗羅為末鍊羊髓為丸如梧桐子大空

心米飲下十五丸至二十九日晚再服以差為度

治血痔因便清血隨出者槐莢子丸方

槐莢子

貳兩炒

枳殼

去瓢炒

威靈仙

去七各壹兩

乾薑

炮

白礬

燒令汁盡各半兩

熟乾地黄

焙

連翹

當歸

切焙

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩

附子

炮裂去皮臍去

續斷

各半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大陳米飲下十丸至二十九食前服

治痔下血地榆湯方

地榆

艾葉

枳殼

去瓢 麩炒

黃耆

防風

龍骨

桑耳

各壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生地黃一分

拍碎同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治諸痔下血虛損甚者黃耆湯方

黃耆

剉壹兩

當歸

焙切

芍藥

各壹兩半

龍骨

兩半

芍藥

桂

去麤皮 各貳兩

附子

炮裂去皮臍

甘草

炙各壹兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入沙糖半

分煎至七分去滓空心溫服日晚再服

治諸痔下血蒲黃湯方

蒲黃

當歸

白芷

白石脂

黃連

芎藭

生乾地黄

焙

甘草

炙各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心溫服日晚再服

治血痔出膿血及腸風痔瘻比金丸方

蜜陀僧

白礬

槐實

炒為末

皂莢燒灰研各壹兩

右四味將蜜陀僧白礬搗碎入瓷罐內燒通赤放冷取出搗細為末次入槐實末皂莢灰和勻用糯米飯丸如梧桐子大每服十五丸空心食前米飲下

治血痔下血至多赤石脂丸方

赤石脂

白礬

燒令汁盡

龍骨

各壹兩半

杏人湯浸去皮尖雙

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心棗湯下

二十九日再以差為度

治血痔下血黃耆散方

黃耆

枳殼

去瓢麩炒各參兩

防風

去叉壹兩半

右三味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下日晚再服

治痔疾下血枳實散方

枳實

槐實

木賊

各半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕煎皂莢子湯調下不計時候

治血痔何首烏丸方

何首烏去黑皮 威靈仙去苗土 枳殼去瓤等分

右三味搗羅為末浸蒸餅丸如梧桐子大每服二十

丸溫水下早晚食前服

治痔疾下血鹿角丸方

鹿角壹兩燒紅候冷研 芸薹子炒研半兩

右二味搗研為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服十

五丸飯飲下溫酒亦得食前服

治痔疾下血荆芥散方

荆芥穗陳者 狗脊去毛剉各壹兩

右二味搗羅為末每服二錢匕濃煎木賊湯調下若

瀉血甚者加醋石榴皮等分為散以淡醋湯調下不

拘時服

治痔下血香連散方

黃連去須 麩各兩

右二味搗羅為散每服二錢匕用蜜湯空心調下晚

再服

治血痔地榆散方

地榆剉

右一味搗羅為散每服二錢匕飯飲調下日三服

治血痔便清血惠痔方

治血痔坐痔橘皮散方

雄黃

熟艾各半兩

右三味畧搗碎先掘地作一坑內藥以炭火燒煙出當上坐熏患處以衣被圍身勿令煙出煙盡即止將息三日再熏不過三五度差

治血痔坐痔橘皮散方

陳橘皮貳斤參伍年者細搗炒令熱

右一味乘熱用絹袋二枚盛橘皮縛定更互坐上冷即易取差為度

治血痔淋洗桃根湯方

桃根斤半

右一味細判用水一斗煎至五升去滓溫洗日三五度

治血痔風冷積年難差洗痔稻藁洗方

稻藁

右一味燒灰以湯淋汁洗下部日三五遍取差為度

治五痔大腸下血烏蛇散方

烏蛇酒浸去皮骨炙令黃 枳殼去瓢炒

天麻

槐實炒 黃耆炙

桑黃酒浸炙令赤各壹兩

桂皮去麤 當歸切

附子炮裂去皮臍

赤芍藥各參分 白礬燒過

蝟皮炙令焦各半兩

麝香細研

右一十三味擣羅十二味為散入麝香研令勻每服

二錢匕空心用陳米飲調下日再溫酒亦得

腸痔

論曰腸痔者以腸胃有風挾熱二者乘虛入於腸間衝發下部故令肛邊生核腫痛不消病始作令人寒熱時有血出也

治腸痔生核腫痛時下膿血蝟皮散方

蝟皮炙焦壹枚

管實薔薇根是也

枳殼去瓢炒

黃耆焙

槐豆炒

桑耳微炙各壹兩

人參

地榆炒

當歸焙切

烏賊魚骨炙去甲各壹兩半

右一十味擣羅為散空心煎木賊湯調下三錢匕日晚再服以差為度

治腸痔腫痛生核或發寒熱枳殼湯方

枳殼去瓢炒壹兩

黃耆剉貳兩

芎藭

丹參

當歸切焙

檳榔剉各壹兩半

芍藥

黃芩去黑心各壹兩壹分

右八味麝搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心食前溫服

治腸痔鼈甲散方

鼈甲醋炙去 蝟皮炙 蛇蛻皮剉炒

露蜂房剉炒 豬懸蹄殼炙魚各

右五味搗羅為散每服二錢匕空心以井華水調下
日晚再服兼取少許傅瘡上以差為度

治腸痔每大便常有血礬附九方

白礬熬令 附子炮裂去皮

右二味搗研為末鍊蜜和左梧桐子大每服五丸溫
酒下日三服稍增至十九丸數日永差

治腸痔發痛消腫威靈仙散方

威靈仙去土 防風去叉 枳殼去瓢

黃耆剉各

右四味搗羅為散每服二錢匕麝香熱米飲調下日
可二服不拘時候常服祛風氣辟溫疫消腫滿除五
痔等患

治腸痔有血方

白薔薇根 枸杞根暴乾各

右二味搗羅為散每服二錢匕溫水調下日三服
治腸痔下部腫痛便血後重坐臥不安楛藤子丸方

楛藤子兩 威靈仙揀淨剉碎水

續錄一百四十二
大黃煨過各
貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲下空心食前服

治腸痔腫痛時有膿血柏葉丸方

柏葉

烏梅肉

暴乾各壹兩

皂莢

壹挺去皮并子水浸透搗

研取

右三味除皂莢外搗為末將皂莢汁和丸如梧桐子大每服十九溫熱水下食前服之

治腸痔肛邊腫痛生核下血龍參丸方

地龍

乾者壹兩

苦參

壹兩

烏頭

去皮臍半兩半生半炮

右三味為末以醋糊為丸菘豆大每服七丸至十九食前米飲下日三

治腸痔下部生核腫痛發寒熱出血地榆散方

地榆

甘草

半炙半生

陳槐花

半炒半生各壹兩

右三味為散每服二錢匕濃煎枳殼桑根白皮湯調

下空心食前服

治腸痔下血栝樓散方

栝樓實

大好者壹箇

烏梅肉

拾箇

右二味先將栝樓切下蓋少取瓢以烏梅肉實其中却蓋定用黃泥固濟候泥乾以火煨存性取出去泥

細研為散每服二錢匕空心溫酒調下
治腸痔下血枳實丸方

枳實伍兩去瓢麩炒搗為末 皂莢刺燒存性為末參兩

右二味每服以水一盞用藥一丸皂莢刺末一錢半同煎至七分入麝香少許放溫服

治腸痔生核腫痛發歇不定又名風痔者水梅丸方

白殭蠶剉炒微黃貳兩

右一味為末用水梅肉和丸如梧桐子大每服蜜湯下五丸空心食前服

治腸痔肛邊有核痛發寒熱生瘡妙應膏方

豬懸蹄殼伍枚 生梧桐白皮肆兩 龍膽貳兩

生桑根白皮半兩 蛇蛻皮 雄黃研各壹兩

生青竹皮 生栢皮各貳兩 露蜂房壹兩

蜀椒去目并合口者炒出汗參分 蝟皮

附子各壹兩 杏人去皮尖雙核拾枚 豬脂壹斤

右一十四味除雄黃脂外剉碎以醋一升拌一宿先熬脂令沸卽下諸藥候桑皮赤黑色以綿絞去滓再煎下雄黃以柳篋攪令勻於瓷合內盛每日空心溫酒調服一棗許日晚再服更取棗核大用綿裹內下部日再換以差為度

治腸痔淋洗二皮湯方

桃皮 李皮 篇蓄

苦參 各壹兩

右四味剉碎以水一斗煮取五升去滓熏洗候冷即
止日再用

治腸痔生核腫痛熏洗方

荆芥穗 黑狗脊 鮫鯉甲

枳殼 去瓤 燻炒

右四味等分爲麤末每用一兩以水二升煎數沸去
滓乘熱熏候通手淋洗

治腸痔腫核疼痛不可忍熨痔枳殼散方

枳殼 去瓤 燻炒 肆兩 訶梨勒皮 貳兩

右二味搗羅爲散銚子內炒令熱以帛裹熱熨冷即
再炒

治腸痔腫痛初覺生核熏之方

荆芥穗 甘草 剉

右二味等分爲麤末每用兩大匙水一升半煎取一
升去滓乘熱熏之候通手淋洗避風蓋覆

治腸痔方

胡粉 水銀 各壹分

右二味同研勻以棗肉和得所綿裏內下部中

治久積虛冷腸風痔瘻面色萎黃日漸羸瘦虛劣等疾

白朮丸方

白朮

厚朴

去麤皮生薑汁炙各參兩

陳橘皮

湯浸去白焙

乾薑

炮

黃耆

剉各壹兩半

人參

甘草

炙

當歸

切焙各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心米飲

下十五丸至二十九

治腸風痔疾及風秘疼痛等積年不差黃耆地黄丸方

黃耆

剉

生乾地黄

焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙各壹兩

乾薑

炮

當歸

焙各壹兩

大黃

壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心米飲下

治腸痔下血如注水久不差方

右用市河水每遇更衣罷便冷沃之久沃為佳久患

者皆差無河水井水亦得

氣痔

論曰氣痔者因便下血或肛頭腫凸良久乃收風也此

由邪毒氣蘊積腸間及患怒不節酒食過傷令下部氣

澀壅結而成

治腸風下血及脫肛等疾久不差者梧樓丸方

梧樓大者貳枚

蝟皮

大者貳枚以上貳味盛於瓶內燒令存性

白礬

綠礬

貳味各於火上枯盡汁研細

訶梨勒皮炮

枳殼去瓤炒

白附子

半夏

湯洗去滑生薑同杵爛捏作餅暴乾

附子

炮裂去皮臍各壹兩

雞冠花伍兩

胡桃

去皮大者壹拾伍枚瓶內燒存性

天南星炮壹兩

右一十二味搗羅為末以米醋煮麩糊和丸梧桐子

大每服二十九米飲下日三

治氣痔大便秘澁下血脫肛烏蛇黃耆丸方

烏蛇

酒浸炙取肉伍兩

黃耆壹兩半

大黃剉炒

大麻子人貳兩各炒

獨活去蘆頭

枳殼去瓤炒

人參

地骨皮各壹兩

訶梨勒皮壹分

檳榔剉壹兩半

羚羊角鑄參兩

郁李人去皮參分

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸小豆大空心溫酒

下二十九以利為度未快利即加丸數

治氣痔下部腫痛生瘡脫肛不收蝟皮丸方

蝟皮燒灰參兩

續斷

槐實微炒

黃耆切焙

白礬熬令汁盡

連翹各參分

生乾地黃焙

當歸切焙各壹兩半

乾薑炮

附子炮裂去皮臍各半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十丸陳米飲下日三五服

治大腸熱結成氣痔黃耆散方

黃耆剉二兩 苦參各參兩 玄參各參兩

附子炮裂去皮臍壹兩半 大黃剉炒壹兩半 乾薑炮壹兩

蝟皮燒焦 黃連去須各貳兩 槐子炒參合

豬蹄壹具燒焦

右一十味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下日晚再服

治腸風五痔下鮮血多秘結疼痛成氣痔者槐豆散方

槐豆炒貳兩 皂莢子人參分炒 枳殼去瓤炒

防風去叉 桑耳各壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕煎樗根湯調下日三

治氣痔大便澁威靈仙丸方

威靈仙去土 乳香研 枳殼去瓤炒各壹兩

右三味搗羅為末以粟米飯和丸梧桐子大每服十

五丸米飲下日三

治因氣成痔瘻卷柏散方

卷柏 枳殼去瓤炒 豬牙皂莢各壹兩

右三味入一小藏瓶內以鹽泥固濟慢火燒透去火
和瓶於濕地上用黃土罨一復時取出藥入麝香一
錢同研極細每服二錢匕溫酒調下不拘時候

治氣痔蝟皮散方

蝟皮壹枚燒焦

桂去麤皮壹兩

磁石火燒醋淬拾偏肆兩

右三味搗羅為散空心米飲調下二錢匕日晚再服

治氣痔下血肛邊疼痛聖功丸方

雞冠花焙

臭椿皮炙剉各貳兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九

黃耆湯下不拘時

治氣痔下濃血白礬丸方

白礬熬令枯

附子炮裂去皮臍各壹兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大空心溫酒下

十九日晚再服

治氣痔脫肛不收或生鼠乳時復血出久不差者必効

丸方

枳殼去瓤炒

黃耆剉各壹兩

右二味搗羅為末以陳米飯和丸梧桐子大空心食

前米飲下三十九

治氣痔脫肛熏熨方

枳殼去瓤 麩炒

防風去叉 各壹兩

白礬熬令汁枯 壹分 研

右三味除白礬外搗為麩末入白礬拌勻水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗治氣痔脫肛良久乃收摻藥方

海螵蛸研

染燕脂研各半兩

右二味各為末仍同研勻先以溫湯洗略拭乾摻藥少許

治大腸風壅積滯不通變成氣痔疼痛黃耆湯方

黃耆剉半兩

當歸切焙

大黃剉焙

檳榔煨剉各壹兩

枳實炒

防已

木香

黃芩去黑心 各參分

右八味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

