


卅溪心法

十六上

內閣文庫			
漢	三	〇	一
書	二	〇	一
類	號	冊	架

內閣文庫			
番號	漢	12252	
冊數	10 ( 7 )		
函號	301	13	





醫學館  
寮書籍

丹溪心法附餘卷十六


火鬱門

庚集

脇痛七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛 木氣實 有死血 有痰流注 肝急木氣  
 實用蒼朮川芎青皮當歸之類 痛甚者肝火盛以當歸龍會  
 丸薑汁下是瀉火之要藥 死血用桃仁紅花川芎 痰流注  
 以二陳湯加南星蒼朮川芎 肝苦急七食辛以散之用撫芎  
 川芎蒼朮血病入血藥中行血 治咳嗽脇痛以二陳湯加南  
 星香附青皮青黛入姜汁 脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不  
 去尖并香附之類 有火盛者當代肝木 左 七 火  
 有氣鬱而胃脇痛者看其脉沉澁當作鬱治





者蜜丸龍會丸最快 脇下有食積一條扛起用吳茱萸炒黃連 控涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加挑仁泥丸服 右脇痛用推氣散出嚴氏方 左脇痛用前藥為君加柴胡或小柴胡湯亦可治

入方

小龍會丸

當歸

草龍膽酒洗山梔炒

黃連炒

川芎各半兩大黃煨半兩蘆會三錢

木香一錢

一方有黃芩柴胡各半兩無大黃木香

一方有甘草柴胡青皮無當歸梔子

右為末入麝香少許粥糊丸如菘豆大每服五十九丸姜湯下

仍以琥珀膏貼痛處 龍會丸亦治有積因飲食大飽勞力

行房脇痛

當歸龍會丸

口內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却以

生姜汁吞此丸 痛甚者須炒令執服

草龍膽

當歸

大梔子

黃連

黃芩各一兩大黃

蘆會半兩

木香一錢半

黃栢一兩 麝香半錢

右十味為末麪糊丸 一方加柴胡川芎各半兩 又方加

青黛半兩 蜜丸治脇痛 麪丸降肝火

抑青丸 瀉肝火

黃連半斤

右為末蒸餅糊丸服

附諸方



推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

枳殼 桂心 片子姜黃各半兩一本作疆蚕

甘草炙一兩半

右為末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

枳芎散 治左脇痛刺不可忍者

枳實炒 川芎各半兩粉草炙一兩半

右為末每服二錢姜棗湯下酒亦可

鹽煎散和劑方治男婦各一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已及

脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁去殼甘草炙 茯苓去皮 草果仁去皮煨

肉豆蔻 川芎洗 茴香炒 萹澄茄

大麥芽 檳榔 良姜 枳殼

蒼朮 陳皮去白 羌活 厚朴

右咬咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分去渣空心溫服

沉香升氣丸御藥院方治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香 檀榔各二錢半人參 訶子煨去核

大腹皮炒各半兩 白朮 紫蘇葉

香附子炒 神麩炒 麥蘖 烏藥各一兩

陳皮去白 甘草炒 姜黃各四兩京三稜煨

蓬莪木煨 益智炒去殼厚朴去皮姜製各二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去渣溫服

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇寒痛氣

促喘急 見喘類

調中順氣丸按粹方治三焦滯水飲停積脇下壅滿或時刺

丹藥法

卷之五

三



痛者

木香

白豆蔻仁

青皮去白

陳皮去白

三稜炮各一兩

大腹子 半夏湯泡七次各二兩

縮砂仁

檳榔

沉香各半兩

送下

右為末水糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳皮湯

復元通氣散和劑方治氣不宣通或成瘡癰并閃挫腰脇氣滯

不散 方見腰痛

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇 方見氣滯

一方 治脇下疼痛如神効

小茴香一兩炒

枳殼五錢麩炒

右為末每服二錢薑湯調下

干棗湯 治脇痛甚効病人氣實可用虛人不用

甘遂

荒花慢火炒紫色

大戟各等分

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更加一錢量虛實加減

控涎丹 見痛風

二陳湯 見痰類

左金丸 見火類

小柴胡湯 見濕熱

琥珀膏 見積聚

○或謂子曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方擅煎散沉香升氣散分氣紫蘇飲調中順氣丸俱是辛温之劑但能了氣開鬱豁痰消積而已甘於降火未之有



丹溪心法  
也病源是火而用辛温之藥治之則是以火濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡左脇痛甚者即是肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛凉之劑以治之凡右脇痛微者即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸等藥辛温之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二証婦人多有之以其憂思念怒之氣素蓄于中發則上衝被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山藥菴蓉男子之佳珍此之謂也

跌撲損傷 七十五

庚集

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白木和中童便煎妙在下者可先須補接後下瘀血 在上者宜飲蕤汁或和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

入方

治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治顛傷骨折及血出者

用滑石甘草為末人參湯調服次用生姜自然汁一盞米醋一盞獨核肥皂四箇敲破投於姜汁米醋中紗片瀝過去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者

跌撲損傷

丹溪心法

跌撲損傷

庚集



接骨散

沒藥

乳香各五錢 自然銅 一两 煨淬

滑石 一两

龍骨 三斤

赤石脂 三斤 麝香 一字 另研

右為末好醋浸沒煮多為上乾就炒燥為度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極効

○世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之効而燥散之禍甚於刀劔戒之

又方

冬瓜皮

阿膠 各等分

右炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芎藭湯三斤方治打撲傷損敗血流入胃腕嘔黑血如豆汁

當歸

白芍藥

芎藭

荆芥穗

百合水浸半日等分

右以咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散 楊氏家藏治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血

停積於內心腹脹悶

紫金藤皮 二刀 降真香

續斷

補骨脂

無名異 煨細酒淬七次

琥珀 另研

蒲黃

牛膝酒浸

當歸洗焙

桃 二 去皮尖各一万

大黃 紙裹煨 朴硝 另各一



右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即安  
復元活血湯按粹方治從高墜下惡血留於脇下交疼痛不可忍

柴胡五升

花粉

當歸各三升紅花

甘草各一升大黃酒浸二升川山甲三升炮桃仁五十個酒浸研如泥

右以咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以  
利為度

當歸導滯散聖惠方治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通浮腫  
痛昏悶畜血內壅欲死

大黃一兩

當歸二升半麝香少許

右為末每服三錢執酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒  
調下或以酒煎服亦可

雞鳴散

治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以

此藥推陳致新

大黃酒蒸一兩桃仁七粒去皮尖

當歸尾五錢

右為末酒一碗煎去渣五更雞鳴時服取下惡血即愈 若  
氣絕不能言急以熱小便灌之即甦

奪命散濟方治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積  
心腹疼痛大小便不通

大黃

黑牽牛各二兩紅蛭用石灰慢火炒令乾黃色半兩

右為末每服二錢用煎酒調下約行四五里再用熱酒調牽  
牛末二錢崔之須下惡血成塊以盡為愈

○已上諸方辛涼疎導瘀血之劑

花藥石散和劑方治一切金刃所傷打撲傷損身體出血者急  
於傷處糝藥其血自化為黃水如有內損血入臟腑熱煎重



子小便入酒少許誑一系服之立効若牛舐腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上糝藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後糝藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃上色明淨者四及鳩為粗末花藥石一及鳩為粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一箇候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠壘周圍自己午時從下着火令漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了羅極細磁盒內盛依前法服

沒藥降聖丹和劑方治打撲閃胸筋斷骨折等急疼痛不能

伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮內刺痛有背拘急身體倦怠四肢少力並皆治之

自然銅火煨醋淬十二次研為末水飛過焙 川烏頭生去皮臍

骨碎補煨去毛 白芍藥 沒藥別研 乳香別研

當歸洗焙一系生乾地黄 川芍各一系半

右並生用為細末以生姜自然汁與蜜等分煉熟和丸每一兩作四九每服一丸槌碎水酒各半盞入蘇木少許同煎至八分去蘇木熱服空心食前

治打撲內損筋骨疼痛 本事方

沒藥 乳香 芍藥 川芍

川椒去目及開口者 當歸各半兩自然銅三錢半炭火燒

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每



服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處即霎時連進有效  
乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香 沒藥 川芎 白芷

芍藥 甘草 牡丹皮 生地黄

右為細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散 御藥院方治打撲損傷痛不可忍者

白朮剉五兩當歸焙 白芷 沒藥別研

肉桂去皮 乳香別研 甘草炒各一兩

右為末入研藥并研令勻每服二錢溫酒調下不拘時服

乳香黃耆散 應驗方治打撲損傷筋骨及瘡腫焮作疼痛

乳香五錢另研沒藥五錢另研黃耆 當歸酒浸

赤芍藥 川芎 甘草 麻黃

陳皮各一兩粟殼去麩帶蜜炒一兩 人參去芦一兩

右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓溫服

接骨散和劑方治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍者

此藥能接骨續筋止痛活血

定粉二錢 當歸二錢 鵬砂二錢半

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

補損當歸散和劑方療墜馬落車傷腕折臂呼吸疼痛連進此

藥其痛即止筋骨接續

澤蘭炒 附子炮去皮臍各一兩 當歸炒

蜀椒炒出汗甘草炙 桂心各三分川芎炒六分

右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水菘菜

治打損接骨方 本事方



接骨木半兩乳香半錢赤芍藥 川當歸

川芎 自然銅各一兩煨醋淬十二次研為末水飛過焙用

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫衆手丸如龍眼大如只打傷筋骨及閃肺疼痛者用藥一丸好舊酒一盞浸化藥蒸熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

治打撲損傷骨折百入選方此藥專能接骨

夜合樹俗謂之萌葛即合歡花越人謂之烏顯樹去粗皮

妙黑色四兩芥子炒一兩

右為末酒調二錢澄清臨卧服又以粗淨菴落上扎縛之

治打擷折骨損斷經驗方服此藥自頂心尋病至下兩手遶身

遇受病處則颯颯有聲覺藥力習習往來則愈矣

乳香 沒藥 蘇木 降香

松明節 川烏去皮尖自然銅火煨醋淬七次各一兩

龍骨半兩生用地龍半兩去土油炒 水蛭油炒半兩

血蝎二錢 土狗十箇油浸焙乾為末本草名蜈蚣

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下食前服

治打撲傷損 經驗方

用胡孫薑研爛取汁以酒煎服渣傳傷處

接骨散張子和方并治惡瘡

金頭蜈蚣一箇金色自然銅半兩燒紅醋淬研為細末用

乳香錢研為細末銅錢重半兩者或二文或五文燒紅醋淬研細

金絲水蛭一錢半每箇作三截瓦上煨去氣道為度

右為細末如瘡腫熱津調半錢塗立止痛如見出膿先用粗

藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前



藥接骨散半錢再卻用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便効

如打破骨頭牙損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接定不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方累經効驗不可具述

神聖接骨丹 治打撲傷損跌折肢體

水蛭用糯米抄砂鍋內炒黃去米三歲

鬼絲手

髮灰

好綿灰

沒藥

乳香

血竭各一錢 半兩錢二文燒七次醋淬七次另研麝香一錢另研

右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下空心服約車行六七里聞骨作聲忌聽鐘鼓砧杵之聲震動忍生蘆節忌食驢肉一服見効

續肢散 治折傷筋骨

用半兩錢七箇以桑柴火燒紅好醋內淬之取錢上碎末再入珍珠末一分乳香沒藥少許同研極細好酒調服

接骨散 治跌撲閃胸骨折疼痛

黃麻燒灰二兩頭髮燒灰一兩乳香五斤

右為末每服三錢溫酒調服立効

茴香酒直指方治打隊肢體凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙炒

茴香炒

辣桂各一斤

右為末每服二錢食前熱酒調服

木香調氣散 治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

白豆蔻仁

丁香

檀香

木香各二斤

藿香

甘草炙各八分砂仁四分



右為末每服二錢加紅麴末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅麴紅酒亦好

應痛在經驗方治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼朮一斤破故紙一斤半炒半生 舶上茴香十二兩炒

骨碎補一斤去毛 穿山甲去膜去皮炒服為慶集灰蝦亦可

生草烏一斤剉如麥大

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生姜二斤搗爛將草烏一匙淹兩宿焙乾連前藥一處焙為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十九酒湯任下忌熱物

○已上諸方辛溫散痛接骨之劑

乳香消毒散御藥院方治一切傷折蹉跌焮腫疼痛不可忍者

乳香另研 沒藥另研 白欬 白芍藥各二兩

白芥子 當歸各半兩黃柏另研細末二兩

滑石二兩 黃丹三兩 加血竭半兩另研

右為細末入另研者一處再另研勻每用新水調如稠膏攤在紙花上貼患處

烏金散應驗方治打撲損傷敷藥

用小黃米粉四兩葱白細切一兩同於砂鍋炒至黑色杵為細末用好醋調成膏子攤在紙上貼於損傷病處後用杉木皮或板以紙包裹四面四片用絹袋扎縛不可動搖三日一換內服前接骨藥

一方

用葱白砂糖二味同等爛研傅之痛立止且無癢痕

治打撲傷折手足

研藥心法付錄

卷之四目夫員一六



用菘豆粉新鉄銚内炒令紫色用新汲井水調稀厚傳損處以紙將杉木片縛定立効  
走馬散經驗方治折傷接骨

栢葉生少用皂角生多用骨碎補去毛荷葉生各等分  
右為末於折傷揣定入原位以姜汁調藥加糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開看以温葱湯洗之後再貼藥復夾七日如痛甚加沒藥  
治打損傷 醫方大成

南星 白芷 半夏 白豆  
黃栢皮 赤小豆各等分

右為細末姜汁調傳患處蜜糖亦好  
及金散拔粹方專治箭傷上血定痛

定粉一兩 枯白礬二兩另研 沒藥另研  
乳香另研各一兩 風化石灰二兩

右各研為末和勻摻上

治諸般打撲傷損皮破血出痛不可忍百

右用赤石脂研末傳之效

金絲膏藥應驗方治打撲傷損閃肭疼痛風濕氣痛

當歸 川芎 蒼朮 香白芷  
赤芍藥 木鱉子 太黃 草烏頭各半兩  
香油四兩 瀝青半斤 松香半斤 乳香二錢半另研  
沒藥二錢半另研

右前八味同香油四兩熬去渣瀝青松香看熬軟硬冬軟此夏硬此乳香沒藥攤膏藥時用之



立應金絲膏 至驗方

當歸尾 香白芷 杏仁 草烏生剉用

猪牙皂角不蛀者去皮各三錢葱連鬚葉肥者半莖

白膠香三斤 瀝青明者八兩黃蠟一兩 乳香另研為末

沒藥另研為末各半兩 清油七

右將前項六味入清油內依法熬瀘去渣入白膠香瀝青溶  
化攪勻入黃蠟又攪勻待冷入沒乳末攪勻

至聖黑龍膏御藥院方治一切筋骨損傷疼痛

米粉四兩於良器內炒成塊子褐色放冷研為細末後入二味

乳香 沒藥 研細各半兩

右研極細末每用或好酒或醋調如膏攤在紙花上貼患處  
方 治跌撲損傷及金刃所傷 此藥止血散痛消腫

風化石灰重羅過半兩五月五日以雞汁和陰乾

海螵蛸半兩老松香 血竭 輕粉

乳香 沒藥 黃丹飛過 無名異去土

松白脂去皮各半兩

右為極細末濕者乾溻乾則水調蜜調傅患處

淋瀝頑劑散 治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荆葉二兩半蔓荆子 白芷 細辛去苗

防風去筍 川芎 桂心 丁皮

羌活各一兩

右為末每用一兩塩半匙葱白連根五莖將水五升煎七沸  
去渣通手淋瀝痛處冷即再換宜辟風

○已上諸方外治傳貼之劑



疥瘡七十六

附天疱瘡 楊梅瘡 凍瘡  
脚上爛瘡 頭面瘡

九

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根梢用及引經藥則可 又云諸瘡以當歸黃連為君連翹甘草黃芩為佐 諸痛痒瘡瘍屬火若稟受壯盛宜四物加大承氣湯下之 若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜四物加黃連黃芩大黃甘草在下焦者加黃柏 若肥胖之人生瘡而痛乃是濕熱宜防風羌活荆芥白芷蒼朮連翹取其氣能勝濕 ○諸瘡藥 膿裏治熱燥濕為主用無名異 乾疥開鬱為主 用吳茱萸 虫瘡如癬狀退熱殺虫為主用蕪荑黑狗脊白礬 黃硫黃水銀殺虫樟腦松香退熱 頭上多加黃連方解石

蛇床定痒殺虫松皮炭主膿 腫多者加白芷開鬱 痛多加白芷方解石 虫多加藜蘆斑蝥 痒多加枯礬 陰囊加茱萸 濕多香油調 乾痒出血多加人黃黃連猪脂調 紅色加黃丹 青色加青黛 虫多加錫灰蕪荑檳榔 在上多服通聖散在下多須用下 脚腫出血分濕熱用藥 人方 瘡有三種 膿泡瘡治熱為主

疥瘡

黃芩 黃連 大黃各三斤 蛇床 寒水石三兩黃州半斤 白礬一斤 輕粉 白芷 無名異少許炒 木香少許前者用 右為末油調傅 沙瘡



丹溪心法附錄 卷之六 醫至藥目 疔毒 十五

蘇莢二系 剪草一系 蛇床三系 白礬

吳茱萸 黃柏各一系 蒼朮 厚朴

雄黃各半兩 寒水石二系 輕粉十貼

右為末油調傳

疥瘡藥 春天發瘡疥開鬱為主 不宜孤破傳

白礬二系 吳茱萸二系 樟腦半系 輕粉十盞

寒水石二系半 蛇床三系 黃柏 大黃

硫黃各一系 檳榔一个

右為末香油調傳

又方

蕪荑 白礬枯 軟石膏 大黃

樟腦各半兩另入 管仲 蛇床各一兩

硫黃 雄黃各二系半

右為末香油調須先洗瘡去痂傳之

一上散

雄黃三系半 寒水石一兩 蛇床 白膠香

黑狗脊各一兩 黃連半兩 硫黃三系半 吳茱萸

白礬枯五系 斑猫十四个去翅足

右研黃雄黃寒水石另研如粉次入斑猫和勻蛇床狗脊等為極細末同研勻洗瘡令湯透去痂用臘猪油調手心中擦批鼻中嗅二三次却擦上一上即愈如痛甚腫滿高起加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡中有虫加雄黃如喜火燒湯洗加硫黃只臭不止亦可愈也

附諸方

丹溪心法附錄 卷之六 醫至藥目 疔毒 十五



四物湯 見補拍

大承氣湯 見傷寒

升麻牛蒡子散 治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於頭面胸膈之際

升麻 牛蒡子 甘草 桔梗

葛根 玄參 麻黃 連翹各一糸

右咬咀姜二片水二盞煎一盞服

升麻和氣飲 治瘡腫癰疥痒痛增寒發熱

甘草 陳皮各兩半芍藥七糸半大黃半兩煨

乾葛 蒼朮 桔梗 升麻各一兩

當歸 半夏 茯苓 白芷各三糸

乾姜 枳殼各半糸

右咬咀每服一兩水煎服

加味羌活飲 三因方專治四氣外搏肌膚發為癰疹增寒發熱痒

羌活 前胡各一兩人參 桔梗

茯苓 甘草各一兩 枳殼炒 川芎

天麻各半兩 蟬蛻去鬚 薄荷各三糸

右咬咀每服五錢水一盞姜三片煎七分温服

當歸飲子 治内蘊風熱發為瘡疥風癬濕毒燥痒瘡

當歸 白芍 川芎 生辛

白蒺藜 防風 荆芥各一兩 何首烏

黃芪 甘草各半兩

右咬咀每服一兩水煎或為末每服一二錢亦得

苦參丸 御藥院方治肺受熱毒遍身生瘡



用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十九空心米飲下

輕粉散

已上諸方內消之劑

寒水石一斤硫黃

朴硝各二兩松香五兩

枯礬二兩

輕粉五兩

右為細末香油調搽

硫黃散

硫黃

川椒

石膏

白礬等分

右為細末香油調搽

立効散

全蝎三十枚巴豆三十个皂角七个炒焦

右為粗末以清油四兩熬至焦黃色去渣次入大楓子蛇床

子白礬末各二兩黃蠟二兩同熬成膏以磁器收貯任意搽瘡

一方

白芷白礬各等分為細末入硫黃少許以香油調搽

治諸般疥癩瘡藥

蛇床子一片為末

大楓子取肉四兩

白礬五兩為末疼則少用換柳一兩末

右糖油半斤調搽小兒頭瘡加松香輕粉

水銀膏 此藥會稽徐彥劉傳大効

楓子取肉四兩

輕粉一兩 水銀末要茶研末不見星一兩

樟腦二兩半礬生熟二兩半

右先將楓肉研膏次入餘藥勻臘月猪脂和稀用絹布裹任



意搽

又秘方

黑狗脊

簡茹

藁本

蛇床子

硫黃

井泉石

剪草

百部

藜芦各等分

右碾為細末用香油搽手心內搽鼻聞之

一方 治疥癬諸瘡

雄黃五分

樟腦五分

大楓子取肉

斑猫去足翅各十双

狗脊

蛇床子

寒水石

硫黃各五分

右為極細末疥瘡用相油調搽癬瘡用栢油調搽

治疥瘡

天楓子

杏仁各十粒

不同羊脂搗勻以裹火烘油出搽之  
胡粉散濟生方治一切瘡癬癢痒甚者

胡粉一分

砒霜半分

大草烏一个生用

碯稍七枚

雄黃

硫黃各另研一分

斑猫一枚

麝香少許

右為末先用羊蹄菜根蘸醋搽動次用少許藥搽患處  
如意散宣明方治疥癬无時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸

牛李子

荆芥穗各二分半

輕粉半斤

信砒二分

牡蠣五分

右為細末研勻每臨時卧炒一糸油調遍身搽摩上一半如  
後痒不止更少旋塗之股髀之間聞香悉愈

又治疥瘡方



蜜陀僧 蛇床子 硫黃 枯礬

胡椒

右為末香油調傳

○已上諸方外散之劑

冊溪心法

○天庖瘡

用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒蜜調傳極妙

從肚皮上起者是裏熱發於外也

還服通聖散 見斑疹類

○楊梅瘡 新增

附諸方

治楊梅瘡方

硃砂二黍 雄黃一黍半 苦參

二麻 麻黃 牛蒡子 面粉

槐角子各三黍

右為細末用糖心雞彈為丸梧子大每服二十九丸用雞湯或

羊肉湯送下一日一服表出毒氣再不服忌一月房室神効

又方

土茯苓四刀牙皂 地骨皮 五加皮

白鮮皮各一刃

右作二十服用灯草車前子為引子煎服

又方

冷飯團一名土茯苓一斤 五加皮 白鮮皮

防風 白芍藥 木瓜各一刃半 皂角子

白丑冬三十粒 生地黃酒洗地骨皮 牛膝去芦

黃連去鬚 槐花 川芎 尋風藤

冊溪心法付餘

天至河目集卷一第

三



威靈仙

白茯苓

杜仲炒斷絲 白芷

當歸酒浸洗各一升

甘草炙半升 荆芥穗一升半

右吹咀二十服每服水一鍾半酒半鍾共前至一鍾飯後溫服服動此藥可用後又開薰楊梅瘡藥並治

又方

當歸

連翹

羌活

荆芥穗

薄荷葉

枳殼

黃柏

茯苓

車前子

防風

木通

芍藥

川芎頭上用山梔

桔梗

天花粉

姜蚕

白芷

甘草

金銀花

獨活各一升

柴胡

前胡各半升

右吹咀作二十服每服用水二鍾前至八分溫服上多食後

服下多食前服服此仍用薰藥並治

薰楊梅瘡方

雄黃

沉香各三分

沒藥

硃砂各五分 血竭二分

黑鉛

水銀各一分

右為末均作紙撚七條用香油點燈放床上令病人兩腿抱住上用單被通身蓋之口嚙冷水頻換之則不損口頭一日用三條後每日用一條薰之有效

又方

水銀

板硃

黑鉛各二分

白花蛇一分

共研為末作紙撚七條頭一日用三條後每日用一條用香油點燈放兩眼單被連頭蓋了口嚙冷水頻換

治楊梅瘡後腫咒方

冊卷之三

卷之三

三



冷飯團十五丸

木通

薏苡仁

防己

茯苓

金銀花

木瓜

白鮮皮

皂角刺各五錢 白芥子四錢 當歸身七錢

右作三十服 每服用水鍾半煎至八分空心午飯前晚飯前各一服忌魚雞生冷房事及煎炒茶酒十餘日立効虛弱人加人參五錢其妙不可盡述

一方 專治年久楊梅頑瘡

水花味 干 枯礬

朱砂各一分二分

三味共研細末用全蝎酒煎膏為丸作六九分作三日服用羊肉鮮魚等湯送下九日全好

一方 治楊梅癰

柏油

全蝎三箇

蜈蚣一條

鉛粉一升

右先將香油二兩煎全蝎蜈蚣待焦去渣次入柏油鉛粉柳條攪勻捏成餅子照瘡大小攤貼三日一換九次全好

一方 治楊梅疔漏瘡

用大鱉甲一箇去肉湯洗淨加刺蝟皮一箇象牙末三錢共為細末棗肉為丸如櫻桃大每服一丸空心童子小便送下服七日後仍用三味末猪膽汁調傳

丹溪心法

○凍瘡 用煎熟桐油調蜜陀僧末傳

丹溪心法

○脚上爛瘡久不愈 先以豆腐漿水洗二三次懸鈎祖兼地暴祖兼搗細入盞些小盞之

附諸方



治凍瘡 百一選方

用胎子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

治手足皸裂 百一選方

用瀝青二斤黃蠟一斤共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮 杖乾將藥於慢火上畧炙擦傳

治手足皸裂春夏不愈者 潘察方

生姜汁

紅糟

鹽

猪膏臘月者佳

右研爛炒熟擦入靴內一時雖痛少頃使皮軟靴合再擦即安

治脚跟皸

用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯泡洗皸裂令軟試乾傳其上即安 一方加米粉

又方 醫方大成

用五倍子為末同牛骨髓填縫內即安

治手足裂 張子和方

用白芨不拘多少為末水調塗裂處

治脚指縫爛瘡

搗鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒灰存性為末濕則糝之

治脚指縫爛瘡及因暑手抓兩脚爛瘡

用細茶口嚼碎爛塗之解熱燥濕其瘡立愈

神應散 治脚指丫濕爛

枯礬六錢

黃丹五分

石為細末乾糝患處經夕立瘥

○頭面瘡 新增

丹溪心法附餘 醫方大成



附諸方

摩風膏聖惠方摩風止痒消腫定疼頭面唇鼻諸瘡及肌肉裂痛者悉治之

沉香

白附子

木香

獨活

白欵

白芨

天麻各一錢半當歸去芦

白芷

檀香

零陵香

藿香

杏仁去皮

桃仁去皮各三錢

茅香

甘草

防風

白芍藥各一錢半

川芎

木通各一錢黃芪一兩二錢龍腦研四錢

半夏十二兩半清油二斤二兩

黃蠟冬月用九兩

大蓂蔓連稜一箇剉乾

各剉用油浸七日於石器內慢火煎候白正微黃色以白綿

濾去滓放淨罐內密封澄一宿再濾過於上等磁碗中候火再輕溫動次下黃蠟攪勻放溫次下研細龍腦粉面於磁盆內盛定每用少許摩患處

治頭面生瘡燥痒黃水出

蜜陀憎

硫黃各二錢輕粉少許

右為末酥油調搽

一方 治白禿瘡

用金頭蜈蚣一條皂角不蛀一箇擘開去皮弦以蜈蚣納入夾定以麻絮緊沉於薰缸底七日取出焙乾碾為細末先以溫湯將瘡浸洗溫潤然後敷之如乾以清油調搽數次除根

一方 用熟皮烟膠一兩輕粉一錢研勻調搽又法用枯白礬同烟



膠調搽亦佳  
禿瘡藥

輕粉五錢 黃蠟二兩

右用鵝油一二兩調搽

治小兒白禿瘡 聖惠方

用淡豆豉一合炒令煙出色焦為末用飯飲調羶塵一團於

炭火內煨令灰燼並細研入輕粉少許油調剃頭了搽之

一方治頭瘡無屋塵 一方有麝香無輕粉

治面上耳邊浸淫瘡聖惠方有黃水出久不愈名香辨瘡

殺羊鬚 荆芥 乾棗去核各二錢

右燒存性入膩粉半錢同研末先用溫水洗香油調塗

治熱汗浸漬頭面及遍身成瘡種痒癩痛

定粉一兩 蛤粉九兩半 石膏 白石脂各半兩

滑石八兩半 粟米粉 寒水石燒出火毒各二兩

白龍骨半兩

右為末研令極細每用少許乾擦患處

癰疽七十七 附腸癰 乳癰 庚集

丹溪心法

○癰疽只是熱勝血 六陽經六陰經有多氣少血者有少氣  
多血者有多氣多血者不可一既論也若夫要害處近虛怯薄  
處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟少陽厥陰經生癰  
疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久未合必成死証速  
用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵 陽滯於陰脉浮洪  
弦數陰滯於陽脉沉細弱瀆陽滯以寒治之陰滯以熱治之

# 癰疽



人中年以後不可生癰緣有不胞參之脉症但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋宮驅熱拔毒紓氣之藥虛虛之過如指諸掌 內托之法河間治腫焮于外根盤不深形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托以救其裏宜復煎散除濕散鬱使胃氣和而平如或未已再煎半料飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱行和氣不能內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於此小瘡與冬月時令即可若潰瘍於夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗一婦年七十形實性急而好酒腦生疽緣五日脉緊急且齋急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌人參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已失此內托之意

又一男子年五十形實色黑背生紅腫及胛骨下痛其脉浮數而洪緊食亦不下冬月與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附瓜蒌子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生姜六貼而消此正內托之法 精要內托散乳香菴豆等藥相此方專為服丹石而發者設不因丹石而發恐非必用之劑 瘡先發為腫以致鬱積蒸肉為膿故其痛多此瘡之始作時也膿潰之後腫退肌實痛必漸減而反痛者此為虛宜補亦有穢氣所滯宜和解風寒退者宜溫散

入方

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破其熱血初腿腫以人參黃連茯苓各二錢瓜蒌子四十八粒分二貼入竹



歷熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼木佐黃栢之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條子苓  
體虛者加牛膝以生甘草為使大料煎入姜汁帶辣食前飲  
之病深者恐木栢桂枝十數貼死不動加少麻黃二三貼又  
不和慈麻將成矣急掘地坑以火煨紅沃以小便赤体坐其  
上以被席圍抱下截使熱氣薰蒸腠理開氣血暢而愈

跌悶散 治癰疽腫毒

乳香

沒藥 半兩

大黃

黃栢

黃連

南星

半夏

防風

皂角刺

木鱉子

瓜蒌

甘草節

草烏

阿膠

右為末醋調成膏砂石器內火熬薰色搗翎傳之

圍藥 諸般癰疽傳上消散

乳香

沒藥

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃栢

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌

阿膠

皂角刺

右妍細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

圍藥 鐵井欄

貝母

南星 各七錢 連翹

五倍子

經霜芙蓉葉 各一兩

右為細末用水調傳四圍腫處止留中間一竅出毒母氣

隔皮取膿法

丹溪心法附餘

醫方類聚

卷之六



馬蹄細切兩蕎麥麩一兩白塩半兩 草烏四錢去皮  
右為末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末醋調成膏  
用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫自退  
騎馬雞

大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙水盡為末入  
皂角炭少許作四服湯調頻服効

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用  
敷疽節方

草烏

黃連

紫金皮

白芷

大黃

芙蓉皮

朴硝

煨米各等分

右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雜黃末圍定大木前

取朽骨 久疽及痔漏者有之

取烏骨雞胫骨以上等雜黃尖之塩泥固濟火煨通紅取  
出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙撚送入  
孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸半斤

瓜蒌仁二錢代赭石一未

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌仁

桃仁

草烏膽

右咬咀濃煎露呈月一宿清早温服立愈

入方



白殭蚕槐花為末酒調服 一方加酒大黃

附諸賢論

劉河間宣明論曰人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所乘脾氣濕而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣客於經絡使血凝而不通纏結成腫風邪內作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根結纏成腫則為膿赤核腫則風氣流滑也瘡以痛痒痛則為實痒則為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也痒者表疾故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也火之以火清之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越燥熱內作故也瘡痒皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癰疹也瘡氣赤瘡丹燥熱勝氣火之色也

附脈理

脈訣舉要曰癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脈數發熱而疼者陽不數不熱不疼陰瘡發癰之脈弦洪相搏細沉而直肺肝俱數

附諸方

疔生丸 濟生方專治癰疽發背附骨疽諸般惡腫將發時先覺口中煩渴四肢沉重遍身壯熱乃其候也此藥功效不可具述

蟾酥 一系金頭蜈蚣 七條全者酥炙黃色 輕粉



雄黃 滴乳香 沒藥 烏金石即石灰各一系

狗寶癰狗腹中得之一系又云二兩狗膽一箇乾者用之去皮黑

狗臘月者佳鯉魚膽一箇乾者用之臘月者佳粉霜

昔蠟各三系 硃砂半兩麝香一分孩兒乳一合頭首者

鉛白霜一系一本無此

右先將乳汁黃蠟放在罐內文武火化開次將各藥末和成  
劑用時大人九棗直大小兒九如芥子大每服三九病重者  
加至五九用白丁香七箇研爛新汲水調送下腰已下食前  
服腰已上食後服如人行五里用熱葱白粥投之即以衣被  
蓋定汗出為度已後只喫白粥常服十宣散留頭其四邊以

烏龍膏貼

烏龍膏濟生方治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子去殼半夏各一兩水粉四兩 草烏半兩

右於鉢內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調傅瘡

四邊留頭出毒氣

追毒丹濟生方治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服狗寶丸次貼

烏龍膏收腫解毒去赤暈歛後用針刀開瘡納追毒丹覆以

乳香膏使之潰去敗肉排膿然後用生肌藥

白丁香一系 雄黃二系 巴豆七粒去殼皮心不去油皮如泥

黃丹二系 輕粉一系

右研和加白麪三系滴水為丸如麥狀針破瘡納之上覆以

乳香膏追出膿血毒物痛瘡四壁死肌不去不可治者亦以

此法追毒去死肌生新肉疾小者一粒大者加用之

乳香膏濟生方追膿血消惡毒



木鼈子去殼細剉 當歸尾各二兩

柳桂七八寸剉之

此已上用清油四兩慢火煎令黑色次用

白膠香明淨者四兩共研細入油煎化以綿濾之乳香

沒藥各半兩

右再治淨鉄銚又傾前藥油蠟在內候温入黃丹一两半以  
兩柳枝撓極勻再上火煎不住手撓候油沸起手下直待注  
在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出  
火毒搜成劑收之遇用以絹帛攤貼

椒花散宣明方一切瘡生肌藥

白芨

白斂

黃栢

黃連

乳香另研

麝香另研

黃丹各半分

右為極細末糝在瘡上二三日生肌平滿

已上諸方治癰疽次第之劑

如无狗宝丸以洲

然真人奪命丹代之

內疎黃連湯

治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便燥結脉洪實者

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草各一两連翹二兩

大黃二兩半

右吹咀每服一两入姜煎

祕方奪命散

治一切癰疽無名惡瘡皆可治之其效不可盡述

當歸尾

乳香各一錢川山甲用蛤粉炒黃色去粉六錢

皂角針燒

陳皮

金銀花各三錢貝母一錢

赤芍藥

甘草節各六錢

沒藥二錢

花粉八錢

防風

白芷各五錢



右吹咀每服一兩用無灰酒一大碗煎至半碗紙糊口勿令走氣病在上食後病在下食前服  
當歸消毒散應効方治癰腫初發

荆芥

牛旁子

甘草

防風

當歸

赤芍藥各一錢半

右用水二盞煎至八分去滓溫服食後

神仙活命飲 治癰疽發背發腦發髀發脇癰毒疔腫肚癰腿癰附骨癰疽惡瘡惡漏瘡血塊氣塊面目手足浮腫隨病加減並皆治之

金銀花一兩五錢

皂角針一兩貝母去心

天花粉各四錢當歸尾

滴乳香

大黃各五錢

沒藥

木鱉子去殼甘草

穿山甲用蛤粉炒

黃去米淨

赤芍藥各三錢防風去芦

香白芷各二錢半

橘皮去自一歲半

右每服五錢水煎服若老人及體虛者加生黃芪平兩若瘰癧閉澁者服九寶飲量病上下服之

九寶飲

當歸

白芷

甘草

瓜蒌

黃芩

生地黃

赤芍藥

熟地黃

川芎各等分

右每服五錢水酒共一鍾半煎病上食後服病下食前服  
九珍散簡易方治一切癰疽瘡癤腫毒因氣壅血熱而生者

赤芍藥

白芷

當歸

川芎

大黃

甘草

生乾地黃

瓜蒌



北黃參各等分

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱服兼治乳癰及  
丁瘡

赤芍藥散 治一切惡瘡癰疽腫初覺不消增寒疼痛

金銀花

赤芍藥各半兩大黃七錢半當歸

枳實

甘草各三錢大瓜蒌一箇

右每服五錢水酒各一鍾煎至一鍾不拘時溫服

玄參散 治癰疽腫痛不進飲食

玄參一兩

升麻

射干

大黃各五錢

甘草二錢半

右每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時溫服

懸壘散張子和方治發背惡瘡

懸壘一箇

大黃

金銀花

皂角刺各一兩

當歸半兩

右剉碎每服五錢酒一碗煎七分去滓溫服如有頭者服黍

粘子

消毒湯德生堂方一名紫花地丁散治惡瘡膿未成已成者腫

太等証

紫花地丁

金銀花

當歸

赤芍藥

黃耆各半兩甘草一錢

加升麻

右剉為末作二服每服酒一碗銀石器煎五分服

當歸連翹散通玄論治一切風熱癰腫瘡疽咽膈不利舌腫喉

閉鼻衄出血咳嗽痰實腸胃燥澁大小便結滯消癰腫解風

毒活血脉保真元宜通遍身結滯

丹溪心法附餘

卷之六

十一



連翹 當歸 大黃 梔子  
芍藥 金銀花

右各等分水盞生薑三片煎至一盞去滓熱服甚者加大黃  
一方治發背惡瘡

瓜蒞一箇 金銀花 皂角刺各二兩沒藥一錢  
甘草節 當歸各半兩

右每服五錢以酒一碗煎溫服加鼠粘子更佳  
治七十二等無頭惡瘡

荆芥 梔子各二錢半茯苓 白朮  
人參各三錢川芎 苦硝 大黃

當歸 芍藥 升麻 薄荷  
蒼朮 連翹 石膏 桔梗

滑石 黃芩各半兩 黃芪 甘草各二錢

右吹咀病重者二兩輕者五七錢葱白一根并金銀花同煎去  
渣熱服汗出為度如疼加乳香咽喉痛加竹葉灯心同煎  
藤黃飲子秘方治一切丁腫惡瘡癰疽疼痛

大黃四兩 甘草 枳殼 牡蛎生用各一兩  
人參 川芎 梔子 赤芍藥

金銀花各半兩 木香 白芷各六錢 當歸七兩

右以咀每服八錢水二盞煎至一盞溫服  
加減藤黃飲子應驗方治一切癰疽瘡腫

金銀花 黃芪 防風 川芎  
羌活 大黃 赤芍藥 薄荷  
連翹 麻黃 當歸 石膏



黃芩

桔梗

白朮

白茯苓各八分

荆芥三分

甘草三分

山梔子一分二厘半

人參二分

滑石一分七厘半

芒硝二厘半

右用水二盞生姜三片煎至一盞去滓溫服食後

漏蘆湯精義治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚睛五發瘰癧初發三日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘瀉小便赤黃並宜服之惟妊娠忌服

漏蘆

白欬

黃芩去黑心 麻黃去節

枳實燒去穢 升麻

芍藥 甘草各一錢

大黃二錢 朴硝一錢

金漏蘆湯精要治證同前

漏蘆

連翹

黃芩

白欬

枳殼去穢炒 升麻

粉草炙

麻黃去根節 各一錢

大黃一錢半濕紙煨

朴硝別研 一錢

右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心執服

鮮毒丸通玄論治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬牙驚悸一切熱毒並宜治之方見火類

○已上諸方辛涼內疎之劑

內托復煎散機要癰疽托裏健胃

地骨皮

黃芩

茯苓

白芍

人參

黃芪

白朮

桂

甘草

防已

當歸各一兩 防風三兩

右吹咀先以蒼朮一升水五升煎至三升去朮入前十二味

用藥法付餘

各首不列目錄

十一



再煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之又煎蒼朮渣為湯去渣依前又煎十二味渣分飲之

神效奪命丹祕方治一切發背疔瘡及破傷風陰証傷寒

枯礬一錢 蝸牛二十个焙乾 血竭二錢

銅綠一錢 蟾酥一錢 輕粉二錢 硃砂三錢為衣

右用小兒母乳汁和丸如梧桐子大硃砂為衣遇此病令患人自嚼生葱一二根爛吐出來藥一丸在內吞下前藥恐藥未嚥逆之狀却以熱酒二三盞送如重車行十里路遍身汗出天氣斟酌衣被蓋易汗出毒氣腫自消如病人昏沉人代嚼葱白如前服

淵然真人奪命丹 專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡証藥中至寶病危者服之亦可矣萬無一失不可輕易

蟾酥二錢乾者老酒化 血竭一錢 乳香

沒藥 銅綠 硃砂為衣各一錢 輕粉半錢

膽礬 寒水石各一錢 雄黃三錢 麝香半錢

腦子半錢無亦可 蝸牛二十一个連殼用

蜈蚣一條酒浸炙黃去頭足

右為細末將蝸牛研作泥和前藥為丸如菉豆大若丸不就以好酒煮麵糊為丸每服只二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣被蓋覆約人行五里之久再用熱酒數盞以助藥力發熱大汗出為度如汗不 重者再服



九汗出即効初發者二九即消三五日病重者再進二九如  
疔瘡走黃過心者雖治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗  
爛裹藥仍以熱酒吞下瘡在上食後服瘡在下食前服後忌  
冷水黃瓜茄子油麪猪羊雜肉魚一切發風瘡毒等物及婦  
人洗換狐臭犯之難治

蟬酥丸李俞甫方治一切諸惡瘡已發未發服之微汗即愈

雄黃

乳香各一錢蟬酥一厘

右二味用黃酒熟麪糊為丸如菘豆大每服三九葱汁湯  
不退再一服

止痛當歸散精義治腦疽發背穿潰疼痛

當歸

黃耆

人參

官桂

芍藥

甘草炙

生地黃各二錢半

右用水一盞半煎至一盞去滓溫服日進三服

內托散 治一切惡瘡不可忍神効

甘草半兩

御米殼半兩去頂蒂蜜炙乳香

沒藥各二錢

右為細末用雌雄黑豆十粒生姜半兩棗五枚水一大盞  
同煎五七沸隨病上下食前後服

乳香散本方治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人  
嘔吐

菘豆四兩

乳香研者一兩

右同研極細為末每服三錢新汲水濃調食後服

乳香護心散

治癰疽發背疔瘡預防毒氣攻心

菘豆

四兩乳香一兩

硃砂一錢



右為細末每服二錢濃煎甘草湯調下  
一方治癰疽無頭者

用罌粟花子一粒新汲水吞下須臾即破如要多破服三四  
粒有驗

透膿散 瑞竹堂方治諸癰疽及貼骨癰不破者不用針刀一服  
不後時而自透累有經驗

蛾口瘡用出丁蛾兒疔兒

右將爾覓一箇燒灰用酒調服即透切不可兩箇三箇爾覓  
燒服若服一箇只一箇瘡口服兩箇三箇即兩箇三箇瘡口  
切莫輕忽

葉黃良湯精義治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者  
次竹葉二分半生地黃一兩黃芪

黃芪去毛同

當歸

川芎

甘草

芍藥

人參

麥門冬去心半夏湯洗

石膏各四分

右用水一盞半竹葉五片生姜五片煎至二盞溫服

內托千金散瑞竹治腦背癰疽乳便等惡瘡

人參

當歸

黃芪

芍藥

川芎

甘草

瓜蒌

白芷

官桂

桔梗

金銀花

防風各七分半

右用水二盞煎至七分入酒半盞去滓溫服如痛甚者倍加  
當歸芍藥或乳香二錢日進三服一服之後瘡口內有黑血  
出者或遍身汗出皆藥之功效如病勢猛惡須枰藥一兩水  
一大碗煎服未成膿者自散已成膿者不用針破自透此藥  
累經功效



丹心法不倫  
黃芪茯苓湯精義治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪 白茯苓 官桂去皮 麥門冬

五味子 川芎各一錢半

右用水一盞半姜三片棗子三枚煎至一盞去滓溫服食前

日三服

內補十宣散精要治一切癰疽瘡毒未成者自消之已成者速

潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不用針刀服藥疼痛頓減

其效如神

黃芪 鹽湯潤焙 人參 當歸各四錢厚朴

桔梗 桂心 川芎 防風

甘草 白芷各上錢

右為細末每服五錢熱酒調服不飲酒木香湯調下

內托散

綿黃芪 甘草 金銀花 牡蠣中卒云各三錢半

右為末作一服水一盞煎至七分入酒一盞再煎七分隨瘡

上下食前後服

參蘇內托散李俞甫方

川芎 當歸 薄荷 甘草各一錢

紫蘇二錢 苦參三錢

右吹咀用水二鍾棗二枚煎七分服不拘時

神効托裏散和劑方治癰疽發背腸癰疔癰疔名腫毒炊作疼

痛增寒壯熱若傷寒不問老幼虛人並皆治之

忍冬草 五兩去梗 黃芪五兩去芦 當歸八兩三錢

甘草炙一兩

十藥法不倫  
卷之四十一  
廿九



右為細末每服五錢酒一盞半煎至一盞病上食後病下食  
前少頃再進留滓外傳未成內消已成即潰也

○已上諸方辛溫內托之劑

一方 治癰疽發背初起

用獨蒜一片厚二指置患處以熟艾灸二七壯如無獨蒜大  
蒜亦可

南星膏濟生方治皮肌頭面上生瘡痛大者如拳小者如蓮或  
軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸

天南星大者一枚細研調粘滴好醋五七滴利膏如抵生  
者則以乾者為末醋調如膏先將小針刺腫處令氣透却  
以膏攤紙上象瘤大小貼之覺痒則頻貼取效

消腫毒方簡易方專用塗諸瘡疽

川芎

蚌粉

草烏

海金沙

赤小豆

天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

蜀葵膏直指方治癰疽腫毒

以黃蜀葵花用鹽搽服入磁器密封經年不壞每用患處  
傳之如無花根葉皆可

治癰皆未潰已潰最有神效 醫方大成

厚朴二斤姜汁製

陳皮二斤去白蒼朮五斤米泔浸

甘草二斤

右入桑黃薇五錢同為末瘡已潰則乾搽之未潰則油調塗之

拔毒散 消腫定痛

蒲黃

白芷

半夏

黃丹各一兩



赤小豆 半升為末

右將半夏白芷為末入蒲黃黃丹豆末和勻金銀藤搗自然汁調傅四圍頻頻水潤腫退

拔毒膏李愈甫方治腫毒諸惡瘡神效

南皂角

五倍子各五升乳香

沒藥

雄黃各二升

右五味各生用為細末用好醋熬貼瘡上留頂

乳香散 止痛消腫

乳香 沒藥

粉霜

輕粉各一升

黃米粉四兩赤皮茨三

蝸牛十四箇三味一處破鍋內 黑

右為末津調紅絹留孔貼周圍

敷腫毒未破者

用蝦蟇一箇先炒石灰後用剝開炒研泥用絹攤上貼患處自破

拔毒散 治癰腫丹毒肉色變異或著四肢或在胸背遊走不

定焮熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏一兩半寒水石三兩半甘草

黃蘗各半兩

右為細末水調時復以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調妙

水澄膏 治熱毒腫痛大効

黃連

黃柏

白芨

白欵各四升

雄黃一錢

乳香

沒藥各五分

右為細末水調雞翎掃在瘡腫處

治一切惡腫及發背高起未破膏藥方

草麻子一百粒

男髮一塊



右以熬膏入黃丹成膏貼之只一箇便消加黃蠟鐵箍散 治諸般發背瘡癰腫毒杖瘡

用芙蓉花及葉曬乾為細末以好醋調敷貼患處如杖瘡赤腫用雞彈清調貼冷水亦可加阜角少許尤妙

一方 治癰疽發背及惡腫毒

飯姜石一斤出淮安清河驛 野西瓜藤 茨菇箭各四兩

右為細末用雞清調敷患處如乾及井花水勤掃妙

一方

用五葉藤即五爪龍搗爛敷患處立瘥

一方 治癰疽未潰

用瓜蔓根赤小豆等分為末以醋調敷之

方 治發背癰疽下瘡腫毒吸出膿血惡水此其佳

用苦竹筒三五七筒長一寸一頭留節薄削去青皮大小用之以蒼朮白欵烏柏皮厚朴艾葉茶芽白芩白蒺藜等分為粗末將竹筒并前藥水者半枚沸藥乾為度乘竹筒熱以手按上緊及於瘡口上候膿血水滿自然脫落不然用手拔脫易換竹筒如此三五次其毒盡消即敷生肌藥肉滿後用膏藥即愈

一方

用蜂蜜同葱研為膏先將瘡口撥動或見血或不見血將藥塗在瘡口中留一孔以帛縛定如人行約五里其瘡覺疼更待多時其子自出然後敷生肌藥忌一切毒物

一方 治癰疽腫毒

用蒼耳根及葉燒灰存性同乾靛以醋和勻塗上



過十餘次拔出其根

一方

用景夫草一名慎火草不拘多少搗爛取汁塗之

水澄膏 治熱腫毒疼痛

大黃

黃柏

鬱金

白芨

天南星

朴硝

黃蜀葵花 晒乾各一兩

右為細末每服二錢以新水一鍾半攪勻候藥澄底去面上浮水取藥攤紙上貼於腫處如覺燥津唾潤之若皮膚白色者勿用 一方只用白芨末半錢水碗內沉下澄去水脚於皮紙上攤貼瘡上亦名水澄膏

圍藥 治諸般腫毒傳上消散

用黃柏白芨草烏南星白芷天花粉石膏鬱金甘草貝母大

苗木賊鱉子皂角刺各藥分為細末用雞清調傅如效加石灰一

尤妙

針頭散 治瘡疽骨腫如木硬者

蟾酥

麝香各一錢

右同研極細以人乳汁調和如泥入篋合內成乾不妨每用少許以唾津調敷於腫處更以膏藥貼之主毒氣自出不能為瘡難成瘡亦輕

針頭散通玄詒治惡瘡追毒去死肉

人言一錢

確黃半斤

乳香一錢

麝香小許

右為細末每用少許以唾塗瘡上用膏藥貼之

桃花散通玄散治一切惡瘡去死血生肌肉去風活血

龍骨

虎骨各二錢白芨

白欬



烏魚膏

赤石脂

白石脂各一各黃丹少許

寒水石用炭火燒赤放冷一兩六分

右為細末量大小貼之立効

生肌散 治癰疽瘡毒斂口生肉

赤石脂

海鱗鱗

龍骨各一兩乳香

沒藥

血竭各一

輕粉一錢

朱砂

欒石

黃丹飛過

黃連

白芷各五分

右為細末搽瘡口上用燈心數莖却用膏藥貼之

木香散 治瘡口久不斂者

木香

煨柳各一錢黃連二錢

右為細末搽瘡上如痛加當歸一錢

經玉散 一切腫毒癰疽生肌肉

用寒水石不拘多少以鹽泥包裹火煨黃丹少許水飛過

皮紙搗於火上烘乾為度研細末搽瘡上

洗毒散通玄論治諸般惡瘡風濕陰蝕瘡並宜此洗之

用蛇床子地骨皮地丁麻黃荆芥防風枯礬各三錢

右用水三碗葱白三根煎至二碗無風處洗

軟青膏 治一切風熱瘡及小兒頭瘡

巴豆十個

瀝青

黃蠟

香油各五兩

膩粉一匙

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑色去巴豆却入膩粉勻放冷敷瘡上

神仙太乙膏 治八發癰疽及一切惡瘡軟癩不問年月深遠

已成膿未成膿並宜貼之如蛇虎傷螫蟻犬咬并湯火刀斧



所傷打撲跌損者無不可治如發背先以溫水洗瘡淨用無  
糖軟帛拭乾却用緋絹帛子攤膏藥貼之其膏藥可收十年  
不壞愈久愈烈可用磁罐盛之

玄參

白芷

川當歸去芦肉桂去粗皮

大黃

赤芍藥

生乾地黄各半兩俱剉

右用麻油一斤浸春五日夏三日秋七日冬十日瀝滓油熬  
得所下黃丹半斤滴油在水聚為度

善應膏應驗方治一切癰疽腫毒發背腦疽漏瘡癰子金瘡便  
毒應瘡及小兒頭瘡丹毒寒濕冷痺肢節疼痛手足頑麻打  
撲傷損 內腫瘰癧蜈蚣咬蝎螫婦人乳癰月間敗血臍腹  
疼痛並用此散毒氣立効先須洗淨瘡腫然後貼藥

黃丹半斤水飛沒藥

乳香各二斤半白欬

木賊去皮白芨

當歸

官桂

杏仁

白芷各二斤血竭一斤半槐枝二兩二斤半

柳枝二兩二斤半條三十 真麻油一斤四兩

右件十味內除丹乳沒硝外七味剉碎入油浸三日文武炭  
火鍋內熬黃色瀝出粗藥方下黃丹以新柳枝長五六寸如  
小錢大撓勻令熬丹褐色掇下鍋子在地却用柳枝撓藥出  
盡烟方入乳香沒藥血竭入鍋內仍用柳枝撓勻三五十遍  
候藥冷傾在瓷器內盛春三月間合如常貼用

干槌膏 治一切無名惡瘡

單麻仁四十九粒杏仁

山豆仁

胡桃仁各四十九个

楓香脂四兩加乳香沒藥各二錢半

右為一處槌一千下成絲者新水接之為度

丹溪心法

卷之四

四二



乳香善應膏 治癰疽發背諸般惡瘡疔撲傷損筋骨疼痛並  
皆治之

乳香

沒藥

血竭各五斤阿魏二斤

麝香一斤另研大黃

黃連

黃柏

防風

荊芥

芍藥

白芷

玄參

當歸

連翹

巴豆

蘇木

大楓子各一兩木鱉子八个川山甲八片

黃丹一斤水飛過槐柳嫩枝各二十寸 清油二斤

右除乳香等五味另為末將其餘藥剉碎入清油內煎令黑  
色慮去渣入黃丹不住手攪成膏却入前五味藥末再攪令  
勻攤貼患處

金龍膏 治癰疽瘡毒

香白芷如棗大者

巴豆去殼

草麻子去殼

木鱉子去殼各一百二十个槐條

柳條各二百二十寸

乳香

沒藥各三斤白礬五斤

黃丹二十兩

香油三斤

右將前藥同香油煎以槐柳條不住手攪滴水中成珠方濾  
去渣再煎却下黃丹攪勻將白礬逐時入內後下乳香沒藥  
攪勻務要煎熬得法然後收貯攤貼忌婦人雞犬見之  
干槌膏

瀝青一斤六分杏仁四十九个乳香

沒藥各一两

輕粉二分

香油五斤

黃蠟四斤

右將瀝青香油黃蠟同鎔化攪勻却入前四味取出於石上  
槌干餘下用紅絹攤貼之

乳香善應膏

金龍膏

干槌膏



綠膏藥 治諸般惡瘡腫毒軟癩

銅青

草麻子去殼各一兩

松香四兩

木鱉子去殼五十個

杏仁五斤

巴豆五斤

乳香二斤

輕粉五十貼

右各為末搗令勻於淨石上用斧槌干餘下成膏收貯水浸旋用

紅膏藥 治腫瘡及諸瘡毒湯火金瘡等傷

黃蠟一兩

香油三斤

黃丹半兩

右先以黃蠟鎔化次下香油黃丹攪勻再熬以磁罐收貯臨用攤貼

妙應膏 治療癰一切惡瘡腫毒及杖瘡

光柳棍枝各半斤

當歸一兩

水蠟子去殼半兩

黃丹二斤

乳香

沒藥各半兩另研

右先將香油三斤慢熬次下桃柳棍枝木鱉子當歸候焦瀝去渣待冷方下黃丹乳香沒藥以棍條撈勻再以慢火熬不住手撈滴水成珠不散為度以磁瓶收貯旋攤用

已上諸方外消之劑

忍冬酒

癰疽發背初發不問何處或眉或頤或頭或項或腰或脇或手足及婦人乳癰當服此藥神效

忍冬藤五兩槌碎不可犯鐵器大甘草節一兩生用

右同入砂罐內以水二碗文武火慢煎至一碗入好酒一大碗再煎數沸去滓分作三次溫服一日一夜喫盡如病重一日一夜要服兩劑候大小腸通利則藥力到若無生藤乾者亦好若取忍冬葉研爛入白酒少許調和敷瘡瘡四圍中留



一口洩其毒氣亦妙

遠志酒三因方治一切癰疽發背癰毒

用遠志一味洗淨去心焙乾為末酒調二錢澄清服之以渣傳患處

一醉膏楊氏家藏方治發背癰腦一切惡瘡

甘草半兩為粗末

沒藥研二錢半大瓜蒌一枚去皮

右用無灰酒二升煮至一升放溫頓服如一服不盡作三次

一方治癰疽發背疔瘡

野紅花即小葡萄

五葉草即五爪龍

豨薟草 大蒜一箇

右搗爛用好熱酒一碗調汁服之立効

一方治熱背癰疽惡瘡疔腫疥癬及遍身生瘡如蛇頭者

用生白礬一兩為末黃蠟七錢鎔開和勻為丸如梧桐子大每服十九至三十九不拘時米飲送下濕熱水亦可如瘡未破則內消如已破則便合若服金石藥中毒宜服此藥最妙欲治咳嗽化痰用公參五味子湯臨卧吞下

一方治癰疽疔腫惡瘡及黃疽

用炭菇連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾漚汁溫服若以乾末每服三四錢溫酒調服

一方治癰疽腫毒一切惡瘡

豨薟草一兩蚕繭七箇燒乳香一錢

右為末每服二錢熱酒調服如毒重連進三服得汗妙

已上諸方專治之劑

救苦散和劑方治便癰疽冷物



大黃

桔槔

金銀花

黃耆

甘草

梔子

紫花地丁各等分

右吹咀每服一兩酒半碗前隨瘡上下服

五聖散 聖惠方治症同前

瓜蒌一箇

生薑一兩

大黃一兩

皂角刺二兩

甘草

金銀花各一兩

右吹咀每服一兩水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿空下

又方 治症同前

猪牙皂角七箇燒存性

梔子七箇燒川山甲七箇燒

油胡桃七箇燒

右為末作一服空心調下用酒

又方 治症同前

木鱉子七箇去殼甘草

荆芥

當歸尾各一兩

右吹咀水酒煎露空心服併進三服成膿亦散

方鼠黏

子二錢炒細末入蜜一匙淨朴硝一匙温酒空心服亦效

一方蜈蚣三條搗碎好酒調服有膿即散 一方牙皂為末

南星生姜搗乘濕貼上

又方 治症同前

大黃

梔子

貝母

川芎

白芷

牡蠣

大瓜蒌

當歸

右煎法如前

又方皂角膏

皂角炒焦

韶粉

右等分和勻以熱炒醋調仍以紙大患處貼頻頻以水潤之

丹溪心法附錄

卷之六

四九



即効

治便毒 不問日久有膿者其効如神

大黃

梔子

木鱉子去殼皂角

牡蠣

地丁

連翹

甘草各兩

右咬咀酒水煎露一宿空心服之以利為度

治毒散 聖惠方治便毒

當歸

甘草

大黃各五錢 金銀花少許

右咬咀水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿溫服之

消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂角刺

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草

瓜蒌仁等分

右咬咀水酒各半煎食適溫即仍頻提制手頂中髮立動

已上諸方治便毒之劑

用溪心法

○腸癰 大腸有痰積死血流注 桃仁承氣湯加連翹

近肛門破入風者難治防風之類

附脉理

脉訣舉要曰腸癰難知脉滑可推數而不熱腸癰何疑溼緊未

膿下以平之洪數膿成不下為宜

附諸方

桃仁承氣湯 見吐血

復元通氣散 按粹方治諸氣澁耳聾腹癰便癰癰疽無頭止痛

消腫

青皮

陳皮各四兩 川山甲炮

瓜蒌根各二兩

用溪心法附錄

卷六

五



加金銀花一兩

連翹一兩

甘草三兩生熟各半

右為細末每服二錢熱酒調下

治腹內癰腫

大黃一兩取末四錢半

破故紙一兩取末二錢

牛旁子一兩取末一錢

益干一兩取末二錢半

右和作一服蜜水調空心服以和為度

丹溪心法

○乳癰

乳癰陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養

怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故窳不得

通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚即化膿亦有所乳之子

膈有滯痰口氣焮執冷乳而腫熱氣初起逐生結核於初起時

便須忍痛揉令稍軟吮令乳盡目可消散失此不治必成癰癩

治法疎破陰之滯以青皮作陽明之熱細研石膏行汗濁之血

以生甘草之節消腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青穢兼皂角刺

金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然須以少酒佐之若

加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷不可輒用針刀必至危困

若不得於夫不得於舅姑憂怒鬱悶所積累脾氣消阻肝氣

橫逆遂成隱核如大棊子不痛不痒數十年後方為瘡陷名曰

妳岩以其瘡形嵌凹似穴也不可治矣若於始生之際便能

消釋病根使心清神安施之治法亦有可安之理

又方

乳癰方

青皮

瓜蒌

葉

連翹

桃仁

皂角刺

節

如破多加參芪



右以水煎入酒服

乳癰如勞瘵腫

石膏煨

樺皮燒

瓜蔓子

甘草節

青皮

右以水煎服

治乳有核

南星

貝母

甘草節

瓜蔓各二兩

連翹半兩

右以水煎入酒服

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮

連翹

瓜蔓

白芍

料草節

乳岩小破者與胡川芎

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥一錢

甘草

當歸各三錢

右作一服水煎入酒少許熱飲

吹妳

金銀花

天薔麥

紫葛藤等分

右以醋煎洗患處立消如無天薔麥子葛藤只金銀花亦可

乳栗破 少有生必大補

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

連翹

白芍

甘草節

右以水煎服



祕傳湯泉散應驗方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯  
如乳脹痛或作癰腫

王不留行 白丁香 漏蘆 天花粉

白僵蚕 川甲火煨黃色各七錢

右為細末每服四錢用猪蹄湯調下

秘傳金銀花散應驗方治乳脉不行結成癰腫疼痛不可忍者

金銀花 當歸 黃耆蜜炙 甘草各二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾入酒半鍾去滓溫服食後

橘香散聖惠方治乳癰未結即散已結即消極痛不可忍者藥

下即不痛神效蓋因小兒吹乳變成

陳皮不拘多少湯浸洗白乾炒黃

右為末麝香研酒調下二錢

治婦人吹乳奇效

用大車頭邊油垢丸如梧桐子大每服五十九溫酒下

勝金丹 治吹乳

用百齒霜即梳上髮垢是也丸如梧子大黃丹為衣每服三

丸倒流水送下服後如患左乳左卧右乳右卧溫覆出汗倒

流水者取水傾屋上流下是

瓜蒞散 治乳癰如勞

瓜蒞一箇去皮焙 甘草生三錢乳香一錢另研

當歸酒浸焙半兩 沒藥二錢另研

右黑無灰好酒三升銀石器內慢火熬取一升清汁分作二

服飲之



通心湯 治乳癰疼痛不可忍者

穿山甲炮黃川木通各兩自然銅半兩醋淨七次

右為細末每服二錢熱酒調食遠服之

一方 治乳癰無名腫毒初起

用五葉藤即五爪龍不拘多少生姜一塊好酒一碗搗爛去渣煎服汗出為度仍以渣敷患處

一方

用新栢葉去枝梗一握洗淨以朴硝一勾同入臼內杵之旋加清水紐取自然汁半碗先令病人飲三两口仍用雞翎蘸汁掃於患處中間留一眼四邊頻上掃之其腫自消

方

用生地黄搗汁塗之一日三五次立効

廣按丹溪云癰疽之証陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之此乃治癰疽之大法也請陳其旨夫所謂陽者氣也鬱而為火無形之物也陰者血也鬱而為痰有質之物也陽無形故浮而在表淺而大所謂癰也陰有質故沉而在裏深而惡所謂疽也癰脉浮洪弦數陽之象也疽脉沉細弱濇陰之象也癰屬氣滯於血疽屬血滯於氣總而言之皆是熱勝血也治癰以寒藥是正治之法也治疽以熱藥是從治之法也夫藥性熱則開行性寒則踈泄疽乃有形之陰非熱藥從治豈能開行之乎此古人用藥內踈內托乃正治從治之義也

癰疽七十八

丹溪心法

癰疽心法

卷之六

五

癰疽



疔癰用針刀鑿破頭上以蟾酥敷之後用菘豆野菊莎末酒調飲醉睡愈即痛定熱除不必去疔自愈也 治一切疔瘡用紫梗菊花根莖葉皆可研碎取汁滴口中飲之

癩癧 血氣痰熱 以牡蛎煨過為末玄參搗膏為丸桑椹黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者晒乾為末湯調服 師云大田螺連肉燒灰存性為末入麝香少許濕則乾敷乾則油調敷 夏枯草大能散結氣而有補養血脈之功能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効

入方 治癩癧

海藻洗去沙土晒乾

昆布搽去土同上二味先研為末

何首烏木曰搗為末

皂角刺炒令黃色

公蛇返樹上或墻上是雜用一條平地上若是雌

右五味為細末和勻一處猪項下刀口肉燒熟離前藥末食後倒患處眠一伏時每核灸七壯口中覺烟起為度膿盡即安初生起時灸曲池男左女右

附諸方

腎鑑保生挺子 治疔瘡背疽癰癧一切惡瘡

金脚信

雄黃

硃砂各二錢麝射一錢

輕粉半大匣半大盞

巴豆四十九粒文武火炒研

右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥合成挺子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏 治一切惡瘡

當歸

藁本各半兩沒藥二錢 黃丹



黃蠟各二兩 乳香一錢 琥珀二錢半 膽礬

粉霜各一錢 白膠香三兩 清油二斤 木鱉子五十箇去皮

巴豆十五箇去殼 槐枝 柳枝各一百二十條

右件一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥熬至焦黑亦漉出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛攤之立効

千金托裏散 治疔瘡發背一切惡腫

官桂 人參 甘草 川芎

白芷 芍藥各一兩 木香 沒藥各三錢

乳香二錢 當歸半兩 連翹一兩二錢 黃芪一兩半

防風 桔梗 厚朴各二兩

右十五味為細末每服三錢酒一盞煎三二沸和渣溫服無時

破棉丹 治瘡腫一切風熱

大黃二兩半生半熟 芒硝 甘草各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清溫酒任化下童便半盞研化服亦得已冷

○已上數方治疔瘡次第之劑

蟾酥丹 危氏方治疔瘡

蟾酥不拘多少

右以黃丹白麩等分搜和為丸如麥粒大針破疔瘡以一粒內之 又方單用蟾酥每用粳米大重針瘡口納入輕者不須針用水澄膏用白芨末半錢水盞內澄去水脚於皮紙上攤開貼瘡上 聖惠方取蟾酥油調封瘡口立効

蟬蛇散 聖惠方治疔瘡最有功效

用蠟心去付余



蟬蛻殼

白蠶蚕各等分

右為末酸醋調塗四圍留瘡口候根出稍長然後拔根出再  
用藥塗瘡 一方不用醋只用油調塗 一方用蟬蛻為末  
蜜水調半碗服之及以津唾調搽瘡上即愈  
一方 治疔腫初發

用蒼耳根並苗子一色者燒灰為末用醋泔調塗瘡上毒根  
即出或煎散調尤好 一方用蒼耳草一大握生姜四兩同  
研爛入生頭酒一碗去渣執服大汗即愈仍用渣傳瘡  
回生錠子紫義方治疔瘡

草烏去皮尖十二兩

麝香一字用當門子

蟾酥七粒粳米大 巴豆七粒去皮  
右為末麩糊丸作錠子如有疔瘡先針刺至痛見血用此錠

子維入用膏藥貼之重者於疔瘡四面貼之三二日根自落  
下藥最宜驟用

立馬回丁丹 治疔瘡走亂下止

金脚信

蟾酥

血竭

硃砂

沒藥各五分輕粉

片腦

麝香各一字

右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長六用時將瘡頭刺破  
納入一錠第二日瘡腫為効以膏藥貼之

雷楔 一名紫金錠子 治疔瘡諸惡腫毒

續隨子五兩川烏頭

甘草各二兩蟾酥

雄黃

白礬各一兩麝香二錢半辰砂一兩五錢

片腦二錢

人言

輕粉各五錢石梗一兩五錢

黃連二兩三錢白丁香三錢巴豆四十九粒去殼油心膜



右各為細末再入乳餅內投蟾酥巴豆同研勻麪糊丸成錠  
子如指彈大陰乾如遇諸瘡以井花水磨塗瘡上如乾再搽  
飛龍奪命丹聖惠方治一切惡疔瘡

人言二錢半斑猫十二箇去足翅 巴豆十二箇去殼油

硃砂三錢 硃砂 硼砂 乳香

沒藥 黃丹各二錢南星水洗 半夏水洗各一錢

血竭二錢 麝香一錢二分半

右為末蟾酥汁為丸如紅豆大五分內分一分加入斑猫四  
箇然後捻成錠子如小麥大每一瘡針破下一錠子用飯粘  
白紙封口用前四分內一丸噙在舌上齋麻凉水吞下忌熱  
物片時如蟾酥乾用人乳汁化開 一方用雄黃二錢

已上數方疔瘡外治之劑

一方 治疔瘡

用白芷二錢生薑一兩同搗爛執酒一碗護服出汗立効

鐵柱杖 治疔瘡發背頭風

用草烏頭不拘多少去皮淨為末用葱白去鬚葉搗爛為丸  
如豌豆大以雄黃為衣每服一丸先將葱細嚼熱酒送下或  
有惡心吐三四口用冷水一口止之即卧以被褥子蓋汗出為度  
返魂丹端竹治十三腫疔瘡

硃砂 膽礬各一錢半血竭 銅綠

蝸牛 雄黃 白礬各三錢輕粉

沒藥 蟾酥各五分麝香少許

右將七味為末和搗蝸牛蟾酥極爛和藥時旋入藥內為丸  
如雞頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥



凡裹在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘥如不能嚼葱研爛裹藥下曾有一僧貨此藥極有效予自合救人累獲功驗真妙方也

寸金丹 治疔瘡 又各返魂丹再生丹延命丹延壽丹來甦丸得道丸此藥燕下即活

辰砂二分半 蟾酥

輕粉各五分 拈礬

寒水石

銅青各一錢 海羊二十箇即蝸牛

麝香一字

右為末研蝸牛一處搗爛如菜豆大攤丸添酒成之病輕者二丸重者三丸末効再服服法先嚼葱白一大口極爛置手心中放藥在內裹執酒下暖處卧汗出即愈急冷冷水○已上數方疔瘡辛温內托之劑

治魚臍疔瘡 醫方大成

虞刺葉即系瓜葉

連鬚葱

韭菜

右入石鉢內研末如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左手貼左腋下在右手貼右腋下在左脚貼左膝在右脚貼右膝如在身中則貼心臍並用帛縛住候肉下紅線處皆白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救矣

一方 治疔瘡

用菊葉一握搗爛取汁灌入口即活用根亦妙

一方 治疔瘡

土蜂房一小窠

蛇蛻一條全

右作一處紮瓦器中以黃泥封固火煨存性研為細末空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡化為黃水仍服玉聖散

西溪心法引餘

醫法綱目卷其

五九



五聖散

大黃

生姜

金銀花

甘草各一兩

瓜蒌一箇

皂角針二兩

右以咀每服一兩用好酒二盞煎至一盞溫服

破棺丹瑞竹治疔黃走響不止

甘草

京稷各二錢

山梔子

牽牛各一錢半

地丁

連翹

金銀花

牡蠣各一錢半

瑞竹堂加大黃三錢半

赤芍藥

當歸各二錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用童子小便化開服之食前忌酒并生冷硬物

治疥瘡醫方大成

黃連

羌活

白僵蚕

青皮

獨脚茅

防風

赤芍藥

獨活

蟬蛻

細辛

甘草煎名等分

右以咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許姜二兩同研爛熱酒和服然後用酒水各半盞姜三片煎服熱不減後再加大黃少許煎服畧下一兩湯蕩去餘毒更用白梅蒼耳子研末貼瘡上枝去根脚此方以藥味觀之甚若不切然効驗神速累試之驗

○已上數方疥瘡辛涼內疎之劑

連翹九齊生方治癰瘰結核已破或未破者

薄荷新者二升製取汁

皂角一槌水浸去皮製取汁

以上二味一處於銀瓦器內熬成膏次入

青皮二兩不去白皂角子慢火炮去皮取皂子仁搗羅為末半兩



陳皮兩不去白連翹半兩 黑牽牛一兩半半生半炒  
台五味為末用前膏子為丸如梧桐子大每服二十九前連  
翹湯食前送下

治瘰癧止楊氏家裁方

斑蝥二十八箇去頭翹足用糯米炒 荆芥穗

僵蚕 黑牽牛各二錢

右為末臨睡時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再一  
服五更初却以溫酒調藥一錢服訖如小便無惡物行次日  
早再進一服又不行第三四五更初先進白糯米稀粥湯却  
再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末一錢服之以小便內  
利去惡毒乃為愈矣

治瘰癧張子和方

白鷄毒去絲直者

白丁香直佳斑蝥去翅足

磨刀泥 苦丁香 赤小豆各等分

台為末十歲以上每服一錢二十歲已上服二錢病人不要  
吃晚飯五更時用新汲水一盞調服至辰時見効男子大便  
中女人小便中利下赤白色二三次或膿血如鼠狀為効當  
日食粥不待吃別物忌油膩患三四年者只一服七八年者  
再一服

尅效散 治瘰癧子瘡

官桂 硃砂各半錢赤小豆 粳米各四十九粒

斑蝥四十九箇不去翅足

石五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字前  
商陸根湯送下空心服小便淋瀝為効如惡心嘔吐黃水無



效瘰癧日日自消矣

無比丸 治瘰癧

白木

栝榔

防風

牽牛半生辛熟

蜜陀僧

郁李仁炮去皮斑蝥糯米炒各等分

右為末麩糊丸如梧桐子大每服二十丸空心臨卧甘草椀柳湯送下至一月後覺腹中微痛於小便中取下瘰癧子毒如魚眼大已破者自合未破者自消有驗

一方 治瘰癧

用斑蝥一兩去翅足以粟米一升炒黃色去米細研入薄荷末四兩以雞彈清丸如菽豆大空心臘茶湯下一丸每日加一丸加至五丸每日減一丸減至一丸又每加一丸加至五丸後每日仍服五丸

一方 治瘰癧

用烏雞彈一箇頂上開一竅搗清甚勻以斑蝥一箇去頭翅足入雞彈中以細糊封之飯上蒸熟剝去殼去斑蝥空心喫雞彈一日一箇以瘰癧為度

一方 治瘰癧

雄黃 欝金各五錢巴豆去油殼半錢 斑蝥去頭翅足糯米炒七箇

右為末麩糊為丸如菽豆大每服五七丸臨卧以冷茶清送下五香連翹湯精要治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

舶上青木香

沉香

乳香

丁香

麝香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

射干

木通去節各七分



大黃蒸一錢

右用水二盞者取一盞以上去滓取八分清汁空心熱服半  
日以上未利再喫一服以利下惡物為度未生肉前服不妨  
以折去毒熱之氣本方有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故缺  
之知自當量入 一方有黃耆霍香無獨活麝香一名五  
香大黃湯

毛燭散 治療癰和血通經服之自消日進一服七八日功效

方見婦人門

東垣升陽調經湯 治療癰瘰癧或至頰車此皆出足陽明胃

經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳  
於癸腎是夫傳與妻但作塊子堅硬大小不等並皆治之或  
作丸亦可

升麻八錢 葛根

龍膽草酒製酒芬

莪木酒洗妙三稜酒炒

甘草炙

黃連酒洗

連翹

桔梗各三錢生黃芩四錢歸稍

芍藥各三錢黃柏酒炒一錢知母酒洗炒一兩

右另秤一半作末煉蜜為丸兼豆大每服百餘丸一半作吹  
咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七八錢水二盞先浸  
半日前至一盞去滓臨臥熱服足高去枕仰臥噙一口作十  
次嚥下留一口在後送下丸藥服畢其臥如常

○已上數方療癰內消之劑

太乙膏 治癰子瘡神效

腦子一錢研輕粉

乳香各二錢研麝香三錢研

沒藥四錢研黃丹五兩



用清油一斤先下黃丹熬用柳枝攪又用葱兒葱七枝先  
下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手攪觀冷熱得  
折入腦子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤

方

用歷青草碎子去殼同研成膏先用葱椒湯洗瘡淨以紅絹  
攤膏貼患處

方

用石灰一塊自辰時晒至午時將歷青搥細杏仁四十粒草  
麻子十四粒同搥成膏依前攤貼

方

用白膠香一兩磁器內鑊開去滓再鑊以草麻子六十四粒  
研爛入膠內夏入油半匙熬勻滴水試軟硬得所量瘡大

小以緋帛攤貼先以葱椒湯洗瘡淨後貼一膏可治三五瘡  
并治惡瘡軟疔皆効

方

用荆芥煎湯待冷洗瘡淨揀黑紫處以針刺破却用雄黃樟  
腦為末清油調搽三四次候黃水出處仍取未見日蚯蚓糞  
如雞彈大一塊火內燒紅川山甲九片或十一片微炙為末  
入乳香沒藥少許香油調搽妙

方

梧桐淚一錢半巴豆去皮油皂角刺各一錢

右為末於淨室中勿令人見以不語唾調和捻成錠子如黃  
虫糞大陰乾每用先刺開瘡入藥一錠已潰者就內入藥用  
紙封之勿令透氣待膿水出或有便塊在中擠出惡物瘡口



自歛即愈忌生冷油膩葷腥麪食

又方

以羊髓燒灰末摻末破香油調傳已破乾摻

又方

用夏枯草不拘多小於鍋內煮爛除草將汁熬膏貼之

治項上生瘰癧瘡未破灸法

以男左女右中指屈過用草量中節橫紋名為同身寸量三寸半為則於手板盡處量三寸半臂中立穴灸兩二壯半月瘰癧處水如泥惡物盡膿流出後以膏貼之妙

○已上數方瘰癧外散之劑

諸瘡七十九

丹溪心法

○金瘡 五倍子紫蘇等分

又方 白膠香三錢龍骨一錢

金瘡狗咬

五月五日午時用陳石灰一斤搗為末並一斤搗汁和成餅陰乾為細末敷之

治陽証腫毒并金瘡

大粉草剉碎用竹筒一段割去青兩頭留節節上開一竅入粉草在內滿後用油灰塞孔竅從立冬日放糞缸內待立春先一日取起豎立在有風無日陰乾二十一日多最好却破竹取草為細末用傳金瘡乾者水調

附諸方

花藥石散和劑方治一切金刀所傷打撲傷損身體出血者急

諸瘡



於傷處搽藥其血自化烏黃水方見損傷類

一方 治金刃所傷一切腫瘡良馬斷梁等瘡

用冬月黑牛膽一箇裝新石灰四兩白礬一兩陰二十七日待乾取出再用黃丹一兩另炒紫色研細同一處再研勻敷瘡即瘥

刀箭藥 治金刃跌撲狗咬湯火所傷

端午日採一去草花蓋擇嫩者搗爛量入舊石灰搗極勻或丸或餅陰乾碾為末濕則搽之乾則油調搽

一方

用初生小鼠同石灰搗勻陰乾傳金刃跌撲出血甚妙

如聖散秘方治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治大有効驗

香白芷

川芎

防風去芦各五錢

細辛五錢

雄黃二錢半蒼朮米泔浸一宿去皮二兩

草烏去皮脍四兩

兩頭尖去皮脍四錢

右為極細末血不止乾貼破傷風牙關緊急用熱酒一盞調

服一錢又貼破處風牙疼乾擦之流涎即愈狗咬蛇傷煎盤

湯洗淨乾貼用熱酒調半錢服如重車行五里並服三服如

重服一錢小兒量力減服多年不效惡瘡前葱白鹽湯煎水

口漱洗去膿血一二次拭乾貼一切蜂蝎小虫所傷唾調於

痛處貼之婦人產後敗血上衝下注熱酒調服一錢忌腥葷

麪食油膩之物

丹溪心法

湯火瘡 臘月猪膽塗黃柏炙乾為末傅之

湯瘰 以淋了第二次灰相傳患處



火澆

桐油二錢 水二錢

石二件以桃柳枝不住手攪成膏再入少水浴外用獼兒肚底毛細剪摻上

附諸方

治湯火傷未成瘡者

用小麥炒黑為度研為末膩粉減半油調塗之

赤石脂散 經驗方治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃各等分

右為末以新汲水調塗傷處

治湯火所傷

用大黃當歸各等分為末以清油調傅之濕則乾摻之

冰霜散 治火燒損傷熱油澆傷皮爛肉大痛

寒水石生 牡蠣煨 明朴硝 青黛各一兩

輕粉一錢

右為末新水調或油調濕貼乾則痛處即止如神

治火傷

凡被火傷急向火灸雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物激之熱不出爛入筋肉

一方 治火傷

以杉木皮燒灰存性為末濕用乾摻乾用雞清調塗

治湯盪火燒瘡立効

用掃猪毛燒灰香油搽患處

四黃散 澹寮治湯盪火燒熱瘡連痛



丹溪心法附錄  
卷之五  
六十一  
大黃

黃連

黃蘗

黃芩

白芨各等分

右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上

治湯火瘡澹索方

用螺蛸殼多年乾白者火煨為末如瘡破用乾摻之如不破  
輕粉清油調傳之

丹溪心法

○下疳瘡

蛤粉

蠟茶

苦參

蜜陀僧

右為末河水洗淨臘猪油調傳 兼治臙瘡

又方

米泔水洗瘡淨用頭髮以鹽水洗淨去油再用清湯洗晒乾

燒灰傅瘡上即時生靨

附諸方

治下疳

用黃栢以磁瓦割下細末同蛤粉末等分摻上即愈蓋黃栢  
去熱蛤粉燥濕故也

又方

用米泔水洗瘡淨以雞肫內黃皮焙乾為細末傳之

又祕方

用透明白膠香為末入輕粉麝香少許乾摻乾則用油調傳之  
立効方瑞竹堂方治下疳

燈草灰入輕粉麝香少許乾貼

治下疳祕方



旱田螺燒灰腦子

麝香

輕粉少許

右為末香油調傳患處即愈

下疳藥 聖惠方

用五倍子為細末先以漿水洗淨瘡乾貼

治下疳妬精瘡祕方

七月七日採鳳根草燒灰淋水洗之

聖粉散 治下注疳瘡蝕鼻腐爛疼痛不可忍者

黃柏蜜炙

蜜陀僧

黃丹

高末茶

乳香各三錢輕粉一錢半麝香少許

右為末用葱湯洗瘡後次貼此藥兼治小兒疳瘡

下疳瘡洗藥

黃連

黃柏

當歸

白芷

獨活

防風

朴硝

荆芥

右等分水煎入銅錢五十文烏梅五箇鹽一匙同煎溫洗五

日五七次用下藥敷

木香

枳殼

黃連

銅青

輕粉

活礬

蝶蛸各等分麝香少許

右為極細末洗後至夜敷上

黃連散 治下疳

黃連

黃柏各二錢蜜陀僧

輕粉

黃丹

沒藥各五分

右為細末瘡濕乾搽瘡乾香油調搽

麝香杏仁散 宜明方治婦人陰瘡

杏仁不拘多少燒存性

麝香少許



右為細末如瘡口深用小絹袋子一箇盛藥瀾繫口臨上藥  
灸熱安在陰內

丹溪心法

○癬瘡

防風通聖散 去硝黃加浮萍皂角刺 又紫蘇樟腦蒼耳浮

萍煎湯洗

又方

浮萍一兩

蒼耳

蒼朮一兩

苦參一兩半

黃芩半兩

香附二錢半

右用酒糊為丸

又方

蘆會

大黃

輕粉

雄黃

蛇床子

槿樹皮

楨榔

右為末先刮癬後用米醋調藥末塗之

又方

蘆會研三錢江子去殼十四粒

草麻子去殼十四粒

斑蝥七箇去翅足

白蠟

右以香油二兩熬江子草麻斑蝥三藥以黑為度去藥入蠟  
并蘆會末在內用磁罐盛貯微微刮癬令破以油塗上過夜

畧腫即愈

附諸方

碧玉散

治癬

銅綠

硼砂

白礬各等分

右為細末香油調搽



桤皮散 治頭面荷葉癩

用川桤樹皮為末醋調湯頓如膠敷上候癩瘡抓破再搽敷日即愈

連粉散 風癬濕瘡並皆治之

黃連一錢 輕粉五分 賦粉 黃柏

黃丹 枯白礬各一錢 龍骨 苦苣石各三分

右為細末每用少許濕則乾揉乾則香油調搽

如聖散 治疥風癬瘡

蛇床子一兩 黃柏 苦參 藺茹各五錢

白礬 狗脊 藜芦 前草各二錢半

輕粉一錢二分半 胡粉一分半

右為細末清油調搽

樊君散 聖惠方治遍身生癬日久不愈上至頭白

用獨莖羊蹄根別搗白礬為末一處以極酸米醋調抓破搽

藥候痒極至通即止隔日治出不過兩上即愈 又治癩風

以苧麻刮熱以此藥搽之三四度愈

黃藥子散 經驗方治妳癬瘡經年不瘥

黃連 玄參 赤芍藥各五錢

右件為細末隨以多少入輕粉少許嚼芝麻取汁調先煎

菜湯洗令淨以藥傳之愈

何首烏散 和劑方治脾肺風毒遍身癬疥瘙痒或致肌肉木麻

并紫癩白癩風並皆治之

荆芥穗 威靈仙 洗淨蔓荊子去皮 蚶蚬草 去土

何首烏 防風 去芦 甘草 炙各等分



丹溪心法附錄 卷之八 醫方類聚 卷之八  
右為細末每服二錢食後溫酒調下

丹溪心法

○ 膳瘡

乳香

沒藥

水銀

當歸

川芎

貝母各二錢半 黃丹 二錢半 一云二兩半

真麻油五兩

右吹咀除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑色去渣下黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨生用

血竭

赤石脂共兩頭髮如指入

黃蠟一兩

白膠香

香油不拘多少

右件以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入龍骨

血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每處一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箬貼在外三日後齒過再貼仍服活血藥

又方

用沙糖水煎冬青葉三五沸撈起石厭平將藥貼瘡上日換三次

又方

以頭垢燒灰和棗肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉摻上却以前膏兩傘紙攤貼之

又方

地骨皮一兩 白蠟半兩 甘草節半兩

右以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去渣入黃丹一兩



半匙火熬黑提起白紙攤貼之次用冬青葉醋煎過以藥貼之

附諸方

夾紙膏 治腫瘡久不愈者

乳香三錢 血竭二錢半 沒藥四錢 鬱金五錢

射香一錢半 牡蛎半兩 黃連 黃柏各二兩

大黃 黃丹各一兩 輕粉三十點

右為細末清油調勻攤油紙上貼瘡每一箇貼三日每日以  
冷水洗三次膏藥亦翻轉三次兩層夾紙以線縫四邊針刺  
眼透藥氣其藥末同和一处收要用旋調

至聖隔紙膏

水龍骨另研 輕粉研 黃丹飛各三錢 樟腦

黃連各四錢

右為細末桐油調勻以油紙隨瘡眼大小糊袋以藥內代油  
貼在瘡上用軟綿繫束之

腫瘡膏藥

輕粉 赤石脂 黃丹 甘草

黃柏去粗皮切為末 火龍丹即炒口上燒紅土或用

伏龙肝即竈心紅土亦可

右各等分先將五味研為極細末後下輕粉用真香油調勻  
再用油單紙夾住勿令藥侵瘡貼上絹布繫住一日三翻拭  
去瘡上血沫

治外腫脚瘡祕方

用累經燒透空竈黃土研極爛入黃柏赤石脂黃丹輕粉拌  
勻以清油調稀用油紙盛藥傅瘡上却以布編縛定縱痒不



法附論  
以手開動直候十數日後瘡愈却去之  
○廣按此方與前方相類其用龜心黃土以燥溫清執用黃  
栢之辛以散火邪真諸方所不及但再加沒藥與乳香以  
散瘀血可謂十全矣

又方

白膠香末以蠟酒攤上箬葉夾藥在內貼之

治遠年近日臙瘡聖惠方

黃丹飛

輕粉

蜜陀僧

龍骨各等分

射香少許

右為細末漿洗淨瘡口乾貼之

又祕方

輕粉二錢

黃蠟一兩

猪脂一合

右溶化攤油紙上貼

○漏瘡 新增

附諸賢論

刘宗厚曰諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭蓋無互  
肉宜用附子浸透切作大片厚三二分於瘡上着艾炙之仍  
服內托之藥隔二三日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣  
至有膿水惡物漸清根深者郭氏治用白麩硫黃大蒜三物  
一處搗爛着瘡大小檢作餅子厚約三分於瘡上用艾注灸  
二十一壯一灸一易復隔四五日方用翠霞錠子并信效錠  
子互相用之紙入瘡內互肉盡去好肉長平然後貼收斂之  
藥內服瘡病之劑調理即瘥矣

附諸方



灸法 冷漏多在腿足之間先是積熱所注久則為寒附子破  
作兩半用人唾浸透切成片安漏孔上用艾灸之  
內托散

川芎半兩

細辛

白芷稍各二錢半

右為末每日作湯服之病在下食前服病在上食後服看瘡  
大小計隔年黃麻根刮去皮燃成繩子入孔中至入不去則  
止瘡外膏藥貼之

內補十宣散

治冷漏在遍身用此內托補虛

方見癰疽類

當歸拈痛湯

治冷漏在腿腿之間用此以

虛散邪 方見

脚氣類

翠霞錠子

治年深冷漏日久惡瘡有反肉用之

銅綠

寒水石

滑石各三錢明礬

膩粉

砒霜

雲母石研如粉各一錢二分半

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡內深淺經  
之如修合此候天色晴明則可

信効錠子 治一切惡瘡

紅娘子

黃丹

砒霜

鷹屎

土硝

白及各二錢半銅綠二錢半腦子

射香各少許

右研細末廝兒乳汁和為錠子用中病即止

生肌散 歛口生肉

太乙膏 護瘡散邪 並見癰疽類

丹溪心法

○杖瘡疼



黃栢生地黃紫金皮皆晏藥執並作痛 涼血去瘀血為  
先須下雞鳴散之類 生地黃黃栢為末童便調傳或加  
韭汁 不破者以韭采葱頭春碎炒執貼冷則易 膏藥  
用紫金皮乳香沒藥生地黃黃栢大黃之類

又方

用大黃黃栢為末生地黃汁調傳乾則再傳

又方

野生苧麻根嫩者不拘多少洗淨同鹽搗傳瘡上効傷重  
多用塩

附諸方

雞鳴散

見跌損傷

乳香散

治杖瘡腫痛

乳香另研

沒藥另研各一錢

大黃

黃連

黃栢

黃芩各三錢腦子少許

右為細末冷水調勻攤於緋絹上貼之

當歸散

乳香

沒藥各二錢茴香四錢

當歸一兩

自然銅火曉醋淬七次

右為細末每服五錢温酒調服

五黃散

黃丹

黃芩

黃連

黃栢

大黃

乳香各等分

右為細末冷水調成膏攤緋絹上貼之

陳巡檢方

治杖瘡

丹溪心法附錄

醫經綱目卷之六

七五



大黃	當歸	芍藥	川芎
木鼈子	巴豆	白芷	白朮
乳香	沒藥	射干	槐枝
柳枝已上十三味各一两	苗丹十三兩	飛過	
香油二十六兩			

右除乳香沒藥外十一味用香油浸三日熬白焦黃色瀝去滓入飛丹再熬滴水不為度候油温下乳香沒藥去火

丹溪心法附餘十七卷

庚集

濕鬱門

腰痛 八十

附腎著

丹溪心法

○腰痛主濕熱 腎虛 瘀血 挫閃 痰積 脉大者腎虛  
 杜仲龜板黃柏知母枸杞五味之類為末猪脊髓和丸服 脉  
 瀋者瘀血用補陰丸加桃仁紅花 脉緩者濕熱蒼朮杜仲黃  
 栢川芎之類 痰積作痛者二陳加南星半夏 腰曲不能伸  
 者針委中 允諸痛皆屬大寒涼藥不可峻用必用温散之藥  
 諸痛不可用參補氣則痛愈甚人有痛面上忽見紅點者多死  
 ○戴云濕熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也腎虛者疼之  
 不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

腰痛



又方 治濕痰腰痛大便泄

龜板 一两多 蒼朮

白芍 酒炒 香附 四錢

右為末糊丸如內傷白朮山查湯下

又方 治腰腿濕痛

龜板 酒浸二 蒼朮

葳靈仙 酒浸二兩

右為末酒糊丸每服黑豆汁煎四物湯加陳皮甘草生薑煎

湯下

○久腰痛必用官桂以開之方上其腹脇痛亦可

又方

龜板 酒炙一两半

陳皮

蒼耳 半兩

右為末調服

又方

龜板 酒炒半 酒炒栢 四錢 青皮 三錢

右為末姜一大片同前藥末一錢研勻以蒼耳汁盪起煎令

沸服之

摩腰膏 治老人虛人腰痛并婦人白帶

附子尖

樟腦

朱砂 一冬

右為末蜜丸如龍眼大每服一九姜汁化開如粥厚火上煨

威靈仙

知母

蒼朮

生甘草 一冬半

烏頭尖

丁香

射香 五粒大者

乾姜

吳茱萸 各一冬半



執置掌中摩腰上候藥盡粘腰上烘綿衣包縛定隨即乾熱如火日易一次

附脉理

脉訣舉要曰腰痛之脉皆沉而弦兼浮者風兼緊者寒濡細皆濕實則閃肭指下既明治斯不忒

附諸方

五積散利濟方治寒濕傷子腎經腰痛不可俛仰蒸氣加茱萸

婦人血氣加桃仁見中寒

木附湯濟生方治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

附子炮去皮白木各一两杜仲去皮半两

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心温服

三牛丸楊氏家藏方治冷氣流注腰痛不可俛仰

延胡索

黑牽牛

破故紙各二两

右為末研煨蒜為丸梧桐子大每服三十九葱酒塩湯任下一方

用黑丑四兩半生半炒研細取頭末水丸梧子大硫黃為衣每服三十丸空心塩酒送下四服即止

速効散 治腰疼不可忍

川練子用肉以巴豆去殼五箇同炒赤去巴豆

茴香塩炒去塩

破故紙炒各一两

右同為末每服一錢食前熱酒調服

獨活湯 治因勞後得腰痛沉重如水似折

羌活

防風

獨活

肉桂

大黃煨

澤瀉三錢

桃仁五十箇當歸



升心法附錄  
連翹半兩 甘草二錢 防已 酒連一兩

右吹咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服  
一方 治積年久患腰疼

用地膚子為末酒調一錢日三五服即愈  
歲靈仙散 治腰脚痛

歲靈仙生不以多少  
右為末每服二三錢食前酒調下

立安散  
杜仲去皮炒斷絲 橘核炒取仁

右各等分為末每服二錢入塩少許食前温酒調下  
青娥丸三因方治腎經虛冷腰腿里痛常服壯筋補腰

破故紙四兩炒杜仲四兩炒斷絲 生姜二兩半炒乾

右為末用挑胡仁三十箇研膏入蜜丸梧子大每服五十九  
塩酒下

杜仲酒三因方治風冷傷腎腰痛不能屈伸  
杜仲一两去粗皮用姜汁製炒

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服  
一方為末温酒調一錢空心服

立安丸三因方治五種腰痛常服補暖腎壯健腰脚  
破故紙 續斷 乾木瓜各二兩 草薢二兩

杜仲去皮炒斷 牛膝酒浸各一两  
右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九温酒塩湯空心任下

已上諸方散和理氣之劑  
獨活寄生湯 治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或牽拳掣



丹溪心法卷之八  
八腎五病目腰膝之  
四  
痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力

獨活三兩 桑寄生如無以續斷代之細辛

牛膝 秦艽 茯苓 白芍

桂心 川芎 防風 人參

熟艾 當歸 杜仲炒 甘草多二兩

右剉每服三錢水煎空心服 下利者去地黄 血滯於下

委中穴刺出血或仍灸腎俞崑崙尤佳

牛膝酒三因方治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮 五加皮 薏苡仁 川芎

牛膝各一兩 甘草一兩 生地黄十兩 海桐皮二兩

羌活一兩

右咬咀用絹帛裹藥入無灰 內久浸七日夏三五宿每服

一或日用三四服長令酒氣不絕一加炒杜仲一兩

虎骨木瓜丸 治飲食過度寒濕停駐經絡不和傷取風血走

注筋骨疼痛晝靜夜甚殘胃露所傷筋骨走注并婦人血風

疼痛

虎骨醋炙 乳香 浸藥酪研 木瓜

天麻 菴蓉

牛膝上四味各二兩好酒浸十日取焙乾存酒

右為末將浸藥酒打糊丸如梧子大每服三十九至五十九

空心食前溫酒送下

如神湯 治男子婦人腰痛

玄胡索 當歸 桂等分 一方有杜仲

右為末每服二三錢食前酒調下



丹溪心法附錄  
治腰痛 聖惠方

青木香 乳香各二斤

右件酒浸藥飯上蒸乳香化以酒調服

菴藺丸 濟生方 治墜隨閃胸氣血凝滯腰痛

菴藺子 半兩 沒藥 二斤半 乳香 一斤半 補骨脂 炒

歲靈仙 洗去芦 杜仲 炒斷絲 官桂 不見火 川當歸 酒浸

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空心鹽酒鹽湯俱

可下

復元通氣散 和劑方 治氣不宣流或成瘡癰并閃挫脇腰氣滯

疼痛

舶上茴香 炒 穿山甲 蛤粉炒去粉各二兩

玄胡索 白牽牛 炒 甘草 炒 陳皮 去白各一兩

南木香 不見火一兩半

右為末每服一錢熱酒調下病在上食後服病在下食前服

不飲酒者煎南木香湯調下

補陰丸 見補損

○已上諸方散邪理熱之劑

安腎丸 三因方 治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢躄羸瘦

胡蘆巴 補骨脂 川練子 茴香

續斷 各三兩 桃仁 杏仁 各去皮尖炒別研

山藥 茯苓 各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯服五十九

溫腎散 三因方 腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色並皆

治之

州溪心法附錄

卷之四 腰痛



熟乾地黄 一斤洗焙

牛膝

菴蓉

五味子

各八兩 杜仲 三兩

甘草 炙

巴戟 各八兩

茯神

乾姜 各五兩 麥門冬 八兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

草薺丸

治腎損骨疼不能起床腰背腿皆痛

草薺

杜仲 炒去絲 菴蓉 酒浸

兔絲子 酒浸

右等分為細末酒煮猪腰子搗爛為丸如梧桐子大每服五

十九至七十九空心溫酒下

無敵丸

治腰疼腎虛

川草薺

虎骨 酥炙

續斷 酒浸一宿各二兩

川山甲 半兩 酥炙

乳香 五斤

沒藥 二斤半

茴香

狗脊

當歸 酒浸

砂仁 炒

鹿茸 各一兩 酥炙

杜仲 二兩 炒去絲

地龍 去土七錢半

青鹽 去十七斤半

兔絲子 四兩 酒浸一宿為末

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九空心鹽酒下

補髓丹

百一選方 升隆水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛

沒藥 兩別研 杜仲 去皮炒十兩 鹿茸 二兩 煉去皮酒炙

補骨脂 十兩 用芝麻五兩 同炒切芝麻黑色無聲為度 篩

去芝麻不用

右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉

三十箇湯泡去皮杵為膏入麪少許酒煮糊丸如梧桐子大

每服一百丸溫酒鹽湯任下

二至丸 濟生方 治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

丹溪心法付余

辰六兩 目要卷七

一



鹿角

麋角

勝各二

附子泡子皮脰一兩

桂心不見火補骨脂炒

杜仲去皮炒斷絲

鹿茸酒蒸焙各一兩

青鹽別研五升

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心嚼胡桃肉塩酒湯任下惡執藥者去附子加肉蓯蓉一兩

○廣按腰痛之証多因腎臟真陰衰虛或外風寒之鬱遏或內溫執之流注以致禁衛不通故作痛也然腎臟不虛則外邪不能襲內邪不能占禁衛周流何痛之有哉已上六方治腰痛乃散邪兼補虛之藥也

○已上諸方散相補虛之劑

丹溪心法

其弊重腰冷如水飲食如故腰重如物在腰治宜

流濕兼用溫暖之藥以散之

附諸方

腎著湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮

茯苓各四兩

甘草炙

白朮各二兩

右咬咀每服五錢水煎空心服

滲濕湯 治寒濕所傷身重若如水中小便澀大便溏

蒼朮

白朮

甘草

茯苓

乾姜炮各一兩半

橘紅二升半丁香二升半

右咬咀每服四錢水二盞束一枚姜三片煎食前溫服

勝濕湯 治坐卧濕地或雨露所衣身重脚弱關節疼痛

發熱惡寒或多汗惡風小便不利大便泄瀉

白朮二兩

人參

乾姜炮

白芍藥



附子炮去皮臍

白茯苓

桂枝不見火

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢 水二盞半 姜五片 棗一枚 煎八分 溫服

疝痛

八十一

陰水脊偏墜

脊囊溫瘡

丹溪心法

○疝痛 濕熱痰積流下作病 大槩因寒鬱而作 即是痰飲食積 并死血 專主肝經與腎經絕無相干 大不宜下 痛甚者不 宜參朮 癩溫多 疝氣宜灸 大敦穴在足大指爪甲後一韭 葉聚毛間是穴 食積與死血成疝者 梔子 桃仁 山查 枳子 一 作枳實 吳茱萸 並妙 以生姜汁順流水煎湯調服 一方加茴香 附子 却有水氣而腫痛者 又有挾虛者 當用參朮為君 佐 以疎導之藥 其脈沉緊 豁大者是 按之不定者 屬虛 必用桂

枝 山梔 炒烏頭 細切炒 右為末 姜汁糊丸 每服三四十九 姜湯 下大能劫痛

戴云 疝本屬厥陰肝之一經 余常見俗說 小腸膀胱下部氣 者皆妄言也

入方 治諸疝定痛速効

枳實

五片 一作檇核

山枝炒

山查炒

吳茱萸 炒或等分

濕勝加荔枝核 炮

右為末 酒糊丸服 或為末 生姜水煎服 或長流水調下

錢空心

守效丸 治癩之要藥 不痛者

蒼朮

南星

白芷散水

山查各一兩

川芎

枳核 又云枳實炒

半夏各半兩

疝痛



秋冬加吳茱萸衣鉢有山梔

石為末神麩糊丸服 又云有熱加山梔一兩 堅硬加朴  
硝半兩 又或加青皮荔枝核

又方 治諸疝發時服

海石

香附

右為末生姜汁調下亦心痛

又方 治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹連毛際間  
痛不可忍者

山梔

桃仁

枳子俱炒

山查

右各等分研入姜汁用順流水盪起同煎熱服  
一方加吳茱萸

橘核散

橘核

桃仁

梔子

川芎細切炒

吳茱萸

右研前服 橘核散單止痛此蓋濕熱因寒鬱而發用梔子  
仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱况二藥皆下焦之藥而烏頭  
又為枝子所引其性急速不容胃中留也

又方 治疝劫藥

用烏頭細切炒梔子仁炒等分為末或加或減白湯丸服

枇杷葉

野紫蘇葉

椒葉

蒼耳葉

水晶葡萄葉

右以水煎盡洗

醫氣方

日溪心法卷餘



茴香

破故紙

吳茱萸鹽炒各五錢

胡蘆巴七錢半

木香三錢半

右為末羅蔔搗汁丸鹽湯下

積疝方

山查炒一两茴香炒

柴胡炒二錢牡丹皮一錢

右為末酒糊丸如梧子大服五六十丸鹽湯下

疝病黃病久者皆好倒倉

又方 治疝痛

山查炒四兩枳核炒

茴香炒

山梔炒各二兩

柴胡

牡丹皮

桃仁炒各兩八角茴香炒一兩

吳茱萸炒半兩

右為末酒糊丸梧子大服五十九空鹽湯下

又方 治疝作痛

蒼朮

香附俱鹽炒黃柏酒炒已上為君

青皮

玄胡索

益智

桃仁已上為臣

茴香炒

附子鹽製炒甘草已上為使

右為末作湯服後一痛過更不再作矣

又方 治癩疝

南星

山查

蒼朮各二兩白芷

半夏製

枳核

神麩各一两海藻半兩

昆布半兩

玄明粉

吳茱萸各二錢

右為末酒糊丸

一入疝痛作腹內塊痛止疝痛止塊痛作

三稜

義木醋煮

炒麩

姜黃



南星各一兩 山查二兩 木香 沉香

香附各三兩 黃連 川芎 薑 炮去 萊 萸 用五錢 坤

蘿蔔子 桃仁 山梔 枳核 炒各半兩

右為末 姜汁浸蒸餅為丸

○予常治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦穴適有摩腰膏  
內用烏附丁香射香將與摩其囊上橫骨端火溫帛以覆之痛  
即止一宿腫亦消 予舊有柑橘積後因山行飢甚遇橘寺食  
之橘動積積等復滯氣即時右丸腫大寒熱先服調胃劑一二  
貼次早注神思氣至下焦噓逆奔積動吐復吐後和胃氣疎通  
經絡而愈 摩腰膏見腰痛

附脉理

脉訣舉要曰心脉弦急積聚在裏者生弱急者死沉遲浮

瀉疝瘕寒痛痛甚則伏或細或動

附諸方

立效散 本事方治疝氣

川芎 川練子 青皮 去白 舶上茴香

黑牽牛 炒 桃仁 各一兩

右為末 每服二錢 無灰酒一盞 煎七分 溫服

失笑散 治小腸氣痛及婦人血氣痛欲死者

五靈脂 蒲黃 炒各等分

右為末 每服二錢 先用醋一合 熬藥成膏水一盞 煎服

茴香練實丸 按粹方治男子七疝痛不可忍 婦人癭聚帶下 皆

任脉所主 陰經也 乃肝腎受病 治法同歸於一

川練子 炒 茴香 山茱萸 食茱萸



吳茱萸湯洗青橘皮去白馬蘭花醋炒荒芫

陳橘皮各一兩

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒送下食前量入虛實加減丸數以利為度

金鈴丸 本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香炒

馬蘭花炒

海蛤

破故紙

海帶

鬼絲子各兩金鈴子肉五兩

木香

丁香各一兩

右為末麩糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒鹽湯下

烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香

良姜炒

青皮去白

枳榔各五錢川練子十箇

巴豆 七十箇打破同麩炒川練子黑色去麩巴豆只用川練

右為末每服一錢溫酒調下痛者炒生薑熱酒服

一方 治小腸氣痛不可忍者

烏藥搥碎姜酒浸一宿 高良姜

茴香舶上者煑各一兩 青皮去白二兩

右為末每服二錢遇發時熱酒調下

青木香丸 治腎冷疝氣脹疼

用吳茱萸一兩分作二分酒醋浸一宿焙乾香附子一兩每

澄茄青木香各半兩為末米糊為丸如梧桐子大每服七十

丸空心鹽湯下或乳香葱白湯亦可

一方 治疝氣發作痛不可忍者

真料五苓散 貼連根葱白一寸燈心七葉煎下



青木香九五十粒即效 五苓散見中暑

玄胡索散 治小腸氣痛

用玄胡索鹽炒乾姜等分為細末空心鹽酒調下

川練子散 治小腸氣痛

木香不見火煎香鹽炒黃去鹽

川練子用巴豆十粒碎同川練炒黃色去巴豆各一兩

右為末每服二錢溫酒寗食前調服

一方 治遠年近日疝氣

吳茱萸 八角茴香 小茴香 練子

花椒各一兩 青鹽半兩

右為細末以連根葱頭入酒同藥搗成餅晒乾糯米半升同藥餅用文武火炒黃色研為末酒糊為丸如梧桐子大每服

一百丸空心溫酒鹽湯任下忌發氣之物

一方 治小腸氣臍腹攪疼陰中痛悶不省人事

用茴香鹽炒枳殼各一兩沒藥半兩為末每服二錢酒調

下日三服

四神牛直指方 治腎冷疝氣脹不已

吳茱萸揀淨一半用老酒浸一半用米醋浸各浸宿焙乾

萆澄茄 青木香各半兩 大香附子淨一兩

右為末米糊丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯吞下或

乳香葱白煎湯下

一方

公猪腰子一箇去筋膜 玄胡索 黑牽牛各半兩為末

右將猪腰子切作二片入藥末在內濕紙裹煨熟 焦空心



鹽酒連藥嚼下必瀉下惡物忌食生冷  
一方 治疝氣腫墜疼痛

用猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川練子各等分  
填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食猪脬以酒下之將  
內藥晒乾或焙乾碾為末酒糊為丸如梧子大每服五六十  
丸空心溫酒或鹽湯下

○已上諸方辛溫散氣之劑

大烏頭桂枝湯三因方治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁身軀  
拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭五箇實者去皮尖蜜一大匙煎減半出湯洗勿

芍藥 桂心各三錢甘草炙二錢半

右咬咀每服四錢水盪半棗五片棗三枚人煎煎烏頭蜜半

押同煎七分食前服一方去烏頭用附子一個名蜜附湯

葱白散三因方治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛及婦人產  
後血氣刺痛皆宜服之

川芎 當歸 枳殼去白麩炒 厚朴姜製

木香 官桂去皮 青皮 乾姜炮

茴香炒 人參 川練炒 茯苓

麥芽炒 三稜炮 蓬朮醋浸一宿焙

乾地黄 神麴 芍藥各一两

右咬咀每服三錢水一盞葱白二寸煎七分去粗入鹽少許  
空心抗服大便秘澀加大黃溼利加訶子

聚香飲子濟生方治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

檀香 木香 乳香



丁香 煎不見火 養香各一兩 玄胡索 片

川烏炮去皮 桔梗去蘆炒 桂心不見火 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水薑半姜五片棗一枚煎七分去粗溫服

益智仁湯 濟生方治疝氣痛連小腹呼呌不已診其脉沉緊是

腎氣精冷所致

益智仁 乾姜炮

甘草炙

茴香炒各二錢

烏頭炮去皮 生姜各半兩 青皮去白二錢

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心熱服

玄附湯 濟生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑澹泄

木香 不見火半升

玄胡索炒

附子炮去皮脐各一升

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分去渣溫服

狼毒丸 濟生方治七疝久而不愈發作無時脐腹堅硬刺痛

芫花 醋炒

狼毒 炒

川烏炮去皮脐各一兩

全蝎 去毒九

乾姜炮

椒紅炒

沒藥

熬甲 醋煮

乾漆炮烟盡各半兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服四十九空心姜湯溫酒任

下甚者以鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處

茱萸內消丸 和劑方治腎經虛弱膀胱為和氣所轉結成寒疝

陰囊偏墜痛引脐腹或生瘡瘍時出黃水

山茱萸 去核炒

桔梗 小浸一時焙乾

川烏炮去皮尖

茴香 舶上者取炒焙乾用

白茯苓 炒去刺青皮去白

吳茱萸 湯泡七次焙乾

肉桂 去皮各二兩

大腹皮 酒洗焙

五味子 搗碎

海藻 洗焙

玄胡索 各二兩半

丹溪心法附錄

八疾全病目

卷之六



木香 一两半 川練子 炒二兩 桃仁 去皮前煨炒  
枳實 煨熟炒 陳皮 去白各一两 食茱萸 二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九粒空心溫酒下

葫蘆巴丸 和劑方 治大人小兒小腸膀胱氣奔豚氣疝氣偏墜

陰腫小腹痛形如卵上下走痛不可忍

葫蘆巴 些斤 茴香 去土炒十二兩

吳茱萸 湯洗七次炒十兩 川練子 炒一斤二兩

大巴戟 去心炒用 川烏 炮去皮尖各六兩

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十五粒空心溫酒下

小兒五九前香湯吞下一方加黑牽牛

丁香練貫丸 按粹方治男子七疝痛不可忍婦人癭聚帶下背

任脉所主陰經也乃腎肝受病治法同歸干一

當歸 去芦剉 附子 炮制去皮脂 川練子

前香 炒

右四味各一两剉碎以好酒三升同煮酒盡為度焙作細末  
每服藥末一两再令項藥

丁香 木香 各二錢 全蝎 十三箇 玄胡索 二兩

右四味同為細末入前項藥末內拌和酒糊為丸如梧桐子

大每服二十九粒至百粒空心溫酒送下

神砂 一粒升宣明方治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子 一兩炮 鬱金 橘紅 並等附子 停用

右為末醋麩糊丸如酸棗大以朱砂為衣每服一九男子酒

下婦人醋湯下服羅又服神聖代針散

神聖代針散

升 卷之六十一



乳香

沒藥

當歸

香白芷

川芎各半兩元青一兩去足翅即青紅外子

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞火摻藥末在茶上不得吹攪立地細細急呷之心驚欲死者小腸氣搖得如角弓膀胱腫硬一切氣刺震痛并婦人血癖血迷血暈血刺衝心胎木不下難產但一切痛疾服之大有神效只是要詳疾証用藥

十補丸百一選方治小腸疝痛膀胱伏染奔豚痰氣等症

附子一兩用防風一兩剉如黑豆大鹽四兩黑豆一合炒

附子裂去諸藥用附子去皮尖

葫蘆巴

木香

巴戟去心

川練子炮取肉

官桂去皮

延胡索

萹蓄去葉

舶上茴香炒

破故紙炒各一兩

右為末用糯粉酒打糊丸如梧桐子大辰砂為衣每服五十丸空心酒下婦人醋湯下若加益智子亦可

○已上諸方辛熱消積之劑

○廣按疝痛之症其人平素外因風濕轉入經絡或是內因怒氣衝上小腹以致榮衛欠順血液稽留日新月盛積聚牢堅每遇風寒之氣外鬱或是五志之火內起則小腹作痛下連陰股或是小腸作痛上連脇肋甚則搖如角弓咬牙戰掉冷汗交流瀆更不救古方以為小腸氣膀胱氣腎經寒氣用辛溫之藥以散氣則是治其標也丹溪以為痰飲食積死血流注歸於厥陰肝之一經用辛平之藥破血則是治其本也夫疝証痛有定處是以形之積也非痰飲



與食積死血相聚而何哉若是无形之氣作痛則走注於  
滿腹而流散於徧身矣

○木腎偏墜 新增

附諸方

入方 治木腎

楮樹葉 又云楊樹雄者晒乾為末酒糊丸如梧桐子大空  
心鹽湯下五十九

又方 治木腎不痛

枸杞子

南星

半夏

黃柏酒炒

蒼朮 鹽炒

山查

白芷

神麩炒

滑石炒

昆布

吳茱萸

右為末酒糊丸梧子大空心鹽湯下七十九

治小腸氣及木腎偏墜

黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各

一碗於砂鍋內煮乾為度取去黑牽牛用青紅娘子十九

箇於鉄鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛碾取頭末四兩另

入猪苓澤瀉細末各二兩醋糊丸如梧桐子大每服三十

丸空心鹽酒送下不可多服如多服令人頭眩可服黑錫丹

奪命丹和劑方遠年近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜腫硬

陰間濕痒扒成瘡癬

吳茱萸 一斤酒浸四兩醋浸四兩場浸四兩童便浸四兩

各浸一宿用火焙乾

澤瀉去灰土二兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五十九温酒鹽湯任下



金鈴子丸 澹寮方治鈞腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子 五兩剉作五分製 一分用班貓一箇去足翅同

炒去班貓 一分用茴香三錢鹽半錢炒熱去鹽

留茴香入藥 一分用黑牽牛三錢同炒去牽牛

一分用破故紙三錢同炒留故紙為藥 一分用

蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子

右將練子去核同破故紙炒香燒為末酒糊丸如梧桐子每  
服三十九丸溫酒空心下

金鈴丸 本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

方見前

三菜丸 百一選方治小腸氣外腎腫疼

山菜更 吳菜更 食菜更 各二兩黑牽牛炒一兩

破故紙炒一兩七錢

青鹽

青皮

茴香炒各三分

川練子一兩用班貓十四箇去

翅皆同炒赤色去班貓不用

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子每服三五丸先喫炒桃  
仁十五箇以溫酒或鹽湯下藥或炒茴香酒亦可空心食前服  
一方 治外腎大如升斗

茴香

青皮

荔枝核

搥碎

右各等分炒出火毒為末每服二錢宿心酒調下

一方 治陰疝或偏墜大小子痛欲死者

木鱉子一斤取肉炙醋磨芙蓉葉末 黃栢皮末

右將木鱉子同醋調二藥末敷核上痛即止

腎囊溫瘡



蜜陀僧

乾姜

滑石

右為末擦上

又方 先用茱萸煎湯洗

吳茱萸半兩 寒水石三錢 黃栢二錢 樟腦

蛇床子半兩 輕粉十蒸 硫黃二錢 白礬

煨柳 白芷各二錢

右為末麻油調搽

又方 治腎上風濕瘡及兩眼

全蝎 煨柳 蛇床子 硫黃各一錢

右四味研如細末用麻油調入手心搽執或三口用手抱囊

一頃次搽藥兩腿上

脚氣八十二

附足跛痛

脚轉筋

丹溪心法

○脚氣須用升提之藥提起其濕隨氣 血用藥有脚氣衝心

者宜四物湯加炒黃栢再宜湧泉穴用附子末津唾調傳上以

艾灸泄引熱下

入方

防已飲

白朮

木通

防已

煨柳

川芎

甘草稍

犀角

蒼朮 鹽炒

黃栢

生干 各酒炒

大便實加桃仁小便澁加杜牛膝有執加黃芩黃連大熱  
及時令執加石膏有痰加竹瀝姜汁如常腫者專主乎濕

執先生別有方

# 脚氣



升溪竹食  
又方 治濕熱食積痰流注

一芥菜

黃柏

防己

南星

川芎

白芷

犀角

換柳

血虛加牛膝皂菝

右為末酒糊丸服肥人加痰藥

健步丸

生芋 半兩

歸尾

芍藥

陳皮

蒼朮各一兩 吳茱萸

條芩各半兩 牛膝一兩

桂枝二錢

大腹子二箇

右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心前白木木通湯下

又方 一婦人足脛腫

紅花

牛膝俱酒洗 生芋

黃柏

治淋

南星

草龍胆

川芎

有筋動於足大指上至大腿近腰結了因奉養厚遇風寒宜

四物湯加酒茶紅花蒼朮南星姜煎服

濕痰脚氣大便滑泄

蒼朮二兩

防風一兩

換柳六錢

香附八錢

川芎六錢

條芩四錢

滑石一兩二錢

甘草三錢

右為末或丸或散皆可服

脚軟筋痛

牛膝二兩

白芍一兩半 龜板酒炙

栝板酒炒一兩

知母炒

甘草半兩

右為末酒糊為丸

應痛丸 治脚氣痛不可忍此藥為劫劑



丹溪心法 卷之五 疔毒 十七  
赤芍藥 半兩 煨去皮 草烏 半兩 煨去皮 尖

右為末 酒糊丸 梧子 大空心服 十九 白湯下  
又方 治脚氣腫痛

芥子 白芷 等分

右為末 姜汁和敷貼 或用仙木 羌活 獨活 白芷 細辛 為末 入帛內作襪用

又方 燂洗脚氣

威靈仙 防風 荆芥 地骨皮

當歸 升麻 朔藿

右煎湯 燂洗

附脉理

訣要曰 脚氣之脉 其狀有四 浮弦為風 濡弱為濕 氣逆瀦

因寒 濕致熱 鬱風 汗濕 濕熱 下寒 屢

脚氣治例

心法附錄曰 脚氣有濕熱 有食積 流注 有風濕 有寒濕 勝濕以仙術 白朮 防己 川芎 為主 或六物 附子 湯 或當歸 拈痛 湯

脚氣七鬱 甚者 舟車 丸 除濕 丹 有飲者 東垣 開結 導飲 丸

脚氣解表 用麻黃 左經 湯 等藥 隨經 選用 有蕪痰 氣寒 濕者

五積散 加木瓜

若雙解 以 大黃 左經 湯 東垣 羌活 道滯 湯

若理血 以 八味 丸 或 四物 加 羌活 天麻 又 或 四物 加 黃柏 南

星 豆 健步 丸

若踈風 養血 用 獨活 寄生 湯 最效

春夏氣溢 腫而痛者 用 香蘇 散 加 五味 皮 木瓜 楨柳 川練子



熱而紅腫者敗毒散加木瓜蒼朮  
秋冬以後用五積散加木瓜牛膝枳椇吳茱萸

附註

麻黃左經湯三因方治風寒暑濕流注足太陽經腰足挛痺關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛眩暈

麻黃去節

乾葛

細辛

白朮米泔浸

茯苓

防已

桂心不見火  
羌活

甘草炙

防風各等分

右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎空心服自汗去麻黃加肉桂芍藥重者加白朮陳皮無汗減桂加杏仁澤瀉並加等分

半夏左經湯三因方治足小腸經為風寒暑濕流注發熱腰脇

疼痛頭目眩暈嘔吐不食

半夏湯洗七

乾姜

細辛

白朮

麥門冬去心

柴胡

茯苓

桂心不見火

防風

乾姜炮

黃芩

小草

甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心服熱悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

大黃左經湯三因方治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫

痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛去苗

茯苓

羌活

大黃蒸

甘草炙

前胡

枳殼去穰炒  
厚朴去皮炒

黃芩

杏仁去皮尖別研各等分



右吹咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心熱服  
腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小便澀少加  
澤瀉四肢瘡瘍浸淫加升麻並等分

大料神秘左經湯三因方治風寒暑濕流注三陽經腰足拘攣  
大小便秘泄瀉喘滿煩悶並皆治之

半夏湯洗七次乾芎

細辛

麻黃去節

麥門冬去心小草細遠志白姜

厚朴姜製炒

茯苓

防己 枳殼去穢炒甘草

桂心

羌活

防風

柴胡

黃芩各等分

右吹咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎服自汗加牡蠣  
白朮去麻黃黃腫加澤瀉不通熱甚無汗減桂加橘皮煎胡

亦麻腹痛或利去黃芩加芍藥附子大便秘加大黃竹瀝喘  
滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之

六物附子湯三因方治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢  
拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子皴去皮桂心

防己各四兩甘草炙二兩

白朮三兩

茯苓三兩

右吹咀每服四錢水一盞姜七片煎六分食前溫服

換眼丸和濟方治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘發為牽痺

緩弱上攻胷脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱幸

薏苡仁

南星炮

石楠葉

石斛去根

楨榔

葶藶炙

川牛膝去苗酒浸

羌活去芦

去芦各一兩

木瓜四兩



丹溪心法附餘 卷之四 脚氣十七 十五

黃芪去芦蜜炙當歸去芦酒浸天麻去苗續斷各一两

右為末酒麪糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒益湯任下

一方加大附子肉桂蒼朮各一两

已上諸方治各症邪氣之劑

香蘇散和劑方治風濕脚痛疎通氣道

加檳榔木瓜名檳蘇散方見傷寒

右咬咀每服四錢水一盞姜葱煎服

活血應痛丸和劑方治風濕客於腎經血脉凝滯脚重疼痛項

背拘挛不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊去毛蒼朮泔浸一宿去皮六斤沒藥十兩另研

草烏頭一斤半香附子去毛炒七斤半陳皮去白五斤

右為末酒糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒熟水任下

活絡丹和劑方治諸般風邪濕毒之氣停滯經絡流注脚間筋

脉挛拳腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心腹一切

痛風走注

川烏炮去皮脐六兩沒藥研乳香研各二兩二錢

草烏炮去皮地龍去土南星炮各六兩

右為末入研藥和勻酒糊丸如梧桐子大每服二十九空心

酒下荆芥湯下亦可

經進地仙丹和劑方治腎氣虛備風濕流注脚膝酸疼行步無力

川椒去目及開口者微炒出汗四兩兔絲子酒浸

覆盆子酪二白朮一两白附子羌活

防風去芦各二兩人參一两半烏藥二兩

川烏炮一两附子炮四兩茯苓一两地龍去土三兩

丹溪心法附餘 醫經綱目脚氣十七 十六



赤小豆 骨碎補去毛各二兩 甘草一兩

木鱉子去殼三兩 蔓藤二兩 狗脊去毛一兩

茯苓酒浸焙四兩 牛膝去酒浸

南星湯洗姜製各二兩 黃芪二兩半 何首烏二兩

右為末酒糊丸如梧子大每服四十九空心溫酒下

加減地仙丹劑生方治風冷和濕留滯下焦足膝拘攣痛

地龍炒去土五靈脂去石烏藥 白膠香別研

五加皮 椒紅炒出汗 威靈仙 木瓜去穢

赤小豆炒 川烏炮 黑豆炒去皮天仙藤

蒼朮米泔浸去皮炒 木鱉子去殼油各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服七十九空心鹽湯鹽酒任下

不老地仙丹直指方治腎臟風毒輕脚壯筋

菴蓉用酒浸當歸酒浸焙虎骨酒炙 牛膝酒浸焙各一兩

赤小豆半兩 蒺藜炒搗去刺 川椒清炒 川芎各一兩

草薢鹽水煮乾一兩 血竭半兩 白南星炮

白附子炮 何首烏 黃芪蜜炙各七錢

防風半兩 杜仲姜制 羌活 沒藥別研

獨活各七錢半 木鱉子去油 地龍去土 茴香炒

乳香別研各半兩

右為末酒糊丸如梧子大每服四十九木瓜陳皮湯下

神翁地仙丹方集成專治風痺脚氣

天仙子一兩 川椒一兩去日并閉口者 木鱉子四兩

赤土九兩即工硃 白膠香五兩煮過 別研 黑豆六兩 黑牽牛六兩 五靈脂三兩陳黑色好者 用好



醋浸投水淘去絹濾過曬乾

草烏七兩小而堅實者為用鹽在油中炒冷色焦黃

拆裂候冷以紙布頻皆令淨

右為末同入白膠香木鱉子末隔年好醋打麪糊杵千百下

丸如梧桐子大每服三十九茶清下病甚類服

加減至寶丹唐陵歐陽康叔家傳方專治脚氣止疼痛除風濕

石膏火煨三十沸三兩 當歸酒浸二兩

骨碎補四兩去皮毛炒淨三五次 槲柳二兩

月寶砂五兩醋煑乾 白蒺藜炒赤去皮尖刺三兩

木瓜生用二兩紫金皮去骨生用二兩

淮烏頭三箇起一兩者炒赤一兩

白膠香二兩淨水煮數十沸冷水中乾

右為末蜜丸如彈子大每服一丸嚼生姜一塊空心以好酒

一盞送下多以酒助藥力服後一時久用外應散薰蒸淋洗

一方除紫金皮木瓜加防風小黑豆一方加赤芍藥一方除

紫金皮石膏加白朮木香川烏

透骨丹康叔家傳方專治脚色

川烏一兩煨羌活 白茯苓二兩乳香別研

槲柳 木瓜 川芎各一兩木香一兩半

沉香一兩

右為末麪糊丸如梧子大每服六十九姜湯下

黑虎丹康叔家傳方治脚氣筋骨軟弱步履不隨

白朮 五加皮 杜各半兩槲柳一兩

黑豆半升 附子 川烏 黃芩



丹溪心法附余 因至氣自出 九

白茯苓 赤芍藥各兩 熟地黃 烏藥各一兩

生蒼朮 杜仲 當歸 川牛膝

虎胫骨 白蒺藜各一兩半 羌活半兩

右為末 麩糊丸如梧桐子大 每服五十丸 空心鹽酒下

已上數方治風濕之劑

摺風散 康叔家傳方 專治寒濕脚氣 先以此發散

麻黃 不去節 甘草 不去皮 淮烏 川草薢

杏仁各等分

右咬咀 每服四錢水一盞 煎服不可多進

五積散 和劑治寒濕流注 兩脚酸疼 有蕪痰氣者 用之尤宜 內

加木瓜方見中寒

搜風散 康叔家傳方 治寒脚氣 愈後可常服之

白芷 川芎 茯苓 甘草

芍藥 當歸各一兩半 陳皮 厚朴

枳殼 白木 乾姜炮 麻黃 去根節各二兩

桔梗 兩半 蒼朮 十二兩 酒浸去皮 肉桂 一兩

右咬咀 每服五錢水一盞 姜四片煎服 此方即五積散去

半夏加白木是也

導氣湯 仁存方 治寒濕脚氣 赤腫疼痛 心腹膨脹 頭目手足浮

腫身 躄腰背疼痛 並皆治之

羌活 獨活 木瓜 薏以仁

青皮 陳皮 桑白皮 大腹皮

枳殼 枳櫛 茵木香 紫藤

甘草 大腹子 通 赤茯苓 各等分



右吹咀每一兩水二盞煎至盡通口服 熱加大黃寒加

杏仁

沉香大腹皮散御藥院治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫痛疼痛

筋脉不利

大腹子連皮二兩

沉香 桑白皮炒

栝柳 茴香炒 白茯苓去皮木通

荆芥穗 紫蘇子炒 蘇葉各一兩

乾木瓜去穢 麩炒 一兩半 枳殼去穢 麩炒 一兩半

甘草炒 陳皮去白 烏藥各一兩

右吹咀每服五錢水一盞姜五片乾蘿蔔五大片同煎七分

溫服如無蘿蔔用蘿蔔一錢微炒搗碎同煎如竟大腸乾燥即服

加威神功丸

集黃丸 三因丸 治脚氣入臑 七中不仁喘急欲死

吳茱萸易洗七次 木瓜去穢切片日乾各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九至百丸酒飲任下或

以木瓜另蒸爛研膏為丸炒

勝駿丸 三因方治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足牽拳脚面

連脂走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子一个炮去皮脐 當歸酒浸一天麻

牛膝並酒浸各二兩 木香一兩 酸棗仁炒

熟地黃酒浸防風去芦各三兩 木瓜四兩

羌活一兩 乳香畔兩另射香二錢半另研

全蝎去毒 交藥另研 草炙各一兩

右為末用生地黃二斤酒爛入無灰酒四升煮爛如膏



以前藥和勻杵令堅每作十九每服一丸細嚼臨睡酒下  
如冬月無地黃煉蜜丸如梧桐子每服二十九鹽湯溫酒任  
下 一方加換榔華薛萆蓉破故紙巴戟各一两當歸地黃  
各減一两

葫蘆芭丸楊氏家藏方治一切寒濕脚氣脚膝疼痛行步無力

葫蘆芭酒浸一宿焙乾 破故紙炒香各四兩

右為末用大木瓜一枚切頂去穢置藥在內以滿為度復用  
頂蓋之以竹簽七定蒸孰爛研同前餘藥末和為丸如梧桐  
子每服五十九空心溫酒下

赴痛散楊氏家藏方治濕氣攻注腰脚疼痛行步少力

杜仲 煨斷絲一两半 肉桂去皮 延胡索

華辭 沒藥 當歸酒洗焙各二兩

一方為末用三錢空心溫酒送下  
一方 治濕脚氣溫隱居歌括

濕氣同流髀膝疼 香蘇散煮忍冬藤

木香芍藥仍增入 功效如神喚得仙

東垣開鬱導飲丸 治食積痰流注

白朮 陳皮 澤瀉 茯苓

神麩炒 麥蘖 半夏各一两 枳實炒

巴豆霜各一錢半 青皮 乾生姜各半兩

右為末湯浸蒸餅丸如梧子大每服五十九或六七十丸溫  
水送下

已上諸方治寒濕之劑

當歸拈痛湯 按粹方治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸不利



及遍身疼痛下症于足腫痛不可忍

羌活

甘草

黃芩酒浸

茵陳酒炒各五錢

人參去芦

升麻

苦參酒洗

葛根

蒼朮各二錢防風去芦當歸身

知母酒洗

茯苓炒

澤瀉

猪苓三錢

白朮半錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓空心溫服

舟車丸

治濕熱勝氣鬱甚者方見中濕

除濕丹

治濕熱勝氣鬱甚者方見濕熱

趨痛丸 御藥院方治脚氣毒攻兩脚痛不可忍

白甘遂

白芥菜子炒大戟

白麩各三兩

右滴水捏作餅子瓦上焙令黃赤碎碾作末醋煮糊丸如藥

巨大冷酒下十丸利則止

又方 治下疳瘡脚腫痛行履難者

甘遂半兩

木鱉子四兩去皮

右為末猪腰子一箇去皮膜片切用藥四錢在心盞紙包定煨熱空心米飲送下量虛實加減服後便伸直兩脚如行下便利者只吃白粥二三日為妙

夢中神授方 醫方集成治脚氣神効

右用木鱉子每箇作兩邊麩炒炒畢切碎并炒用皮紙滲及油為度每一兩用厚桂一兩同為末熱酒調服以得醉為度蓋覆得汗即愈

治脚氣百一選方治脚氣上攻流注四肢結成腫核不散赤熱

掀痛及瘰一切腫毒

右用甘遂為末以水調便腫處却濃煎甘草湯服之其腫即



散二物本相及須兩人置各處安頓不可相和則不驗清沈  
中子韓誅苦此只一服病者十去七八再服而愈

已上諸方治濕熱之劑

栝榔湯濟生方治一切脚氣順氣防壅

栝榔 香附子去毛陳皮去白 紫蘇葉

木瓜去穢 五加皮 甘草 灸各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服婦人脚氣加

當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘加枳殼熱

者加大黃

烏葉平氣湯三因方治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱

苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神去木 甘草灸 白芷 當歸

白朮 川芎 五味子 紫蘇子

乾木瓜 人參 烏藥去木各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

大腹皮散濟生方治諸証脚氣腫痛小便不利

栝榔 荊芥穗 烏藥 陳皮

紫蘇子各兩 羅蔔子炒半兩 沉香不見火 桑白皮灸

枳殼去穢各一兩半 大腹皮 三兩 乾宣木瓜去穢二兩半

紫蘇子炒二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎不拘時

已上諸方理氣之劑

獨活寄生湯 治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或拳拳掣

痛不得屈伸或緩弱 行步無力見腰痛類

平痰心去什餘



八味丸 治足少陰胎氣入腹七張寒痛上氣喘急腎  
經虛寒所致也此証最急以腎乘心水尅火死不旋踵  
見補損

三因神應養真丹 治足厥陰經為四氣進襲左癱右瘓痰涎  
壅盛半身不遂手足頑麻語言蹇澀脚膝無力榮氣凝滯偏  
身疼痛

四物湯內加羌活天麻

右為末蜜丸鷄子大每丸木瓜兔絲子浸酒下

已上諸方理血之劑

加味敗毒散 治足三陽經受熱毒氣流注脚膝上焮赤腫痛寒  
熱如瘡白汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

桔梗

甘草

人參

茯苓

川芎

大黃

蒼朮等分

右吹咀每半兩入姜煎

東垣羌活導滯湯 治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛便溺

阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯

羌活

獨活各半兩防已

當歸各三錢

大黃酒浸煨一兩

枳實炒二錢

右吹咀每五錢或七錢水煎服

加減神功丸 御藥院方治三焦氣澁心腹痞悶六腑風熱大便

不通腰疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心腎煩燥睡

不安及治脚氣并素有風人大便結燥

訶梨勒

牽牛微炒

火麻仁另為如膏各四兩

川溪心土附餘

醫正綱目知氣十二

十切



右為細末入麻仁搗研勻煉蜜丸如梧桐子每服四十九溫水下溫酒米飲食後臨卧服如大便不通可倍丸數新為度牛膝散大全良方治脚氣浮腫心神煩悶及婦人月經不通

川牛膝 羚羊角

檳榔

大黃炒

芒硝各一兩防已

官桂

牡丹皮

赤芍藥

甘草各五錢 桃仁製五十粒

右吹吐每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食前服以下

惡物量強弱用

枳實大黃湯按粹方治脚氣腫痛

羌活一錢半當歸身一錢枳實

大黃各五錢

右劉都作一服水一盞半煎至八分去滓空心服下利一兩

熟地黃燒焙 陳皮去白

烏藥各四兩 黑牽牛炒三兩

杏仁去皮尖 牛膝酒浸

石楠藤葉 當歸酒浸

菴蓉酒浸 續斷

乾木瓜各二兩 赤芍藥二兩

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下

木瓜牛膝丸 三因方 治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫急痛

木瓜 大者三四箇切開蓋去穢先用糯米漿過盪焙乾為

末却將盪末入瓜內令滿仍用蓋釘定蒸二次爛研

川烏 大者去皮尖服无灰酒一升浸薄切以酒煮乾細研

為膏三兩

青皮

青盪別研

羌活

萹薢一方无 茴香焙

牛膝酒浸

狗脊炒去皮巴戟

海桐皮各一兩

右為末入青盪拌勻將前二膏搜和如硬身入酒杵數千下



丸如梧桐子每服五十九空心鹽酒下  
神烏丸濟生方治遠年近日乾濕脚氣

川烏炮去皮脐片炒令變色

虎胫骨酥炙

海桐皮 川萆薢各二兩

川牛膝去苗酒浸

肉蓯蓉酒浸各一兩半

金毛狗脊燎去皮毛半兩

右為末用木瓜膏為丸如梧桐子每服七十九空心溫酒下  
思仙續斷丸本方治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切風  
毒流注並皆治之

萆薢四兩 防風去芦 薏苡仁各三五加皮三兩

生地黄五兩 思仙木即杜仲剉炒絲斷五兩

川續斷 延活各三兩

黃燒焙陳皮去白 烏藥各四兩 黑牽牛炒三兩

杏仁去皮尖牛膝酒浸 石楠藤葉 當歸酒浸

夜蓉酒浸 續斷 乾木瓜各三兩 赤芍藥二兩

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下  
木瓜牛膝丸三因方治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫急疼

木瓜大者三四箇切開蓋去穢先用糯米漿過鹽焙乾為

末却將鹽末入瓜內令滿仍用蓋釘定蒸二次爛研

川烏大者去皮尖服无灰酒一升浸薄切以酒煮乾細研

為膏三兩 青皮 青鹽別研

羌活 萆薢一方无苗香焙 牛膝酒浸

狗脊炒去皮巴戟 海桐皮各一兩

右為末入青鹽拌勻將前二膏搜和如硬身入酒中數子



九如梧桐子每服五十九空心鹽酒如湯任下  
神烏丸濟生方治遠年近日乾濕脚氣

川烏炮去皮臍片炒令變色

虎胫骨酥炙

海桐皮 川萆薢各二兩

川牛膝去苗酒浸

肉蓯蓉酒浸各一兩半

金毛狗脊燎去皮毛半兩

右為末用木瓜膏為丸如梧桐子每服七十九空心溫酒下  
思仙續斷丸本事方治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切風  
毒流注並皆治之

萆薢四兩 防風去芦 薏苡各三 五加皮三兩

生地黄五兩 思仙木即杜仲剉 續斷各五兩

牛膝酒浸 川續斷 遠活各三兩

右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半斤去皮子以鹽酒煮朱

瓜成膏梧丸如梧子大每服七十九空心鹽酒鹽湯任下

十全丹三因方治脚氣上攻心腹足心隱痛小腹不仁關節牽

痺疼痛無時煩渴引飲大小便或秘或利

石斛酒浸 狗脊燎去毛 萆薢各一兩 菴蓉酒浸一兩

熟地黄二兩 牛膝酒浸兩 地仙子一兩 茯苓一兩

遠志去心炒一兩 杜仲去皮炒二兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸溫酒鹽湯任下

外應散康叔家傳方治脚氣用此薰蒸淋洗

石楠葉 矮樟葉 杉片 藿香

紫金皮 棠本 獨活 大黃



白芷

紫蘇

羌活

右剉碎加大椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內  
令病者以足加其上用厚衣蓋覆熏蒸痛處候溫可下手時  
却令使人淋洗

五枝湯聖惠方洗脚氣

右用桃柳楮桑槐五件枝條煎湯洗脚消腫佳  
痛先喫酒三  
五盃

一方

用無名異末化牛皮膠調勻貼痛處

一方

赤子七粒去殼研爛同蘇合香丸和勻貼脚心其痛即止



