

許校官助教 李巖

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十八

諸瘧門

足厥陰肝瘧

明 周王朱楠撰



夫經謂是厥陰肝瘧在經則令人腰疼小腹滿小便不利如瘧狀非瘧也數便意欲恐懼氣不足腹中悒悒在藏則令人色蒼蒼然太息其狀若死者俱刺足厥陰蓋

欽定四庫全書

普濟方

一

足厥陰之脈循陰氣客之則小腹滿小便不利也肝為將軍之官智謀出焉故病則恐懼不足也蒼蒼者肝之色也宜察其經絡腑臟而治之治肝瘧顏色蒼蒼顫掉氣喘積年不瘥鼈甲丸等方主之

方

鼈甲丸 一名烏梅丸 出千金方 專治肝瘧色蒼蒼顫掉氣喘久不

瘥者如死或久熱勞微動如瘥

鼈甲 去羶爛 醋侵久 蜀漆葉 烏梅 取肉 炒 常山 知母

焙各一分 甘草 微炙 細辛 去葉 苦參 萹蒬 各半兩 香豉 一微炒

石膏 半兩 研

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九丸未發前米飲

下臨發再服

烏梅 出聖惠方 專治肝瘧久不瘥

烏梅 取肉 酒浸微炒 常山 剉各一兩 知母 犀角 鎊屑 丹砂 別研極細

龍骨 別研 升麻 豉 桂 去皮 甘草 剉微炒 桃仁 楊皮 浸去

仁麩炒過 虎頭骨 醋炙 鼈甲 去羶爛 炙黃一兩

右為極細末再同研勻鍊蜜和搜成劑于淨石臼中  
 搗至二三百杵然後作丸如梧桐子大每服二十九  
 空心温酒吞下晚食前再服

蜀漆丸 出聖 惠方 專治肝瘡顏色蒼蒼顫掉氣喘變成勞瘡

積年不差

蜀漆 取肉 微炒 烏梅 微炒 常山 剉各半兩 鼈甲 去裏爛 醋炙 石膏 研各

一 豉 合 甘草 剉微炒 知母 苦參 剉 麝香 細研 桃仁 浸

去皮共雙仁麩炒過各半兩

右為末同研令勻鍊蜜和搗二三百杵丸桐子大空  
 心温酒下二十九晚食前再服粥飲下亦得

知母湯 出聖 惠方 治肝瘡上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止飢

肉消瘦不下食

知母 地骨皮 升麻 各一兩 鼈甲 同前 犀角 鎊屑 人參

麥門冬 小柴胡 去苗 石膏 各一兩 甘草 生剉 虎頭

骨 酥炙過 一兩半

右麤搗篩每服四錢水一盞入香豉五十粒煎至六

分去滓温服不計時候

木香犀角丸 治肝瘡

木香 犀角鎊 羚羊角鎊 筭麻 甘草炙

元參堅者 猪苓去皮 檳榔各二 鼈甲酥 豉炒

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大温酒或米飲下三

十九分服體熱即去甘草檳榔加大黃五兩

烏梅飲 治肝瘡小便不利如瘕

烏梅取肉 山梔子各半 知母一兩 芍藥 木通判 生地

黃升麻各二分

右以咀如麻豆每服五錢水盞半煎至一盞去滓下

朴硝一錢食後未發前温分二服

大柴胡湯出旅舍 借要方 治瘧病寒熱嘔逆脈弦小緊間日頻

日發作無時及傷寒熱結在裏腹滿譫言煩渴大小

便澁并疾氣寒熱方

柴胡去苗 芍藥 黃苓各三 半夏二兩半 枳殼實

炒去穢 大黃二兩

右為散每服五錢水二盞半薑五片棗三個同煎至兩盞去滓帶熱頓服

半夏湯 出衛生家寶方 治瘧疾及暑毒消痰逐飲

半夏 湯泡七次 白茯苓 青皮 去白 陳皮 去白 枳殼 去穢炒 桔

梗 炒各一兩

右為到散每服三錢水一盞半生薑十片煎至七分溫服

手少陰心瘧 附論

夫經瘧者內經謂令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰是也蓋心為神舍邪不可干邪氣干之故煩心其欲清水者以心火內熱故也其反寒多不甚熱者內熱而外寒故也治宜通心經利邪熱則愈

方

甘草湯 出千金方 治心熱為瘧不止或止後熱不渴乍來乍

去令人煩心甚欲飲清水反寒多不甚熱者

甘草 一兩 蜀漆 三兩 常山 鼈甲 各四兩 石膏 五兩 香豉 一分

梔子 烏梅 各三枚 竹葉 切一升

右吹咀以水九升煮取三升分三服

柴胡括萸根湯 出衛生寶鑑方 治瘧而發渴者 方見本門發渴類

大黃丸 出聖惠方 治心瘧發歇不定

川大黃 半兩炙剉肉炒 常山 一分 香豉 四十粒 砒霜 研極細一分 鼈

甲 酥炙 麝香 一錢 硃砂 一分

右為末入後三味研令勻醋煮麩糊和丸如梧桐子每服食前用桃仁冷醋湯下二丸忌食熱物

熊膽丸 出聖惠方 治心瘧

砒霜 研半兩 丹砂 研 麝香 研 雄黃 研 熊膽 各二分

右以熊膽和丸如菜豆大發日空心冷水下二丸臨發時再服一丸皆以冷水噉或當日便止或大作乃差如欲吐即以煖水下之當吐出痰涎

麝香丸 出聖惠方 治心瘧

麝香 一分 金箔 三十片 黃丹 一分炒 硃砂 一分 砒霜 一分

右細研令勻用粳米飯和丸如梧桐子大男左女右

中指上節用緋帛裏繫一丸發前以冷醋湯下一丸  
忌食熱物

常山丸 出聖惠方 治心疼瘧

常山 別搗 治桃仁 取凍者去雙仁炒和皮搗各一兩 鉛丹 八錢 豉 細研

一合炒令可碎攤盡手捻念則搗

右研為末鍊蜜和再搗千杵九梧桐子大每服十五  
丸鷄鳴空心酒下欲發時再服十五丸其日不得梳  
洗發過方可飲食一方桃仁湯下

硃砂丸 出聖惠方 治心瘧

光明砂 半兩 常山 一兩 杏仁 十枚湯浸去皮尖雙仁炒微黃

右為末研入硃砂令勻鍊蜜和丸如梧桐子大未發  
前粥湯飲下十五丸欲發時再服

足太陰脾瘧 附論

夫足太陰之經脾之脈也脾經之瘧令人不樂好太息  
不嗜食多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃寒寒則腹中痛  
熱則腸中鳴鳴已汗出故謂之太陰瘧又名脾瘧

方

木香丸 治脾瘧

木香 附子

炮去皮 臍

大黃

剉炒

厚朴

去粗皮 薑汁炙

人參

各一兩

芍藥

桂

去粗皮

荆三稜

煨

獨活

去蘆頭

乾薑

炮

芎藭

羌活

去蘆

甘草

炙各半兩

陳皮

湯去白炒

檳榔

剉各二兩

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九未發溫水下日三一方以前藥十五味為末瓷器盛之密封臨服加牽牛末二分同藥末一兩同研勻鍊蜜為丸

如梧桐子大心脹腹滿一切風勞冷氣臍下刺痛口吐清水白沫醋心疼癖氣塊男子腎臟風毒攻刺四體及陽毒脚氣目昏頭痛心間嘔逆及兩脅堅滿不消卧時橘皮湯下三十九以利為度此後每夜二十九丸女人血利下血痛刺積年血塊胃口逆手足心煩熱不思飲食薑湯下三十九取利每夜更服二十九丸小兒五歲以上脾氣腸胃氣喘空心溫湯下五七丸小者減丸數服丸胸膈飽悶不消脾泄不止臨卧溫

酒下取利食毒癰疽發背山嵐瘴氣說覺頭痛背縛  
 拘緊便宜服之快利為度 常服此藥可以不染瘴  
 疾凡瘴氣皆因脾胃實熱所致常以涼藥解膈上壅  
 熱并以此藥通利稱善此丸水治嵐瘴及溫瘧大效  
 李敦裕以此方刻石于大庾嶺得效者不可勝數昔  
 人嘗有擁兵過瘴者軍人皆感瘧用此治之應時患  
 愈江南時值歲發溫瘧以此藥服之其效如神皆以  
 得快利為度又記凡久瘧服藥訖乃灸氣海百壯又

灸中脘三十壯尤善又加肉豆蔻六枚去根止瀉方  
 用青蒿湯治脾瘧寒熱善嘔多汗

治鬼瘧內藥鼻中立效方 出聖 惠方

天靈蓋 狗獠頭骨 臭香 細研 阿魏 乳香 藜

蘆 去蘆 頭 黃丹 各七 分 麝香 一錢 細研

右為末研令勻以醋煮麩糊和丸如豇豆大欲發前  
 先以綿裹一丸用納鼻中瘥

麝香丸 出聖 惠方 治鬼瘧發動無時節寒熱不定

麝香細研 硃砂細研各三分 砒霜細研 常山剉 鼈甲塗酥炙黃去裏

虎頭骨酥炙微黃 甘草生用 川大黃生用各半兩

右為末研入前三味令勻五月五日以粽子和丸如梧桐子大臨欲發時以温酒下三丸得吐瀉為度

輔正丸出聖濟總錄 治鬼瘧

天靈蓋酥炙 砒霜研 丹砂研 麝香研 虎頭骨酒炙 鉛丹

研 猢猻頭骨酒炙 萊豆粉各半兩

右為細末用粟米飯和丸如梧桐子大每服一九末

發前新汲水下或以手握之有孕婦不得食小兒只可半丸以萊豆湯下其藥以五月五日合面東搗之

虎睛丸出聖濟總錄 治鬼瘧

虎睛一對酒浸炙 丹砂研 麝香研 雄黃研 砒霜細研極 安

息香入胡桃仁和研 阿魏研 天靈蓋酥炙各三分

右為末用燒餅和丸如小豆大每服用一九末發前男左女右手把之一丸可療十人

丹雄丸出聖濟總錄 治鬼瘧

丹砂炒一錢 膩粉三錢 巴豆七粒去皮心膜去油 乳香研 麝香研  
 雄黃研 砒霜研各半錢

右為末水浸炊餅心為丸如梧桐子大每服一丸發前新汲水下

萬安丸出聖濟總錄 治鬼瘡

虎頭骨酒炙三兩 藜蘆六兩 雄黃研 鬼白 天雄炮粒去皮臍

蕪荑炒 皂莢酥炙去皮子各一兩

右除雄黃外為末入研者雄黃和勻鍊蜜丸如彈子

大令患者頭上戴一丸立瘥若除伏屍於房四角燒四粒疫氣於牀前燒一粒或甘草

右吹咀每服半兩水盞半薑五片棗二枚同煎至七分不拘時候寒多者加乾姜附子熱甚者止加柴胡瘡瘡加檳榔所加者各等分一方加人參一方熱多者加石膏

生熱飲子一名交加飲子出十便良方 治脾寒脾經受冷時發寒熱

及升降陽陰

治瘧疾辟瘴氣方見本門久瘧類

半夏散出鄉藥院方治足少陰瘧嘔吐

半夏湯洗去滑為末生薑汁和餅暴乾再為末

右同研勻每服二錢溫酒一盞調下未發頓服

知母丸 治瘧疾脾寒

知母 貝母 草薺仁 甘草 鼈甲酥炙 常山微黃

用淡豆豉一合米醋一升用煎乾不用豉細切常山

右等分為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸

當發日入麝香酒送下仍用後藥助氣

除桂建中湯

黃耆兩半 白芍藥一兩 甘草二錢半

右為末每服三錢水盞半生薑棗子入錫糖少許再

煎化空心服

常山丸出經郊濟世方治脾瘧由熱氣內傷不洩故脾瘧令人

病腸中熱痛外寒腸中轉鳴汗出治一切瘧疾

常山一兩 甘草半兩 知母一兩 豉一合 麝香一分 鼈細研

甲 一兩塗醋炙令黃色先去麩爛

右為末與麝香末和勻鍊蜜為丸如桐子大於未發前溫下二十九臨發再服已試極驗

人參飲 治脾瘧

人參 甘草 炙各一分 陳皮 湯浸去白焙半兩 烏梅 五枚去核焙 草

豆蔻 七枚去皮

右剉為末每服五錢用濕紙裹定熟水二盞生薑棗大拍碎棗二枚擘破甕器內煎一盞去滓未發前溫

服

檳榔湯 治脾瘧寒熱

檳榔 剉 青檳皮 湯浸去白焙 前胡 白朮 菝葜 各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分未發前去滓溫服

檣皮散 治脾瘧

陳檣皮 湯浸去白焙 常山 乾漆 炒出煙 桂皮 去粗皮三分 牡蠣 燒赤

一分

右為末散每服三錢未發前溫酒下三服必瘥  
硫黃丸 治脾瘡無問遠近

阿魏 研

安息香

入胡桃  
穰研

萊菔子

炒各  
三錢

蕪荑

炒研為  
細末用

三分

右為細末鍊蜜丸菉豆大每服二十九未發前溫水  
下得吐為瘥後作少蒜蘆下餽飪食之仍以白芥子  
用紗囊盛男左女右繫於背

常山丸 治脾熱為瘡或不渴熱氣內傷不瀉令人病

寒腹中痛腸中鳴汗出

常山

三兩

甘草

半兩

知母

鼈甲

各一兩

右為末蜜丸如桐子大未發前溫服十九臨發前時  
服一服正發一服

辰砂丸

出宣  
明論

治一切脾胃虛熱邪弱毒者

信砒

甘草

各一分

硃砂

二錢

大豆

四十  
九五

右為末滴水和丸分作四十九丸於發日日欲出時燈  
心湯下忌熱物

金鑑  
卷一百九十八

卷一百九十八

厚朴錫 治脾瘧不思食

厚朴

去粗皮生薑汁炙三兩

半夏

為末薑汁作焙乾汁作一兩

陳橘皮

湯洗去白

焙二兩

右麤搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破煎至七分去滓空心日午臨卧各一服能截脾寒五月五日修合用大蒜不拘多少搗爛次入樊紅拌勻為圓眼大每服一九大蒜湯送下

薑橘散

一名十棗湯出傳信通用方

治脾及諸瘧

用真橘皮不拘多少去白細切曝微乾以生薑自然汁浸過陳皮一指許銀器內重湯煮乾焙為末每服三錢用隔年清水棗十枚水一盞煎至半盞以此藥通口服以棗下之於發日先一時辰服之不過兩服而止後再一服不拘老少孕婦皆可用服

草菓平胃散

出危氏方

治脾虛作瘧不問寒熱先後飲食不

進以生料平胃散四兩加入草菓大腹皮檳榔青皮各二兩剉碎相和勻每服五錢水一盞半薑三片棗

錢  
四  
所  
生  
書

卷一百九十八

二枚煎七分空心多服取效

半夏散 治脾瘧 方見本門足陰腎瘧類

草菓飲 治脾寒

草菓 常山 檳榔 甘草 少許 黑豆 各等分

右咬咀水二盞煎一盞去滓露一宿空心未發前一

日溫服

欵火丹 治脾寒

淡豉 二兩 信 二錢 雄黃 五錢 硃砂 三錢

右為末用蒸餅量多少搗和為丸如梧桐子大每服五十九丸隔發一時用冷水送下忌熱物濕麪發毒等物三五日

吳茱萸湯 出楊子建護命方 治脾熱寒瘧非時發作飢肉黃瘦

食減腸泄腹痛六腑不調

吳茱萸 煉洗焙 芎藭 鼈甲 去晨爛 防風 人參

蒼朮 米泔浸宿切焙 藿香葉 柴胡 去苗 肉豆蔻 去殼 甘

草

右劉散每服三錢水一盞生薑二片煎七分去滓未發前空心溫服

柴胡厚朴湯 治脾寒

柴胡 厚朴 青皮 陳皮 常山 草菓 烏

梅 甘草 硝砂 檳榔 各等分

右吹咀每服三錢水一碗煎八分露一宿五更冷服正發一服過後又一服

良薑丸 出朱氏集驗方 醒脾治瘧

良薑 二兩

右末猪膽丸梧桐子大紫蘇湯下二十九

手太陰肺瘧

夫肺瘧者內經謂令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見刺手太陰陽明是也蓋心肺獨居膈上其氣相通故瘧邪入肺內動于心則為寒熱善驚之候也

方

人參丸 治肺瘧心寒熱善驚如有所見

人參 鼈甲同前 桃仁去皮尖 恒山 甘草炙 肉蓯

蓉酒浸切焙 升麻各三分 桂去粗皮 烏梅肉炒 龍齒研各一兩

杏仁去皮尖雙仁研一兩 丹砂研一分 阿魏研一分

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心

米飲下未發時併二服

麥門冬湯 治肺瘧及補心氣

麥門冬去心一兩半 升麻 知母剉 甘草炙 鼈甲醋炙去

柴胡去苗 前胡去蘆 桃仁去皮尖雙仁研炒 枳殼去穰麩炒 梔

子去皮 蘆根剉 烏梅肉炒各半兩 人參三分

右麤搗篩每服二錢半入桃柳枝各五寸薑三片煎

八分去滓入石膏末一錢更煎沸未發前一二服

烏梅丸 治肺瘧

烏梅肉炒 恒山 鼈甲去晨爛 人參 知母焙 肉

蓯蓉酒浸切焙 桃仁去皮尖雙仁各半兩

右為細末鍊蜜丸如梧桐子每服三十丸溫酒或米

飲下未發三服

丹砂丸 治肺瘧心神驚悸

丹砂別到阿魏醋化去沙石麝香各一分 鉛丹研一兩

右為細末取五月五日午時粽子三十七與藥同研

於北斗下露一宿丸如桐子大未發煎熱水下丸

緋帛裹一丸安耳內男左女右

二丹丸 治肺瘧心神驚悸

丹砂別研鉛丹別研甘草炙到各半兩當歸各半兩恒山各三分

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸食前溫水下

未發時再服候飢即以葱豉粥與之

杏仁丸 治肺瘧

杏仁四十枚湯浸去皮雙仁炒黃色恒山三分丹砂別研甘草生到一分

右為細末鍊蜜丸如菉豆大每服十九發熱米飲下

日再服之

林米湯一名恒山湯出千金方 治肺瘧心寒甚即發熱熱即驚如

有所見

恒山一兩林米一分甘草炙到半兩

鑑定四庫全書  
卷一百九十八

右麓篩每服三分水一盞煎至七分去滓未發前温服發再服之

黃連湯 治肺瘡心虛

黃連 去須一兩半 當歸 切焙一兩 乾薑 炮半兩

右麓篩每服三錢水一盞煎至七分去滓臨發時服

足少陰腎瘡 附論

內經謂足少陰腎瘡在經則令人嘔吐多寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難已在臟則令人淒淒然腰脊痛而

宛轉大便難目眴然手足寒刺足太陽少陰益腎脉入脉中脉環胃口故使人嘔陰虛則傷氣偏故熱多若夫洒淅腰脊痛大便難目眴足寒特以藏氣機關不利故為此證也

烏梅丸 出聖惠方 治腎瘡腰脊痛手足寒食少無力

烏梅肉 一兩 微炒 桂心 一兩 甘草 一兩 炙 虎頭骨 二兩 塗酥炙令

黃人參 一兩 去蘆頭 香豉 一合 炒乾 恒山 二兩 對 桃仁 湯浸去皮尖雙

仁麩炒 附子 半兩 炮製 去皮臍 川升麻 一兩 鼈甲 塗酥炙黃 色去展襴

欽定四庫全書  
善濟方  
二十

麝香一分肉苻蓉一兩酒浸去皮乾一宿

右為末入麝香勻鍊蜜和搗三五百杵如梧桐子大每以食前以粥飲下每一服二十九漸加至三十九止

烏梅丸出聖惠方治腎瘡令人洒洒然腰脊痛大便難目眇

手足寒及瘡久不瘥者

烏梅肉炒恒山對三分豉一合虎頭骨酥炙麝香半兩

桃仁一兩附子炮去皮肉苻蓉酒浸

知母半兩桂一分

右搗研拌鍊蜜和丸如梧桐子每服空腹米飲下二十九未發服一方無知母

苻蓉丸 治腎瘡

肉苻蓉酒浸焙烏梅肉炒恒山對三分豉炒升

麻桃仁湯浸去皮桂去粗皮甘草炙

右搗研和勻鍊蜜和丸如梧桐子大每未發日空腹溫酒下二十九米飲亦得至未發時更服二十九

人參湯 治足少陰瘧嘔吐寒熱

人參

去蘆頭

恒山

剉各半兩

甘草

生剉三分

燈心

五十莖

茶末

橘皮

湯浸去白焙各下

右麤搗篩每服五錢水一盞煎七分去滓入酒半盞

相和未發前頓服以吐為效未吐再服

恒山湯

出千金方

治腎熱發為瘧令人淒然腰脊痛宛轉大

便難目眴眴然身掉不定手足寒

恒山

三兩

烏梅

三七枚

竹葉

切一分

香豉

八合

葱白

一握

右咬咀以水九升煮取三升分三服至發令盡一方

用桃仁無竹葉

天雄丸

出聖惠方

治腎虛無問新久發作無時神效

天雄

炮製去皮臍兩半一方作生用

鉛丹

研三錢

人參

三分

右搗研和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸未發日

空心米飲下日三五服

五服散 治足少陰瘧嘔吐

半夏

湯洗去滑生薑汁製焙

乾薑

炮各半兩

綠礬

研一錢

右搗研勻每服半錢未發日以醋湯調下

足少陽膽瘡 附論

夫少陽瘡之狀內經謂令人身體解倦寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽是也蓋膽為中正之官決斷出焉今瘡邪外干其氣不守故心常惕惕然盛故熱有風故汗出

升麻湯 治足少陽瘡身體解倦見人心惕然熱多汗出

恒山 一兩半 升麻 鼈甲 醋炙去 淡竹葉 各一兩 犀角

屑 麥門冬 焙去心 知母 切各三兩 甘草 炙半兩

右吹咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心日午溫服

黃連丸 治足少陽瘡清膽

黃連 去鬚一兩 甘草 炙判半兩 龍膽 去苗 鉛霜 研 定粉 研 人中白 各三分 馬牙硝 研一兩

右為末用猪膽汁和丸如梧桐子與服二十九用杷批葉拭去毛煎湯下

鍾道心碑銘

卷一百九十八

犀角湯 治足少陽瘧解倦熱多汗出

犀角鎊 甘草炙各一兩 麥門冬焙去心 升麻 知母 鼈

甲醋炙去麩爛 石膏碎研二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去

滓於未發前溫服

蘆根湯 治足少陽瘧熱多汗出及溫瘧初壯日熱後

寒戰骨節痠痛口渴

生蘆根剉三兩 麥門冬焙去心 升麻 葛根各一兩半 梔子仁

一兩 石膏研二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入淡竹葉二

七片煎一盞去滓溫服早晚食前

柴胡湯 治足少陽瘧熱多汗出

柴胡去苗 秦艽去苗土 麥門冬焙去心 蘆根 淡竹葉各一兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水盞半煎至一盞去滓入青蒿自然汁半合再沸未發前五更初溫服

犀角丸 治少陽瘧身體解倦或寒熱心惕惕然汗出

犀角屑一分恒山一分蜀漆葉半豉一分

右為末鍊蜜丸如桐子每服十九丸未發前米飲下

足太陽膀胱瘧 附論

夫太陽瘧之狀內經謂令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱焯焯暍暍然熱止汗出難已刺郄中穴蓋膀胱經下抵腰中上顛絡緇故腰痛頭重寒從背起也經虛受邪故先寒後熱熱止汗出難已以真氣勝邪故也

方

柴胡湯 治足太陽瘧寒熱

柴胡去苗恒山剉鼈甲去晨欄知母焙青蒿乾者甘草  
炙枳殼去穰桂去粗皮  
對剉各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白二寸細切同煎至七分去滓空服發前再服

酒煎飲 治足太陽瘧腰痛頭重寒熱互作方見本門

柴胡桂薑湯 治足太陽瘧腰痛頭重寒多熱少方見本門

諸瘡類

牡蠣湯 治足太陽瘡 方見本門 諸瘡類

麻黃黃芩湯 出濟生 我粹方 治足太陽瘡夜發晝瘥

麻黃 去根 節 黃芩 去心 甘草 炙 各半 桂 二錢 五分

每呔咀一服一兩水三盞服

足陽明胃瘡 附論

夫足陽明胃瘡在經則令先寒洒淅寒甚久乃熱熱去汗出見日光月光火氣快然當刺足陽明跗上在胃則

令人陽明旦病善飢而不能食食支滿腹當大刺足陽明太陰橫脉出血益胃圍冲氣為水鼓之海邪氣客之則冲氣不和故善飢不能食食則支滿腹大傳於經者有寒熱陽不勝於陰故善喜日月光及火氣也

方

順氣湯 治足陽明胃瘡支滿腹大

厚朴 去粗皮 薑汁製 陳橘皮 湯去皮 白焙 白朮 半夏 湯浸七次焙各

一兩 乾薑 炮 柴胡 去苗 甘草 炙 各半

右粗搗篩每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘煎七分去滓溫服無時

清脾湯

出醫方集成

治胃瘧發作有時先覺伸欠乃作時寒

栗鼓振頤頷中外皆寒腰脊俱痛寒戰已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔因食傷脾停滯痰瘧或先熱後寒先寒後熱或寒多熱少熱多寒少或寒熱相併或但熱不寒或但寒不熱或隔日發一日一發或三五日一發者悉皆主之

厚朴

四兩薑汁製炒

烏梅

去仁

半夏

浸去滑

青皮

良薑

各二兩

草菓

去皮一兩

甘草

炙半兩

右為剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎七分去滓未發前併三服忌生冷油膩時菓此藥服溫脾化痰治胸膈痞悶心腹脹滿意醋吞酸自可常服

紅圓子

出直指方

治食瘧積氣滯腹脹

荆三稜

水浸軟切片

蓬莪朮

煨

青皮

去白

陳皮

去白

胡

椒 乾薑

炮各三兩

右為末米醋煮米粉糊和丸如桐子大凡紅為衣每服五十九丸淡薑湯下或二陳湯四獸飲下亦可

正氣湯出衛生方治胃瘧不食肢滿腹脹時作寒熱

藿香葉 陳橘皮湯浸去白焙 厚朴去粗皮薑汁炙 半夏為末生薑

汁作嚼 甘草炙各一兩

右粗搗每服三錢水一盞生薑三片煎七分未發併

兩服

枳殼湯 治胃瘧心腹脹滿不食

枳殼去穰麩炒三兩 厚朴去粗皮薑汁炙 人參 白朮 白茯苓

去黑皮各二兩

右搗篩每服四錢水一盞半入生薑一片棗大拍煎一

盞去滓溫服

梨蘆丸出千金方治五臟并有瘧疾則六腑非獨胃腑有之

胃腑瘧者今膽病也善飢而不能食

梨蘆 恒山 皂莢 牛膝各一兩 巴豆三十粒去皮心研紙

裏壓去油

右先熬梨蘆皂莢色黃合搗為末蜜和丸如小豆大  
旦服一九發時一九一日勿飽食一方無恒山牛膝温  
水下

紅圓子

出醫方集成

專治食瘡

蓬朮

荆三稜

醋炙各二兩

川椒

二兩青皮

炒香二兩阿魏

一分

化醋

右為末別用陳蒼朮末同阿魏醋煮糊為丸如桐子  
大每服五十九加至百丸用薑湯吞下或因食生果

成瘡用麝香吞下一方炒土硃為衣以老米飲下古  
方雖鼈甲煎等不時服不見效抑亦藥料難備

厚朴湯

治足陽明胃瘡寒熱汗出食則支滿腹大

厚朴

去粗皮用生薑汁炙二兩

白朮

陳皮

浸去白焙各二兩

甘草

桂

去粗皮各半兩

右麓搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二个擘煎  
至七分去滓食前温服

人參蜀椒湯

治胃瘡腹滿

人參

兩半

蜀椒

去目及閉口炒出汗一分

阿魏

麩和餅炙三分

乾薑

炮一兩

右搗如麻豆大每服三錢水一盞煎七分未發前去

滓溫服

恒山橘皮散

治胃瘧脹滿不食

方見本門山瘧瘧類

蒜薑酒 治胃瘧飢不能食

獨窠蒜

一類生薑一分

右研碎以酒半升調去滓未發時旋旋服之

阿魏酒

治胃瘧

方見本門足少陰腎瘧類

寒瘧

附論

夫寒瘧之狀內經所謂後熱先寒病以時作是也蓋伏暑汗出腠理開發因遇憂氣淒滄之水寒其氣藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣其證先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓振顙頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭疼飲冷是也

方

五積散

指出直指方

治感寒發瘧初作以此解散

蒼木兩炒三北梗一麻黃根去枳殼製陳皮各六乾薑錢

厚朴製各川芎四兩當歸製白芍藥製白芷製甘

草製茯苓製半夏製官桂各三

右劉散每服三錢水一盞半葱白三寸薑三片煎空

心服

恒山丸出聖治寒瘡陽虛陰盛內外俱寒四肢顫掉

恒山兩半野狸頭骨分一虎頭骨分一狗獾頭骨分一天靈

蓋分一菘豆末分三硫黃細研一分安息香分一雄黃細研一分砒

霜分一乳香分一阿魏分一白芥子分一硃砂細研一分

右藥并生用搗羅為末軟飯和搗三二百杵丸如梧

桐子大修合時勿令孝子女人見須五月五日合為

妙如緩急即不擇日辰合未發時以絳囊盛於中指

上繫一丸男左女右三日不住以熱水服一丸妊婦

小兒不可服忌食熱物

硃砂丸出聖治寒熱瘡但寒不熱四肢鼓顫不止

硃砂細研一分麝香細研半分砒霜細研一分恒山一分虎頭骨

一分塗 狗猴頭骨 一分 虎睛 一對酒 乳香 一分 安息

香 一分 阿魏 一分 巴豆 三枚去皮 雄黃 半兩

右為末端午日修合用醋煮麩糊和搗一二百杵丸如豌豆大用緋帛裹男左女右手把一丸如痰瘡即以醋湯下一丸每服把者一丸可治三人

吳茱萸湯 出續易簡方 治寒瘡先寒後熱頭疼不可忍熱極

即汗出煩渴相次便醒宜服此藥

吳茱萸 湯浸焙 羌活 去羌頭 甘草 炙 乾薑 焙 半夏

湯洗七次焙 芎藭 細辛 去苗葉 麻黃 去根 高良薑

木本 去苗土 桂 去麤皮

右為細末每服三錢以水一盞煎至七分臨發時寒和滓空心熱服若寒了又熱更不用服須只用初發寒時服也寒未定更進一盞喫藥後不可臥須臾病減八分若是太歲遇六壬己亥之年當瘡未發常服暖藥一方有牽牛炒半兩

養胃湯加桂 指出直指方 治感發寒多熱少或但寒不熱頭痛

腰痠胸滿呃逆身體鼓慄振寒面色青白不進飲食  
脉來弦遲

厚朴製 蒼朮炒二兩 人參 茯苓 草菓 藿香各半

兩 橘紅三分 甘草炙一兩

右剉散每服三錢水一盞半薑五片烏梅半个煎八  
分去滓温服不拘時候多寒者加附子煎一方用棗  
不用烏梅

雄黃丸出聖惠方 治寒瘡不止

雄黃一分 硫黃一分 朱砂一分 麝香半分 阿魏半分 桂心一分

乾薑一分 巴豆一分 生用 煮水盡壓去油研如麩

右和研勻醋煮麩糊和丸如梧桐子大未發前綿裹  
一九安耳中及男左女右緋帛繫一粒於背上

草豆蔻飲出聖濟總錄 治寒瘡

草豆蔻去皮 高良薑半分 恒山 青皮湯浸去白焙 陳皮湯浸

去白焙 生薑半分 黑豆五十粒 淡竹葉一握

右吹咀如麻豆用水三盞煎至一盞半去滓未發時

通口分温二服

正氣散 出醫方大成 退寒瘧止胃寒進飲食

藿香 四兩 草菓 四兩 半夏 陳皮 厚朴 硝砂 甘

草 各一兩

右剉散生薑棗子煎温服瘧疾後發日早服

安息香丸 出聖惠方 治寒瘧手足鼓顫心寒面青

硃砂 研細 虎頭骨 狗獠頭骨 砒霜 天靈蓋

阿魏 安息香 各半兩

右為末入硃砂研勻端午日午時用白團子和丸如  
豌豆大男左女右手把一九定後用緋帛袋盛繫于  
中指上若登溷即暫解去

檳榔湯 出聖齊總錄 治寒瘧

檳榔 剉 桂 去粗皮 恒山 陳皮 湯浸去白炒 甘草 炙剉各等分

右粗末每服三錢酒水各半盞煎一盞未發前去滓

温服

神效方 出聖惠方 治寒瘧

硃砂研細 白芥子

阿魏各一錢

香墨五錢

砒霜一兩

酸漿水一

碗于端午日未出時慢火熬如稀糊便入後藥

右為末以砒煎和為丸如黍米大每于未發前冷醋湯下一丸至十丸忌食熱物

分利順元散

出醫方集成

治體虛之人患瘡寒多不可服截

藥者

川烏

附子各一兩

南星二兩

木香五錢

別剉臨時入

右除木香不見火外味各將一半去皮生用一半炮

發熟合和呔咀每服四錢棗七枚生薑十片水一盞

煎至七分當發日前一日及當發日早晨連進二三

次服半生半熟能解陰陽

白芥子丸

出聖惠方

治寒瘡手足鼓顛心寒面青

白芥子

硃砂研細

阿魏

恒山

各等分

右為末入硃砂研勻醋煮麩糊和丸如梧桐子大每於未發前醋湯下

阿魏

出聖惠方

治寒瘡

砒霜 硃砂 阿魏 麝香各一分

右同研如粉麪糊和丸如小豆大每于未發前冷醋湯下一丸忌食熱物

豬膽膏

一名二薑散 出朱氏集

治脾胃虛弱遂成瘡疾寒多熱少

大槩寒發于膽豬膽引入二薑于膽去寒燥脾胃二

薑熱豬膽冷陰陽相制所以作效仍治秋深寒瘡

乾薑

炮一兩

良薑

切小塊麻油炒乾一兩一方各二兩半生半炒用不用麻油炒

右為末分四服每服用豬膽積者取汁調成膏臨發

時熱酒半盞調服或以膽汁和丸焙酒下四十五丸

尤佳吳內翰并致和丁酉居全椒歲瘡大作施人所

救愈者以百計張大亨病甚欲致仕服之立愈

菓附湯

出醫方集成

治氣虛脾寒瘡疾不愈振寒少熱面青

或單寒者或大便澁小便反多不下食

草菓仁 附子

炮去皮臍

右等分咬咀每服半兩水二鍾薑七片棗二枚煎七

分去滓溫服不拘時

七棗湯 一名烏頭 七棗湯

治瘡及久瘡但寒并脾寒發瘡重輕

用川烏一隻熱多寒少者湯炮七次寒多熱少者火炮  
 七次切去皮焙乾分三服水一碗半棗七枚薑七片葱  
 七根煎至二鍾臨發前先喫棗子次搥去滓溫服或將  
 附子一枚炮七次鹽水泡七次分二服露一宿名冷附  
 湯大槩附子一枚溫脾逐寒川烏溫脾去風附子性重  
 滯川烏性輕疏若寒痰當發日用附子是風用川烏雖  
 然烏頭性熱以七次炮熟散其熱性服之必效經驗方陳

氏云林侍郎謙之常以此藥授人余家服之屢有效

生熟附子湯 治分利陰陽止發熱寒治瘧疾欲作胸

痞痰嘔頭眩顫掉

用附子二隻一生去皮一鹽湯浸去皮炮各取二錢  
 沈香木香水各一盞薑七片棗七枚煎一盞當發日  
 空心服此下黑錫丹可回元氣墜痰

鼈甲散 治寒瘧勞瘧

取鼈甲不拘多少醋炙黃為末每服二錢溫酒調下

空心食前臨卧時各一服治勞瘧塗醋炙服之

鼈甲湯 治瘧寒多

鼈甲

湯浸刮冷淨醋炙

常山

柴胡

桂

去皮各一兩

白朮

二兩

牡蠣

半兩火煨赤

右為散末每服五錢水二鍾煎一鍾去滓溫服

溫脾飲 治寒瘧兼脾久溫上焦噎塞不通止渴進飲食

真陳橘皮

五个去穢

烏梅

十个人

參

一分

大棗子

二十个

甘草

五分

草菓子

七个

生薑

五片

右件洗淨分作五服紙裏以鹽少許煨香熟去紙水

一碗煎一盞去滓溫服空心日午

蒜丹 寒瘧手足鼓顫心寒面青宜用此方

獨顆蒜

一枚

黃丹

半兩

右件藥相和伍月五日午時同搗一千杵丸如黑豆

大未發時以茶下二丸

烏頭丸 先寒後熱者名之為寒瘧故寒而不熱面色

黑者名為厥瘧先寒後熱少寒多熱面黃腹痛名之為

脾瘡此三候並宜服此不再丹大賈耘老方東坡累試  
早晨一服晚便不發病稍瘥莫服

草烏頭削去皮

右用沸湯泡一十四度以蓋蓋之薄切焙乾為末稀  
糊和丸如桐子大棗三個薑十片葱三根煎湯服五  
十九仍喫棗令盡如人行五里別加再服用此二十  
年只一服瘥烏頭蛀損瘦薄者不堪使  
蒜九子 治寒多熱少

良薑 厚朴 附子各三分

右為末大蒜丸於發日絕早煎烏梅湯勻作三服早  
食前令服盡

溫瘡附論

夫溫瘡與寒瘡得分溫瘡得之冬中於風寒氣藏於骨  
髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因遇大暑胸髓  
鑠肌肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此  
邪氣先藏于腎其氣先從內出之於外如是則陰虛而

陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧瘧先寒而後熱者此由夏傷於大暑汗出腠理開發因遇夏氣淒滄之小寒寒迫之藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧夫病瘧六七日但見熱者溫瘧也

方

麻黃湯 治溫瘧初發身熱頭疼不可忍臨醒時即寒慄戰動不定逡巡便醒宜服此方須是先熱後寒方喫此藥

麻黃

去根節煎掠去沫焙

羌活

去蘆頭

牡丹

去心

獨活

去蘆頭

梔子

柴胡

去苗

桔梗

剉炒

升麻

荊芥穗

大黃

剉炒半夏

洗去滑焙

木香

知母

焙

黃芩

去黑心各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片同煎取七

分去滓未發時服一方有牽牛無木香為細末同煎  
臨發壯熱時和滓喫須是用初發熱時服仍是食後  
喫發子已寒即更不要喫待第二服發熱時喫也名  
麻黃羌活散

常山丸 療溫瘧

常山 烏梅肉熬 豉 天靈蓋炒各六分 知母 硃砂

蜀漆 大黃各四分

右搗篩蜜和丸如桐子大空心以溫酒下二十九至

三十九日三服並未發前服不吐利忌生葱菜生血  
等物欲成骨蒸

常山湯 療溫瘧漸漸羸瘦欲成骨蒸

常山三兩 車前葉一握 甘草二兩 獼猴骨三兩 天靈蓋

一兩燒 烏梅肉二兩 驢糞汁三合

右切以水六升煮五味取三升去滓下糞汁天靈蓋  
分三服微吐不利忌生葱生菜海藻菘菜麩粘食等  
物一方無驢糞汁

知母鼈甲湯 療溫瘧壯熱不能食

知母 鼈甲炙 地骨皮各三兩 竹葉切一升 石膏四兩碎

常山二兩

右切以水七升煮取二升半去滓分三服忌蒜猪肉

莧菜生葱菜

麻黃飲子 治溫瘧煩悶

麻黃一兩去根節 牡蠣粉一兩 蜀漆半兩 甘草半兩 犀角屑半兩

知母半兩

右剉以水二大盞煎至一盞半去滓分為三服一日

服盡

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明

合病也謂之火爭寒作則戰動經曰熱勝而動也發

熱則必汗泄經曰汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之

證當實內治外恐久而傳入陰經也

桂枝三錢 黃耆 知母 石膏 芍藥各一兩

右為末每服七錢至半兩水煎如藥服之寒熱轉大

者則知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝湯黃芩湯和之

松蘿湯 治溫瘧熱渴體痛

松蘿半兩 烏梅肉炒 梔子去皮各半兩 升麻三分 鼈甲去裏爛醋

浸炙黃半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入茶末半錢煎至七分去滓未發前空心服

常山湯 治溫瘧

常山剉半兩 鼈甲去裏爛醋浸炙黃 甘草生剉炙各一兩 車前草一握

切成片子三合

右粗搗篩每服七錢用漿水一盞浸藥一宿當發前一日以急火煎取七分出滓溫服

竹葉恒山湯 治溫瘧壯熱微寒溫瘧之候也壯熱後如覺微寒或戰瘧依時手足冷少時便壯熱亦有手足煩熱乾嘔者瘡瘧先大寒後大熱者並主之尤宜乳下小兒亦可

淡竹葉

握

恒山

三兩切

小麥

一升

右用水五升漬一宿明旦煮取二升溫分三服忌生

葱菜

恒山飲

出聖惠方

治瘟瘧煩悶

恒山

半兩

甘草

半兩生用

冬瓜汁

一升用生者煎汁亦可

右剉以冬瓜汁浸一宿早晨煎五六沸去滓分為二服

空心一服發前一服得吐瘥

治瘟瘧方

用牡蠣和杜仲為末蜜丸每服三十九令人面光永不時氣溫水下又方取當歸煮飲下

瘧發作無時

附論

夫微氣一日一夜大會于風府則腠理開開則邪入而病作當其時陰陽相并隨其所勝故生寒熱其動作皆有早晏者若臟腑受邪肉外失守邪氣妄行所以休作無時也

方

硃砂丸出聖方治瘡寒熱發作不定體瘦不能食

硃砂一分麝香一分恒山剉川升麻 苦參剉 獼

猴腦益 鼈甲塗 烏梅肉微 柴胡去 虎頭骨

醋塗 烏貓糞燒 驢軸垢 木香 白朮 川大黃

炙黃 地骨皮各半 巴豆三分去皮心熬黃別

右為末入研藥令勻鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐

子大空心服溫水下四九漸喫冷茶半碗良久吐痰

涎後便煎熱茶下二丸得吐利便效

虎頭骨散出聖方治瘡發作無時寒熱不定

虎頭骨一兩塗 牡蠣三分炒 地骨皮一兩 柴胡一兩

鼈甲一兩塗 知母一兩 桂心半兩 朴硝一兩

右為散每服五錢水一盞煎至五分去滓食前溫服

取下痰結為度

天靈蓋丸出聖方治瘡發作無時經久不瘥

天靈蓋一兩 獼猴頭骨一兩 硃砂一分 雄黃一分 麝香

菜豆粉一分 砒霜一分 虎頭骨一兩

研一分

右為末入後五味研勻五月五日午時面南粽子尖  
和劄一剪刀還內過七編丸如梧桐子大每服發前  
以青絹裏一九繫男左女右臂上一丸可治七人第  
七人冷醋湯下

狐膽丸 出聖惠方 治瘡寒熱發作無時

砒霜 硃砂 各半兩 麝香 阿魏 各一分 狐膽 一枚 黃丹

菜豆粉 各一分

右細研勻五月五日午時面南粽子尖和丸如桐子

大空心及發前冷醋湯下二丸忌食熱物

桃奴丸 出聖惠方 治瘡發作無時節

獠猴頭骨 一兩 巴豆 一分 砒霜 一分 野杖人花 一分

桃奴 向陽枝 班猫 一分 微黃

右為末於端午日午時合以飯和丸如梧子大令患  
人手把一九時時顧示仍男左女右於手背上緋帛

繫一九

虎睛丸 出聖惠方 治瘡發作無時不定寒熱甚者

虎睛一枚生搗細末臘月猪血許少硃砂一分研阿魏一分細末

右研勻取端午日合粽子尖七枚和丸如黍粒大男

左女右綿裏一九

砒礪丸出聖惠方治瘡發作無時不定寒熱

砒霜一分阿魏一分雄黃三分硃砂一分並細研

右於端午日用糯米飯和丸如菘豆大去發一時辰

綿裏三九男左女右塞耳中如惡發茶清下三九當

吐

靈砂丹出聖惠方治瘡發作無時經久不瘥

硃砂半分麝香二錢蝙蝠糞五十粒

右研細用軟糯米飯和丸如菘豆大未發時煖水下

十九

必效方出聖惠方治瘡無問新久發作無時

黃丹四兩麩塵一兩

右取五月五日午時面東不語研搗獨蒜和丸如鷄

頭實大男左女右於背上緋帛繫一九欲發時醋湯

下之

百瘡方

出聖惠方

治瘡無問新久發作無時

恒山

末一兩

律草

一握去兩頭姓名勒夢秋冬月乾效亦得

右以淡漿水二盞浸藥於星月下橫一刀經宿明早晨煎取一盞去滓空腹分二服如人行七八里再服當快吐痰午後漸食粥

又方

出聖惠方

用青皮一兩燒灰研細末發前溫酒調下一錢正發

時又服一錢

恒山湯

出肘後方

治瘡發作無常心下煩悶

恒山

二兩

甘草

炙一兩半

豉

五合綿裏

右切以水六升煎去滓取二升再服當快吐仍節飲食忌海藻菘菜生葱菜

大效五丁飲子

出海上方

治瘡發作重者

白豆蔻

五個

生薑

切如皂子大

京棗

五個

分作

五塊

分作

五塊

半夏

二十個

甘草

五寸

分作

五塊

分作

五塊

分作

五塊

右通作一百二十五塊於未發前一日至晚作一劑  
 水二碗前一碗去滓再燒兩糞滾作三服夜間露於  
 中庭至四鼓後過熱喫一服再於曙色分時吃一服  
 次至天曉吃些粥若稍空更吃一服便去睡極效

藥餛飩生此方

良薑


吳茱萸

胡椒

各一分

右為細末猪脾一條剉作臛加五味炒之一半滾藥  
 一半不滾並作餛飩有藥者以墨点之遇者吞下無

藥者嚼下亦一服效



普濟方卷一百九十八

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官中書臣邵志望

謄錄監生臣王鳳翹