

詳校官助教 李巖

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十二

熱病門

總論

夫熱者皆傷寒之類也冬傷於寒至春變為溫病至夏變為暑病者熱重於溫也肝熱病者小便赤黃腹痛多卧身熱熱盛則狂言多驚兩脇滿痛手足熱躁不能安

明 周王朱楠 撰



欽定四庫全書

普濟方

卧心熱病者先不樂數日乃熱熱盛則卒心痛煩熱欲嘔頭痛面赤無汗脾熱病者先頭重頰痛心煩欲嘔身熱熱盛則腰痛腹滿溏泄肺熱病者先淅然毛起惡風舌上黃身熱熱盛則喘欬背脊不得大息頭痛不汗出而寒腎熱病者先腰痛脛痠大渴數飲水身熱熱盛則項痛而強脛寒足下熱不欲言肝熱病者左頰赤心熱病者面先赤脾熱病者唇先赤肺熱病者右頰赤腎熱病者頤先赤病雖未發見色者療之名曰治未病一日

汗不出大灌發者死二日泄而腹滿甚者死三日目不明熱不已者死四日老人嬰兒熱而腹滿者死五日汗不出嘔血者死六日舌本爛熱不已者死七日欬血而衄汗出不至足者死八日髓熱者死九日熱而瘞者死凡有此候者皆不可治也熱病已得汗脉靜者生脉躁者難治熱病脉常盛躁而不得汗者此陽之極也得汗者生不得汗者難差熱病已得汗脉上躁喘且即復熱喘盛者死熱病七八日脉不躁不數後三日當有汗若

不汗者難治熱病七八日其脉微小者生脉代舌焦乾
黑者死熱病已得汗常熱不去脉靜者生脉躁者難治
熱者脉常躁此氣之極也亦死熱病服滿常喘熱不退
者死熱病多汗脉虛小者生緊實者死矣 又云熱病
者皆傷寒之類是也或愈或死皆以六七日之間其余
以十日以上者何不知其解願聞其故岐伯曰巨陽者
諸陽之屬也其脉連於風府故諸陽之氣也人之傷寒
也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病必不能免

於死矣帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故
頭項疼腰背強二日陽明受之陽明主肌肉其脉夾鼻
絡於目故身熱目痛鼻乾不得卧也三日少陽受之少
陽主膽其脉循脇絡於目故胃脇痛而耳聾三陽經絡
皆受其病而未入於藏故可汗而已四日太陰受之太
陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾故五日少陰受之
少陰脉貫腎絡於肺系於舌本故口燥舌乾而渴六日
厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三

陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏不通則死矣
 其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明
 病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微開十日太陰病
 衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌
 乾已而噫十二日厥陰病衰囊縱小腹微下大氣皆去
 病日久矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病
 日衰矣未滿三日可汗而已其滿三日可下而已

熱病一日論

夫熱病一日病在太陽主表表胃皮膚也病在皮膚之
 間故頭項腰脊皆痛宜汗之則愈也

方

解肌散出聖方治熱病一日頭痛身熱四肢煩疼宜服

麻黃去根 川升麻 甘草炙微 赤芍藥 柴胡去

桔梗去蘆 杏仁湯浸去皮尖雙仁

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至
 五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

石膏散出聖惠方治熱病一日頭痛壯熱宜服

石膏 麻黃去根節各二兩 黃芩 桂心 赤芍藥

柴胡去苗各一兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

葛根散出聖惠方治熱病一日頭痛項強身熱如火宜服

葛根剉 赤芍藥 麻黃去根節 石膏各二兩 白芷

柴胡去苗 黃芩 桂心各一兩

右為粗散每服四錢以水一盞入葱白五寸生薑半

分煎至分去滓不計時候熱服衣覆取汗

柴胡散出聖惠方治熱病一日頭痛壯熱煩悶宜服

柴胡去苗 赤芍藥 葛根各一兩 梔子仁 黃芩各半兩

石膏二兩

右為散每服四錢用水一大盞葱白二莖豉半合煎

至五分去滓不計時候溫服

梔子散出聖惠方治熱病一日頭痛壯熱心中煩悶宜服

梔子仁 黃芩各三分 石膏 葛根剉 柴胡去苗
麥門冬去心焙 各一兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入豉五十立葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫服

麻黃散出聖惠方 治熱病一日頭痛壯熱宜服

麻黃一兩去根節 川大黃三分剉碎微炒 黃芩 桂心 甘草

炙微赤剉 赤芍藥各半兩

右為細散每服不計時候以新汲水調三錢服後蓋

衣取汗未汗再服

治熱病一日壯熱頭痛宜服出聖惠方

甘草一兩炙微赤剉 生薑三分切 藟藟二枚大者細剉 椀中盛之

右先將甘草生薑以酒一大盞半煎至八分去滓熱投入藟藟椀中絞取汗不計時候分溫二服衣覆取汗

桃柳湯浴方出聖惠方 治熱病一日身體壯熱頭痛骨肉痠

楚背脊強口鼻乾手足微冷小便赤黃宜用

桃枝并葉五片 柳枝并葉五片

右以水一石煮取一斗去滓帶熱避風處淋浴浴後於密室中刺頭并眼後兩邊及舌下血斷以鹽末塗針處便宜服葛豉粥

葛豉粥方出聖惠方

葛根一兩 葱白五莖并須白 豉一合 生薑一兩切

右藥以水三大盞煎至一盞半去滓下粳米二合煮作粥承熱頓服衣蓋取汗

麻黃粥方出聖惠方 治熱病一日宜服發汗

麻黃一兩去根節 豉半合

右藥用水一大盞半煎至一盞去滓下粳米半合煮作希粥承熱頓服衣蓋取汗

治熱病疫毒病一日兩日頭痛壯熱渾身發熱如火眼目昏眩項背強急診其脉寸口浮數總三部俱浮數宜發汗若洪大緊急有骨力即不可汗也但熱病疫毒病不可以時日為定只看脉氣可汗即汗可取即取不可

差誤凡陽毒傷寒三日後其用藥取病與治熱毒疫病
只一般也惟初間兩日所治小有不同但傷寒在表須
當發之熱病疫毒病往往有不須發也若見得不仔細
須俟三日後方可下疏藥也治疫毒在表發汗方萬金護命方

麻黃去根三分牡丹皮去心桔梗 羌活 細辛 荊芥

穗各一分

右細杵羅為末每服五錢水一椀椒五十粒茶末半
錢煎取濃汁用調下藥末非時和滓喫厚蓋衣被發

大汗一服安效

治時行熱病初得草本

以蒸菜搗絞汁飲之得差

熱病二日論

夫熱病二日陽明受病病在肌肉故內熱鼻乾不得眠
也故可摩膏火灸發汗而愈也

方

麻黃散出聖惠方治熱病二日頭痛壯熱肢節不利宜服

麻黃 二兩 去根節

川大黃 剉碎 微炒

葛根 剉

桂心

柴胡 去苗

赤芍藥 各二兩

甘草 半兩 炙 微赤 剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣蓋取汗

前胡散 出聖方

治熱病二日口苦咽乾頭痛壯熱宜服

前胡 去頭 蘆

杏仁

湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃各一兩

葛根 剉

桂心

旋覆花 各半兩

麻黃

二兩 去根節

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分葱白五

寸煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

服

桂枝散 出聖方 治熱病二日頭痛壯熱宜服

桂枝

葛根

赤芍藥

甘草 炙 微赤 剉

杏仁

湯浸去皮尖雙

仁 麩炒微黃各半兩

麻黃

三分 去根節

石膏 一兩

右為粗散每服三錢水一中盞入葱白五寸生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

服

麻黃 二兩 去根節

川大黃 剉碎 微炒

葛根 剉

桂心

柴胡 去苗

赤芍藥 各二兩

甘草 半兩 炙 微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣蓋取汗

前胡散 出聖方

治熱病二日口苦咽乾頭痛壯熱宜服

前胡 去頭 蘆

杏仁

湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃各一兩

葛根 剉

桂心

旋覆花 各半兩

麻黃

二兩 去根節

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分葱白五

寸煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

桂枝散 出聖方

治熱病二日頭痛壯熱宜服

桂枝

葛根

赤芍藥

甘草

炙微剉

杏仁

湯浸去皮尖雙

仁麩炒微黃各半兩

麻黃

三分 去根節

石膏

一兩

右為粗散每服三錢水一中盞入葱白五寸生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再

服

柴胡散出聖惠方 治熱病二日頭痛口苦雖經發汗未解可服

柴胡去苗 人參去蘆頭 甘草炙微赤剉 黃芩 赤茯苓各一兩

半夏半兩湯洗七過去滑

右為粗散每服三錢以水一中盞入葱白五寸生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服令自有汗即解

黃芩散

黃芩三分 麻黃去根節 石膏各一兩 川大黃剉碎微炒 葛根剉

桂心 赤芍藥 甘草炙微赤剉 川朴各半兩 硝石各半兩

右為細散每服不計時候以葱豉湯調下二錢衣蓋取汗未汗再服

治熱病二日發汗未解頭痛壯熱宜服此方出聖惠方

麻黃去根節 甘草炙微赤剉 葛根各一兩

右細剉和勻分為六服每服以水一大鍾入生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣蓋取汗

治熱病二日發汗後不解頭痛體熱宜服此方出聖惠方

石膏一兩 細研 麻黃半兩 去根節 甘草一分 炙 微赤剉

右並剉用水一大盞煎至五分去滓入雞子白一枚攪勻不計時候承熱頓服衣蓋取汗未汗再服
熱病三日論

夫熱病三日諸陽傳病訖病猶在表未入於藏故胃脇痛而耳聾可發汗而愈也

方

葛根散出聖方 治熱病三日未得汗壯熱煩惱欲得飲水

宜服

葛根剉 川大黃剉碎 微炒 黃芩 桂心 赤芍藥

柴胡去苗各一兩 麻黃二兩 去根節 梔子仁 甘草炙 微赤 剉各半兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍熱服令有汗為度

大黃散出聖方 治熱病三日發汗未解頭痛口乾心胃煩

悶宜服

川大黃剉碎 柴胡去苗 麻黃去根節 秦芫去苗

石膏二兩 甘草半兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分去滓

不計時候稍熱頻服汗出為度

柴胡飲子出方 聖治熱病三日頭痛口苦寒熱往來宜服

柴胡去苗 木通剉 赤芍藥各一兩 石膏二兩 甘草半兩

赤剉

右為細剉和勻每服半兩用水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

麻黃散出方 聖治熱病三日頭疼壯熱宜服

麻黃去根節 知母 葛根各一兩 赤芍藥半兩 黃芩

甘草炙剉 白藥子 梔子仁 細辛 柴胡去苗

兩 石膏二兩

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候稍熱服衣蓋取汗

發汗桂心散出方 聖治熱病三日表猶未解壯熱頭目四

肢不利宜服

桂心 赤茯苓 澤瀉 赤芍藥各半 柴胡去苗

葛根剉 麻黃去根節 甘草一分炙

右為粗散每服五錢以水一中盞入薄荷二七葉煎

至六分去滓不計時候稍熱服衣蓋取汗未汗再服

苦參散出聖惠方 治熱病三日解毒氣

苦參剉 黃芩兩 甘草半兩炙

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓入

生地黄汁一合攪令勻不計時候分溫二服

知母散出聖惠方 治熱病三日經發汗熱退後尚寒熱往來

不能飲食宜服

知母兩 枳實微炒 梔子仁各一兩半

右為散每服五錢用水一大盞入豉少許煎至五分

去滓不計時候溫服

熱病四日論

夫熱病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病

訖傳入於陰故毒氣入於胃膈其病咽喉乾胃膈滿故可吐而愈也

方

苦參散

出聖惠方

治熱病四日結胃滿痛壯熱身體疼痛宜服令吐

苦參

剉

恒山

各半兩

右為散以水二中盞煎至一盞去滓不計時候盡飲之當吐即愈未吐再服

瓜蒂散

出聖惠方

治熱病四日咽喉乾而復滿胃有寒痰當吐諸亡血虛家不可與服

瓜蒂

一分赤小豆一分

右搗粗羅為散每服二錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服以吐為度一方用香豉半合同煎服一方治內傷為細末溫水調一錢以吐為度如傷之太重備急丸獨行丸皆急藥也倉卒無藥糟瓜頓喫亦一吐

柴胡散出聖方治熱病四日壯熱四肢沈重喫食不下宜服

柴胡苗去 葛根剉 川大黃剉碎 石膏 前胡去蘆頭

鱉甲塗醋炙微黃去裙爛各一兩 赤芍藥 黃芩各三分 梔子仁

甘草炙微赤剉 川朴硝分

右粗搗羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

麻黃散出聖方治熱病四日毒氣內攻身體痛壯熱頭重

煩渴不止宜服

麻黃去根節 茵陳 菴藪根各一兩 桂心 細辛

柴胡苗去 甘草炙微赤剉 川大黃三分剉碎微炒

右粗搗羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

葛根散出聖方治熱病四日發汗不差身體壯熱心膈煩

悶不得睡卧宜服

葛根剉 石膏各二兩 龍膽草去蘆頭 大青 桂心

甘草炙微赤剉 麻黃去根節 葳蕤 赤芍藥 黃芩

川升麻 各一兩

右為粗散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

竹茹散 出聖方 治熱病四日頭痛胃滿食即嘔逆宜服

竹茹 陳橘皮 湯浸去白焙 葛根 剉 人參 去蘆頭 蘆根 剉

一兩 枇杷葉 半兩 拭去毛炙微黃

右為粗散每服五錢以水一大盞入粳米一百粒生

薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

人參散 出聖方 治熱病四日熱毒解後時來時往惡寒微

熱不能食宜服

人參 去蘆頭 知母 枳實 麩炒令微黃 陳橘皮 湯浸去白瓢炒

梔子仁 檳榔 甘草 炙微赤剉 豉 三兩微炒變色

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

熱病五日論

夫熱病五日少陰受病毒氣入於腹胃其病口熱舌乾

渴而引飲故可下而愈也

方

大黃散出聖方治熱病五日口苦舌乾煩熱頭痛不解者

宜服

川大黃剉碎石膏各一兩黃蓮去須甘草炙微赤剉黃蘗剉

梔子仁各半兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入葱白一莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

柴胡湯出聖方治熱病五日壯熱骨節煩疼目眩脇下脹痛不能飲食欲便成黃宜服

柴胡去苗枳實麩炒令黃色知母 黃芩 梔子仁

麥門冬去心焙龍膽草去蘆頭川大黃剉碎甘草炙微赤剉

各一兩

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

黃芩散出聖方治熱病五日頭痛壯熱骨節疼痛宜服

黃芩 梔子仁 前胡去蘆頭 赤芍藥各一兩 甘草半兩

灸微赤對 石膏二兩

右為散每服五錢以水一大盞入豉半兩許煎至五分去滓不計時候溫服

柴胡飲子出聖惠方 治熱病五日已得汗毒氣不盡猶乍寒

乍熱惛惛如醉脇下牢滿骨節疼痛不能下食舌本乾燥口内生瘡宜服之

柴胡去苗 麥門冬去心 竹葉各二兩 川升麻 黃芩

枳殼麩炒黃去瓢各一兩半 赤芍藥 甘草灸微赤對 梔子仁各一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入豉五十粒葱白一莖煎至五分去滓不計時候溫服

麥門冬散出聖惠方 治熱病五日頭痛身疼皮肉如火心膈煩燥

麥門冬去心焙 石膏 川朴硝各二兩 赤芍藥 黃芩

犀角屑各一兩 梔子仁 地骨皮 甘草灸微赤對各半兩

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

苗陳散出聖惠方治熱病五日未解頭痛壯熱眼睛疼心腹

痛宜服

苗陳 川大黃剉碎微炒 梔子仁 黃芩 柴胡

去木通剉 川升麻 赤芍藥 菝葜根各一兩

右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

熱病六日論

夫熱病六日厥陰受病氣入於腸胃其人煩滿而陰縮故可下而愈也

方

大青飲子出聖惠方治熱病六日不解通身肉熱毒氣令人

更相染著宜服

大青 生地黄各二兩 石膏三兩 香豉二合 葛根剉 梔子

仁各一兩 川芒硝三兩 甘草半兩炙

右都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去

滓不計時候温服

鱉甲散出聖方治熱病六日熱勢彌固大便悶澁心腹痞

滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言其脉洪數宜服

鱉甲塗醋炙令黃去裙爛羚羊角屑 赤茯苓 白鮮皮

枳殼麩炒微黃去穰杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃茵陳各一兩甘草

半兩炙川大黃二兩剉微赤剉

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候温服

梔子散出聖方治熱病六日胃中痰熱皮膚赤黃心身煩

悶大小便不利宜服

梔子仁 葛根剉茵陳 土瓜根 川升麻

川大黃剉碎微炒川芒硝 木通剉各一兩甘草半兩炙微赤剉

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候温服

石膏散出聖方治熱病六日不解壯熱頭疼小便赤澁口

内生瘡粥食不下宜服

石膏 知母 柴胡 秦艽去苗 木通剉各一兩 梔子仁

一兩 麥門冬去心 黃蓮去鬚三分 甘草半兩炙

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓入蜜一合攪令勻更煎三沸放溫慢慢含嚥之

苦參湯出千金方 治熱病五六日已上

苦參三兩 黃芩二兩 生地黃八兩

右為咀以水八升煎取二升適寒溫服一升日再服或吐下毒則愈

熱病七日論

夫熱病七日三陰三陽傳病訖病法當愈今病不除者欲為再經病也再經病者謂經絡重受也

方

半夏散出聖惠方 治熱病七日煩燥而渴胃中痰熱宜服

半夏湯洗七遍去滑 前胡去蘆頭 黃芩 麥門冬去心焙

菝葜根 赤茯苓 甘草炙微赤剉 赤芍藥

人參去蘆頭 知母 黃耆剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入粳米小麥各一百粒生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

前胡散出聖惠方治熱病七日不解寒熱往來胃脇苦滿不

思飲食心煩欲吐宜服

前胡去蘆頭半夏湯洗七遍去滑甘草炙微赤剉各半兩黃芩

人參去蘆頭赤芍藥桂心各三分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

地骨皮散出聖惠方治熱病七日遍身疼痛壯熱不解宜服

地骨皮枳殼麩炒微黃去穢川大黃剉碎微炒柴胡去苗

鱉甲塗醋炙令黃去裙爛麥門冬去心焙各一兩赤芍藥甘草炙微

赤剉各半兩

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

生地黄散出聖惠方治熱病七日或寒或熱來去不定腹中

虛熱毒氣不退心神不安宜服

生地黄汁分半生麥門冬升半人參去蘆白朮 肉桂

心 甘草炙微赤川升麻各一兩蜜升半地骨皮二兩石膏

三蓴菜心切半

右都判以水三大盞煮至一碗絞去滓下蜜地黄麥門冬汁三味同熬令稀稠得所放冷不計時候每服取半合服之

鱉甲散出聖方治熱病七日四肢疼痛熱毒不退乍寒乍熱乍劇乍差發動如瘡宜服

鱉甲二兩塗醋炙令黃去裙襴天門冬去心人參去蘆黃耆剉

烏梅肉微炒恒山 牛膝去苗甘草炙微赤剉石膏三兩

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治時行熱病發汗有功效本草

浮萍草一兩四月十五者麻黃去根桂心 附子炮裂去皮臍

右四物搗細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差

熱病頭痛論

夫熱病三陽受病猶在於表邪毒之氣攻注於外循於風府而入於腦故令壯熱頭痛胃膈壅滯其脉浮數者可汗及吐之即愈也

方

石膏散出聖方治熱病壯熱頭痛百骨痰疼宜服

石膏二兩麻黃去根葛根剉各一兩黃芩 梔子仁

赤芍藥各三分甘菊花 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入豉少半合煎至六

分去滓不計時候溫服

犀角散出聖方治熱病四肢煩悶壯熱頭痛口舌乾燥宜

服

犀角屑一人參去蘆麥門冬去心赤茯苓各三兩甘草

炙微赤剉知母各半兩石膏

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二十七片煎

至五分去滓不計時候溫服

葛根散

出聖惠方

治熱病頭痛骨節煩疼宜服

葛根

剉

赤芍藥

甘菊花

黃芩

各一兩

石膏

甘草

一分炙微赤剉

防風

半兩去蘆頭

右為散每服四錢水一大盞生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

取吐散

出聖惠方

治熱病頭痛四肢煩疼宜服

人參蘆頭

恒山

鱉甲

塗醋炙令黃去裙襴各半兩

柴胡

去苗

茵陳

川大黃

剉碎微炒各一兩

右為散每服四錢水一中盞入豉五十粒煎至五分

去滓不計時候頓服取吐為度

瓜蒂散

出聖惠方

治熱病頭痛宜用吹鼻

瓜蒂

赤小豆

微炒

射香

細研

丁香

各一分

馬牙硝

半兩

右為細散入射香都研令勻以少許吹入鼻中當下

黃水即差

治熱病頭疼不止方

出聖惠方

石膏二兩 芎藭兩半 馬牙硝一兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分細茶末一錢煎至七分去滓不計時候分溫二服

治熱病頭痛不可忍方出聖惠方

地龍一條 沙糖三棗

右相和以水一大盞調以甕瓶盛懸於井內去水相近一炊時出傾取清者不計時候都為一服勿令患人知之

灌頂散出聖惠方 治熱病頭疼不可忍

馬牙硝 苦葫蘆子 地龍乾者 瓜蒂各一分 麝香半錢

右為細散入麝香同研令勻吹一字於鼻中當下腦

中惡滯水便差

治熱病頭痛不可忍方出聖惠方

右相和細研入清麻油調令如膏塗於頭上立差神

效

治熱病頭疼發熱進退方

出聖惠方

用菰蘆一枝大者取瓢細剉貯菴碗中用熱酒一盞沃蓋之良久去滓不計時候頓服未效再服一方用熱湯沃之

熱證防風散出危氏方治積熱上衝頭熱如火痛入頂中

防風去蘆羌活去蘆薄荷去鹿梗當歸去尾大黃 梔子去鬚

川芎各一兩蟬退二十箇去足翼粉草五錢

右為散每服四錢水一盞半灯心二十莖苦竹葉十

個煎食後服

治熱病結胃其心前閉塞胃中有一塊堅硬通身發熱頭痛不安面色黯赤喉中涎溢大腑祕熱昏悶不醒人事此病與伏暑相似若是服暑即不可喫此藥服暑候在總論中見楊子建方金護命方

射干 麻黃去節牡丹皮去心桃仁 大黃 赤茯苓

苓各半兩半夏三錢牽牛一兩羌活 連翹 荆芥穗各半兩

右細杵羅為末每服三錢水一盞煎取九分食後和
滓喫

熱病煩躁論

夫熱病煩躁者為陽勝於陰熱氣獨盛痞結於臍則三
焦隔絕故身熱而煩燥也

方

龍膽散出聖惠方治熱病未得汗體熱煩燥宜服

龍膽草 葳蕤 赤芍藥 黃耆剉 麻黃去根節

大青 川升麻 甘草炙微赤剉 葛根剉去桂心 各

兩 石膏二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

白鮮皮散出聖惠方治熱病熱毒在心脾狂亂煩燥宜服

白鮮皮 麥門冬去心焙 川大黃剉碎 大青

黃芩 甘草各半

右為粗散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎

至六分去滓不計時候温服

葛根飲子出聖惠方治熱病頭痛目疼心中煩躁宜服

葛根剉赤芍藥 豉各半葱白三

右都以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候服

解毒飲子出聖惠方治熱病初覺煩燥頭疼腰脚痛宜服

生地黄汁三合黃芩 生薑各一白蜜半

右細剉黃芩生薑二味以水一大盞煎至六分次入

地黄蜜更煎三兩沸不計時候分温二服

犀角散出聖惠方治熱病經發汗熱不解心中躁熱煩悶宜服

犀角屑半天竺黃分馬牙硝 鐵粉 鈔霜各一

麝香半錢

右都研為細散每服不計時候以竹葉湯温温調下

白鮮皮散出聖惠方治熱病心神煩燥不止宜服

白鮮皮一梔子仁 麥門冬去心 川大黃剉碎

鬱金 黃芩 甘草炙微赤剉 鈔霜一分

右為細散入鈔霜同研令勻每服不計時候熟水調下二錢

黃芩散出聖方治熱病熱毒不解口乾煩燥宜服

黃芩 川大黃剉碎 甘草炙微 川馬牙硝各一兩

鐵粉半分 梔子仁兩

右為細散每服不計時候以溫溫蜜水調下二錢

治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止

用附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水二升煎

一升溫服立効

芍藥黃耆湯十方便良方療陰不足則陽偏陽偏則發熱若熱

從背起或從手足漸痛遍身口舌乾燥思欲飲水時時

躁悶此由陰氣虧少少水不能滅盛火蓋諸陽起四末

循行於背陰不能斂陽所以發熱或晝發而夜止或夜

發而至旦即清其脉虛疾而小宜服此

白芍藥三兩 黃耆 甘草 青蒿各一兩

右為粗末每服五錢以水二盞煎至一盞去滓不計

時候温服

熱病狂言論

夫熱病毒氣攻心則心身煩亂陽氣太盛遂則狂言目赤心煩不得睡卧精神驚悸言語失常毒氣不除腸中結燥其脉洪數者是其候也 夫病熱盛則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽氣爭而外并於陽四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高而歌熱盛於身則

棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親疎大熱遍身狂言而妄見妄聞也

方

大柴胡散 出聖惠方 治熱病已得汗熱猶不解腹脹煩燥狂

語不定可脹

柴胡 去苗 川大黃 剉碎微炒 黃芩 赤芍藥 枳實 麩炒微黃

人參 去頭蘆 黃耆 剉各一兩 甘草 炙微赤剉 半夏 湯浸七遍去滑各半兩

右為粗散每服五錢以水一大盞入竹茹一分生薑

半分煎至五分去滓不計時候温服

猪苓散出聖方治熱病狂言煩渴宜服

猪苓去黑皮 麥門冬去心焙 龍膽草去蘆頭 黃芩 白

鮮皮 澤瀉 赤茯苓 人參去蘆頭 甘草炙微赤

分

右為粗散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計

時候温服

白鮮皮散出聖方治熱病狂言不止宜服

白鮮皮 黃芩 秦艽去苗 犀角屑 甘草炙微赤 麥

門冬去心 大青 杏仁湯浸去皮尖雙仁

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候温服

龍齒散出聖方治熱病心肺熱壅狂言不安宜服

龍齒 人參去蘆頭 川大黃剉碎 川芒硝各一兩 白鮮

皮 川升麻 葳蕤 秦艽去苗各三分 石膏一兩

右為散每服水一中盞煎至六分去滓不計時候温

服

治熱病熱毒攻心煩躁狂言精神不定出聖惠方

生地黄汁合三生薑汁合一薄荷汁合一白蜜合一地龍兩半

微炒去土搗細羅為末

右以四味汁相和入地龍末攪令勻不計時候分温

二服

治熱病煩熱如火狂言妄語走宜服此方出聖惠方

黃芩 甘遂煨令黃 龍膽草去蘆頭各一兩

右為細散每服不計時候以温水調服二錢須臾令病人飲水三兩盞服滿則吐之此方療大熱急者甚效

治熱病五六日壯熱狂語欲走出聖惠方

雞子三枚取清 川芒硝細研 寒水石細研各半兩

右先以新汲水一小盞調芒硝等末次下雞子清攪令勻不計時候分為二服

牛黃丸出聖惠方 治熱病狂言心神驚悸煩熱喘促宜服

牛黃研細射香一細研各犀角屑 人參去蘆頭扶神

黃連 龍膽草去蘆頭木香 羚羊角屑 朱砂細研

地骨皮 川升麻 甘草炙微赤剉麥門冬去心

焙龍腦一錢細研

右為末都研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以新汲水下十五丸

治熱病狂及諸黃雪煎出聖惠方

川大黃五兩碎剉微炒

右為細散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候以冷水調半匙服之

若已六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起走出肘後方

右用乾茱萸三升水二升煮取一升後去滓寒溫服之得汗便愈此方恐不識必可用也秘之

又方肘後方

大蚓一升破去土以人溺煮令熟去滓服之直生絞汁及水煎之並善又絞糞汁飲數合至三升謂之黃

龍湯陳久者佳

又方肘後方

取白犬從背破取血用之多多為佳當及熱以鋪胃上冷乃去之此治垂死者活無白犬諸純色者亦可用之無犬白雄雞佳

又方肘後方

取桐皮削去上黑者細擘之長斷令四寸一束以酒五合以水一升煮取一升去滓頓服之當吐下青黃

汁數升即差

治時疾熱病狂言心躁出本草

以苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連三服有汗無汗皆差

治熱病煩渴論

夫熱病入於腎臟則為煩渴為腎惡燥也令熱氣盛攻於腎故腎燥腎燥則渴而引飲也

方

麥門冬散出聖方治熱病咽土下後有熱毒未解煩渴不止宜服

麥門冬焙去心 赤芍藥 黃連去鬚 甘草炙微赤剉 知母

黃芩 猪苓去黑皮 茯苓各一兩 茯苓一枚

右為粗散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

黃耆散出聖方治熱病煩渴日夜喫水宜服

黃耆剉 麥門冬去心 茯苓各一兩 甘草半兩剉生用

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

石膏茶方出聖方治熱病頭疼壯熱心燥煩渴宜服

石膏二兩搗碎 淡竹葉一握 薺苳 木通各半兩

右細剉以水二大盞煎至一盞去滓分作四度點臘面茶不計時候服

犀角飲子出聖方治熱病煩渴飲水無庶宜服

犀角屑 知母 川升麻各三分 石膏二兩

右細剉用水二大盞入竹葉三七片小麥五十粒煎至一盞去滓入土瓜根汁一合菰蘆根汁一合攪令勻不計時候分溫二服

又方出聖惠方

小麥合一麥門冬二兩去心寒水石 青竹葉 知母各三分

右細剉和勻分為五服每服以水二大盞煎至一盞去滓每服渴時溫服半中盞

知母散出聖惠方治熱病積熱攻脾肺煩燥多渴飲水無度小便數宜服

知母 川大黃剉微炒 黃芩 麥門冬去心 龍膽草去蘆
頭各三分 甘草一分炙 微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生蘆根五寸煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病燥大渴飲水則逆宜此方出聖惠方

木瓜 生薑 薄荷各一分

右都細切以水一大盞煎至五分去滓入蜜一合攪
勻不計時候溫服

黃芩散出聖惠方治熱病煩渴不止兼除勞熱宜服

黃芩兩一黃連去鬚生乾地黄 川升麻 知母

葛根剉大青各半梔子仁一分

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計
時候溫服

人參散出聖惠方治熱病經吐下後有餘熱煩渴不止宜服

人參去蘆頭黃連去鬚甘草炙微赤剉黃芩 菴藟根

各一兩 桂心半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時
候溫服

麥門冬散出聖惠方治熱病煩渴不止宜服

麥門冬一兩半甘草炙微赤剉地骨皮 知母 土瓜

根各一兩豉一分

右為粗散每服五錢水一大盞入葱白兩莖生薑半

分煎至五分去滓不計時候温服

猪苓散出聖方治熱病煩渴不止或時頭痛乾嘔宜服

猪苓皮去黑 人參去蘆頭 甘草炙微赤剉 茅根剉各三分 麥門冬

一兩 石膏去心

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候温服

石膏散出聖方治熱病毒氣在心煩渴不止宜服

石膏兩四 麥門冬去心 黄芩 梔子仁 地骨皮

柴胡去心 菴藪根 葳蕤 甘草炙微赤剉各三分

右為粗散每服五錢水一大盞入竹葉三七片煎至

五分去滓不計時候温服

地骨皮散出聖方治熱病煩渴不止宜服

地骨皮 澤瀉 麥門冬去心各一兩 梔子仁 犀角

屑 黄芩 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候温服

猪苓散出聖方治熱病發熱煩渴小便不利宜服

猪苓去黑皮 赤茯苓 木通剉 滑石 澤瀉各一兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

牛黃散出聖方治熱病大熱煩渴心躁不睡宜服

牛黃一分細研入 柴胡去苗 黃連去鬚 黃芩 葛根剉各一兩

甘草半兩炙微赤剉

右為細散不計時候以薄荷水調下二錢

三黃丸出聖方治熱病煩渴諸臟不安宜服方見本門熱病大便不通

類

又方出聖方

右以生地黄搗絞取汁每服一合時時服之

又方出聖方

右以生菰藪根搗絞取汁每服一合時時服之

治熱病論

夫熱病毒氣攻於心肺煩熱壅於胃膈而渴引飲水必

致喘粗汗下之後胃氣尚虛熱毒不退渴飲水過多水
停心下故令喘急也

方

前胡散出聖惠方治熱病氣喘心膈煩悶或痰壅不能食宜

服

前胡去蘆頭

赤茯苓

紫苑去根土

大腹皮

桔梗去蘆

枳殼頭

麵炒微黃去瓢各一兩

麥門冬

一兩半去心焙

甘草

炙微赤剉

陳橘皮

湯浸去白瓢焙各三分

右為粗散每服五錢水一大中盞煎至五分去滓不

計時候溫服

大腹皮散

出聖惠方

治熱病肺壅氣喘膈中不利宜服

大腹皮

剉人參去蘆頭各一兩

赤茯苓

枳實

麩炒微黃

柴胡

去苗桑根白皮

剉各三分

右為散每服四錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

杏仁散

出聖惠方

治熱病胃膈煩悶喘息奔急宜服

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

前胡

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

麥門冬

去心桑根白皮

剉各一兩

木通

剉半兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

治熱病心膈煩熱肺壅喘急宜服此方

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

麥門冬

去心各一兩

馬兜苓

半兩

麻黃

去節

五味子

各一兩半

桑門冬

三分

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

柴胡散

出聖惠方

治熱病肺熱上氣奔喘宜服

柴胡

去苗

紫蘇莖葉

桑根白皮

剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩

炒微黃各一兩

陳橘皮

一兩半湯浸去瓢焙

石膏

二兩

麻黃

半兩去根節

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

半夏散

出聖惠方

治熱病客熱在臟乾嘔口中多痰喘急煩

悶不能飲食宜服

半夏湯洗七遍去滑 麥門冬去心 青竹茹 葛根各一兩 甘草

炙微赤對 陳橘皮湯浸去白瓢焙各半兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分

去滓不計時候溫服

治熱飲水多卒上氣喘急方出聖惠方

淡竹葉一兩半 陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙 桑根白皮一兩

右為細剉和勻分為五服每服以水一大盞煎至五

分去滓不計時候溫服

皂莢九出聖惠方 治熱病肺壅喘急宜服

皂莢一兩去黑皮塗酥炙微黃 郁李仁湯浸去皮尖研如膏 甘草炙微赤對

麻黃去根節各三分 甜葶藶一兩炒令黑搗如泥

右為末用郁李仁葶藶同研令勻煉蜜和丸如梧桐

子大每服不計時候以粥飲下十九

杏仁煎出聖惠方 治熱病氣喘欬嗽宜服

杏仁五兩湯浸去皮尖雙仁 黃牛酥二兩 白蜜半 生薑汁二合

右以酥拌杏仁炒令黃熟搗如膏入蜜薑汁同煎如

稠餈每服三錢含燕津不計時候服

陷骨散出聖惠方煎治心胃悶結喘不定服之自汗出

大黃一兩半 甘草兩半 枳實半兩去瓢

右為末每服三錢水七分一盞煎三兩沸溫溫和滓服汗出為度六日內多使此散如無證不用

治熱邪論

夫心者火也主於血陽氣盛則血并於陽熱邪攻於心絡則心神煩亂或咏或歌或言或笑精神不守言語失

常驚悸不安棄衣而走此皆熱毒之氣壅滯心胃致令發狂也

方

犀角散出聖惠方治熱病伏熱在心精神恍惚發狂不得睡

卧宜服

犀角屑 梔子仁各半兩 茵陳三分 赤芍藥 麥門冬

去心白鮮皮各一兩 茯神 生乾地黄各二兩 人參一兩半去

蘆頭

右為散每服五錢水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候温服

人參散出聖方治熱病壅熱發狂心忪驚悸宜服

人參去蘆頭三分 犀牛角屑 甘草炙微赤剉 黃芩 遠志

秦朮去苗 地骨皮 沙參去蘆頭各半兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓下竹瀝一合攪令勻不計時候温服

羚羊散出聖方治熱病發汗後熱毒未盡因有所驚發熱

顛狂宜服

羚羊角屑 犀牛角屑 茯神 黃芩 甘草炙微

赤防風去蘆頭各半兩 龍齒 人參去蘆頭 鐵粉各一兩 地骨

皮三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候温服

茯神散出聖方治熱病發狂心熱煩悶多驚不得睡卧宜

服

茯神 黃芩各三分 犀角屑 川升麻 玄參各半兩

龍齒 麥門冬去心 甜竹根剉 黃蓮去鬚各一兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓下朴

硝一錢地黃汁一合攪令勻不計時候溫服

大青散出聖惠方 治熱病盛發黃皮膚如金色小便赤澀大

便不通口乾煩渴悶亂發狂宜服

大青 黃藥子 川朴硝 川大黃剉碎 羚羊角

屑 土瓜根 梔子仁 秦芫去苗 甘草炙微赤剉各半兩

右為細散不計時候以冷蜜水調下二錢以利為度

柴胡散出聖惠方 治熱病已得汗熱不解悶滿脹痛煩躁發

狂宜服

柴胡去一兩 川大黃剉碎 黃芩 赤芍藥 半夏湯浸

七遍去滑 各三分 枳殼半兩麩炒 微黃去瓢

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

硃砂丸出聖惠方 治熱病毒熱在臟心神狂亂壯熱煩躁不

得睡卧宜服

硃砂研細紫石英細研水飛過白石英細研水飛過不灰木以牛

糞火燒一次大陰玄精石 牛黃末生用天南星末生用

麝香各半金箔五十筋龍腦一分

右都研令細用牛膽汁和丸如櫻桃大不計時候以

新汲水嚼下一丸

鐵粉丸出聖方治熱病心神恍惚悲喜不恆發狂欲走宜

服

鐵粉研細牛黃研細遠志去心丹參 茯神 川升麻各半

兩金箔三七片銀箔三七片麝香細研白殭蚕微炒白

附子炮製各一分馬牙硝三分

右為散同研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大不計時候以薄荷湯下二十九

牛黃丸出聖方治熱病發狂心神恍惚宜服

牛黃半兩虎睛一對酒浸微炙茯神 石膏細研麥門冬去心

生乾地黄 鐵粉細研各一兩川升麻 玄參各三分

右為末同研令勻煉蜜丸如梧桐子大不計時候以
荆芥湯下二十九

天竺黃丸出聖惠方治熱病心氣熱盛恍惚不足發狂妄有
所見宜服

天竺黃 硃砂細研水飛過 龍腦各三分 牛黃細研 遠志去心

麝香細研 甘草炙微赤剉 黃蓮去鬚 鐵粉各一分 甘菊花

馬牙硝細研 茯神各半兩 金銀箔各五十片細研

右為末都研令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子

大不計時候以荆芥湯或薄荷湯嚼下十九

治熱病毒攻心胃躁悶發狂出肘後方

雞子二枚清 川朴硝兩半

右相合以新汲水一小盞熱調頓服之一方酒服之

治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癩言語不定久不
得汗及不知人事

右用人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煨
半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細

研如麵新汲水調下三錢或未退間作差人中黃者
硬糞也

治狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用
出本

以豶猪肉一觔煮令熟令以細研作臈和醬醋食之
或羹粥炒任性服之

解熱疾不知人事欲死者

用蚯蚓不以多少先杵爛以水泡瀝過灌服半椀立

效

治熱嘔論

夫熱病胃中有熱則穀氣不和新穀入與熱氣相搏胃
氣不平故致嘔逆或吐下已後臟氣虛弱亦令嘔逆也

方

前胡飲子出聖惠方治熱病惡寒壯熱食則嘔逆宜服

前胡去蘆頭 麥門冬去心 竹茹 生地黃 葛根各二兩

陳橘皮湯浸去白瓢焙 甘草炙微赤剉 枇杷葉拭去毛炙微黃各半兩

右都細剉和勻每服五錢以水一大中盞煎至五分去滓不計時候溫服

人參飲子出聖惠方治熱病壯熱嘔逆不下飲食宜服

人參去蘆頭陳橘皮湯浸去白瓢焙生薑赤茯苓葛根

剉麥門冬去心各一兩

右都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

麥門冬散出聖惠方治熱病壯熱惡寒食即嘔逆宜服

麥門冬去心前胡去蘆頭生地黄各一兩甘草炙微剉陳橘

皮湯浸去白瓢焙人參去蘆頭各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入竹葉半雞子大煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡散出聖惠方治熱病數日未得汗遍身壯熱嘔逆不下

食宜服

柴胡去苗川升麻人參去蘆頭麥門冬去心各一兩麻黃

一兩半甘草炙微剉枳實麩炒微黃知母梔子仁各三兩

鱉甲 三兩塗醋炙
令黃去裙襴

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

白茅根飲子 出聖方 治熱病因服涼藥過多致胃冷嘔宜

服

白茅根 半兩 陳橘皮 湯浸去白瓤焙 桂心 葛根 各一兩

高良薑 半兩 枇杷葉 半兩拭去毛炙微黃

右都細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病煩渴飲水過多時有嘔逆方 出聖方

枇杷葉 拭去毛炙微黃 茅根 剉 葛根 剉各一兩

右為散以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分溫三服

七物黃蓮湯 出聖方 治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜

煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩

黃蓮 茯苓 黃芩 各十銖 芍藥 葛根 各一兩 甘草

一兩 小麥 三合
六銖

右呔咀以水七升煮取三升冷分三服不能一升稍
稍服之湯勢安乃卧藥主毒氣服湯之後胃中熱及
咽喉痛皆差其明日復煮一劑如法服之此湯無毒
但餘熱下氣安病人小兒服者取三分三一以水四
升煮得二升稍稍服

黃蓮解毒湯

出經驗良方

治煩嘔不得眠口燥呻吟錯語

黃蓮

三兩

黃柏

黃芩

各二兩

梔子

一十四枝

右水六升煎取二升分再服外臺云凡大熱盛煩嘔
呻吟錯語不得眠皆傳此方諸人用之亦效此直解
熱毒除熱酷不必飲酒劇者一方每服加半夏三枚
全用厚朴二錢剉茯苓去皮剉水一盞半生薑三片
煎至半盞溫服名曰半夏黃蓮解毒湯或欲急下者
本方加大承氣湯一服生薑煎如前法以利為度一
法為細末水丸如小豆大溫水下二十九治積熱勞
欬瀉利甚良

小柴胡湯

出朱氏律驗方

治熱證嘔吐

柴胡

去蘆半觔

黃芩

人參

甘草

炙各三兩

半夏

湯洗七次焙乾

半

右剉散每服三錢半生薑五片棗一枚煎服

治熱嘔論

夫熱病嘔者由伏熱在於胃間令人胃滿氣逆則嘔若大下後胃氣虛冷亦治嘔也

方

丁香散

出聖惠方

治熱病未得汗躁熱飲水過多腹脹氣急

嘔噦不止宜服

丁香

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

枇杷葉

拭去毛炙微黃

前胡

去蘆頭

葛根

剉各半兩

人參

茅根

剉各一兩

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

甘草飲子

出聖惠方

治熱病毒氣攻胃嘔噦不止宜服

甘草

炙微赤

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

川升麻

生薑 葛根

剉人參去蘆頭 各一兩

右都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

半夏散出聖方治熱病服胃虛脹心膈壅滯嘔噦不能食

宜服

半夏湯洗七遍去滑赤芍藥 陳橘皮湯浸去白瓢焙 大腹皮剉

三分

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候溫服

麥門冬散出聖方治熱病煩熱嘔噦不欲飲食宜服

麥門冬去心 蘆根剉各一兩半 柴胡去苗 葛根剉各一兩 人參三分

去蘆頭

右為散每服四錢以水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓入生地黄汁少半合更煎一沸不計時候溫服

前胡散出聖方治熱病胃中有熱熱氣入則胃逆逆則胃

不下食宜服

前胡去蘆頭

黃耆剉

人參去蘆頭各一兩

麥門冬去心

陳橘皮

湯浸去白瓢焙各半兩

甘草一分炙

微赤剉

生乾地黄三分

右為散每服五錢以水一大盞入竹茹一分去滓不計時候煎至五分溫服

赤芍藥散出聖惠方

治熱病往來寒熱胃脇滿悶噦逆宜服

赤芍藥

人參

去蘆頭

陳橘皮

去白瓢焙

茯苓

各三分

前胡

去蘆頭

桂心

犀角屑

大腹皮

蘆根

各半兩

右為散每服三錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

白朮香散

出聖惠方

治熱病邪熱已退胃氣未和噦不能食

宜服

白朮

蘆根

剉

草豆寇

去皮

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯洗去白

瓢 枇杷葉 拭去毛炙微黃

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香

各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

白茅根散出聖惠方治熱病噦逆不下食宜服

白茅根剉 百合 陳橘皮湯浸去白瓤焙 葛根剉 人參去蘆

頭各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病未得汗嘔噦不止方出聖惠方

麥門冬一兩半去心焙 蘆根 人參去蘆頭各一兩

右為散每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

治結熱論

夫熱病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脉洪大實數腹胃脹滿小便赤黃大便難或渴或煩面色變赤此為腑臟有結熱故也

方

石膏散出聖惠方治熱病得汗後餘熱不退頭痛心煩宜服

石膏二兩 麥門冬一兩去心焙 知母 人參去蘆頭 柴胡去苗

犀角屑 甘草炙微赤剉 黃芩三分

右為粗散每服五錢以水一大盞入葱白兩莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病汗後餘熱不除寒熱往來頭重體痛宜服此方

出聖惠方

葛根剉 黃耆剉 梔子仁 柴胡去苗 石膏各一兩 黃芩

地骨皮各三分 甘草半兩炙微赤剉

右為粗散每服三錢以水一中盞入豉三十粒煎至

五分去滓不計時候溫服

茵陳散出聖惠方 治熱病汗後餘熱不解頭項出汗身上無

汗癢熱在內渴欲飲水小便不利宜服

茵陳 猪苓去黑皮 桑根白皮剉 木通剉 甘草炙微赤剉

各半 梔子仁 川大黃剉碎微炒 秦艽去苗各三分 柴胡去苗

一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

葛根散出聖方治熱病汗後餘熱不解往來寒熱不定宜服

葛根剉 赤芍藥各三兩 麻黃去根節 柴胡去苗 麥門冬去心

各一兩 大青 葳蕤 黃芩 甘草炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

黃芩散出聖方治熱病後餘熱不解身體沉重宜服

黃芩 川升麻 石膏 麻黃去根節 黃連去鬚

梔子仁 甘草炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

犀牛角散出聖方治熱病汗後餘熱不退頭痛脣乾宜服

犀牛角 知母 川升麻 麥門冬去心 黃芩 葛

根剉各一兩 黃連三分 甘草半兩炙 石膏二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病汗後餘熱不解宜服此方

川升麻

黃芩

各三分

黃連

去鬚

恒山

各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓空心

溫服得吐即止未吐再服

石膏散

出聖惠方

治熱病已得汗餘熱未退宜服

石膏

一兩半

知母

人參

去蘆頭

葳蕤

甘草

三分炙微赤判

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候溫服

人參散

出聖惠方

治熱病汗後餘熱不除煩躁恍惚不安宜

服

人參

去蘆頭

梔子仁

藍葉

甘草

炙微赤判

白鮮皮

大青

各一兩


右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方出千金方

石膏升半蜜升一

右二味以水三升先煮石膏取二升次內蜜復煎取
如錫含如棗核許盡復含之大良



普濟方卷一百五十二

總校官候補知府 臣葉佩蓀

校對官編修 臣朱 紱

謄錄監生 臣韋洪勳